



# Rekommendationer för gödsling och kalkning **2024**

Jordbruksinformation 17 – 2023

# Innehåll

<b>Förord</b>	<b>3</b>	<b>6 Kalium</b>	<b>91</b>
<b>1 Behovsanpassad gödsling</b>	<b>4</b>	6.1 Kalium i marken	91
1.1 Markkartering är en grundförutsättning	4	6.2 Riktgivor och strategier för kaliumgödsling	92
1.2 Gödslingsstrategi efter grödans behov	8	<b>7 Magnesium, svavel och mikronäringsämnen</b>	<b>96</b>
1.3 Optimal gödsling gynnar både ekonomi och miljö	10	7.1 Tillgängligheten är mer avgörande än mängden	96
1.4 Växtnäringsbalanser ger facit på växtnärings effektiviteten	11	7.2 Magnesium – risk för brist på lätta jordar	98
<b>2 Gödselmedel</b>	<b>13</b>	7.3 Svavel – gödsla i proportion till kväve	99
2.1 Mineralgödsel	13	7.4 Bor – upptaget påverkas av torra	100
2.2 Stallgödsel	15	7.5 Mangan – tillgänglighet styrs av markens pH och syrehalt	101
2.3 Biogödsel	29	7.6 Koppar – förrådet i jorden ökar med stigande lerhalt	102
2.4 Avloppsslam	30	7.7 Övriga mikronäringsämnen och samspel mellan ämnen	103
2.5 Gödselmedel för ekologisk odling	32	<b>8 Kalkning</b>	<b>104</b>
<b>3 Spridningsteknik</b>	<b>36</b>	8.1 Kalka för att bibehålla eller höja pH-värdet	104
3.1 Mineralgödsel och torkade, pelleterade organiska gödselmedel	36	8.2 Flera processer påverkar markens pH-värde	104
3.2 Stallgödsel och andra organiska gödselmedel	38	8.3 Kalka för bättre odlingssegenskaper	105
3.3 Teknik för att styra gödselgivan	41	8.4 Olika mål för pH-värdet för olika jordar och grödor	106
<b>4 Strategier och riktgivor för kvävegödsling</b>	<b>43</b>	8.5 Effekten beror på kalkens ursprung och egenskaper	108
4.1 Målet är att uppnå ekonomiskt optimal kvävegiva	43	8.6 Olika kalkmängd krävs på olika jordar	109
4.2 Kväverekommendationer och strategier för stråsäd	45	8.7 Strukturkalk förbättrar lerjordens struktur	111
4.3 Kväverekommendationer och strategier för oljeväxter	56	<b>9 Referenser</b>	<b>113</b>
4.4 Kväverekommendationer och strategier för slätter- och betesvall samt gräsfrövall	60	<b>Bilaga 1 - Schema för bestämning av kvävebehov via mineralgödsel</b>	<b>118</b>
4.5 Kväverekommendationer för potatis	71	<b>Bilaga 2 - Att tänka på för att få bästa växtnäringsutnyttjande och minimera förlusterna när du sprider stallgödsel på sand- och mojordar</b>	<b>119</b>
4.6 Kväverekommendationer för sockerbetor	72	<b>Bilaga 3 - Att tänka på för att få bästa växtnäringsutnyttjande och minimera förlusterna när du sprider stallgödsel på lerjordar</b>	<b>120</b>
4.7 Kväverekommendationer och strategier för fodermajs	73	<b>Bilaga 4 - God markkarteringssed (GMS) enligt Markkarteringsrådet</b>	<b>121</b>
4.8 Kväverekommendationer och strategier för salix	74		
4.9 Justera kvävegivan efter förfrukten	74		
4.10 Gödsla mindre på jordar med hög mullhalt	77		
<b>5 Fosfor</b>	<b>78</b>		
5.1 Gödsla efter grödans behov och markens fosforinnehåll	78		
5.2 Riktgivor för fosfor	81		
5.3 Strategier för fosforgödsling	84		
5.4 Minska risken för fosforförluster	88		

# Förord

Jordbruksverket tar årligen fram rapporten ”Rekommendationer för gödsling och kalkning”. Syftet är att ge underlag vid planeringen av ekonomiskt optimal gödsling och kalkning på den enskilda gården, främst inom konventionell odling. Rekommendationerna bygger på resultat från fältförsök, praktisk erfarenhet och på antaganden om priser. De är inte juridiskt bindande. Vi bedömer att de givor som vi rekommenderar begränsar risken för förluster av växtnäring.

Rekommendationerna är generella och ett planeringsverktyg. Det är viktigt att även anpassa gödslingen utifrån fältets och årets förutsättningar genom att använda de verktyg som finns för att bedöma grödans näringsbehov. Det kan till exempel vara markkartering, nollrutor för att uppskatta kvävelevensans från marken, mätning av grödans kväveupptag med hjälp av sensorer och vegetationskartor från satellitbilder.

I årets skrift har vi uppdaterat kväverekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter för spannmål och vall. Vi har även skrivit om bristsymtom i kväve, fosfor och kalium i respektive kapitel. I [kapitel 2](#) har vi uppdaterat djurkategorier och schablonvärden för gödselproduktion och växtnäringsinnehåll i stallgödsel från dikor och ungnöt. Vi har också gjort vissa justeringar i [bilaga 2](#) och [3](#) som handlar om rekommenderade spridningstidpunkter för stallgödsel. En arbetsgrupp i markkarteringsrådet har hjälpt oss att se över texten God markkarterings-[bilaga 4](#). I alla kapitel har vi gjort mindre språkliga justeringar och sett över layouten för att öka läsbarheten.

Arbetet med att ta fram ”Rekommendationer för gödsling och kalkning” utförs inom Greppa Näringens centrala verksamhet av personer anställda på Jordbruksverket. Data som tas fram i rapporten används som grundläggande underlag i flera av Greppa Näringens beräkningsverktyg och rådgivningsmoduler. Under arbetets gång har vi diskuterat innehållet med forskare och rådgivare och med de organisationer som ingår i Markkarteringsrådet.

## **Författare**

Emelie Andersson, Gunilla Frostgård, Emma Hjelm, Pernilla Kvarmo, Maria Stenberg och Johan Malgeryd.

## **Redaktör**

Emelie Andersson

## **Layout**

8190 AB

## **Omslagsfoto**

Alex Regnér

# 1 Behovsanpassad gödsling

För bästa ekonomiska resultat av odlingen behöver du anpassa gödslingen efter grödans behov och skördepotential samt efter markens och årets förutsättningar. Planera utifrån odlingsmål, markkartering, förfrukt och erfarenhet. Anpassa sedan kvävegivan efter årsmånen och markens egen kväveleverans.

När du lyckas uppnå ekonomiskt optimum, gödslar du också med största möjliga näringseffektivitet, vilket ger minsta möjliga miljöpåverkan.

## För att kunna optimera växtnäringstillförseln är det viktigt att

- planera gödslingen efter gröda, förfrukt, odlingsmål, erfarenhet och aktuell markkarta. För fosfor och kalium bör planen sträcka sig över hela växtföljden.
- anpassa kvävegödslingen efter årsmån och skördepotential (att anlägga nollrutor är ett bra sätt att följa kväveleveransen).
- stämma av kort- och långsiktigt genom att göra växtnäringsbalanser på fältnivå och/eller gårdsnivå.
- variera givan inom fältet med hjälp av markkarta och andra hjälpmedel.
- följa grödorna under säsongen och vidta åtgärder vid behov. Exempelvis kan växtanalys visa om mikronäring behöver tillföras.

## 1.1 Markkartering är en grundförutsättning

Det är viktigt att ha en aktuell markkarta för att kunna behovsanpassa tillförseln av växtnäring och kalk. Med markkartering menar vi jordprovtagning och analys av växtnäring samt pH-värde kopplade till en karta över fälten. Även jordart och mullhalt kan analyseras.

Oftast märker man ut var provet är taget med hjälp av globalt positioneringssystem (GPS). Då går det att återkomma till samma plats vid en omkartering och se förändringar mellan provtagningarna. Dessutom ger det möjligheter att anpassa gödsling och kalkning inom fältet på ett bättre sätt. Du hittar mer information om markkartering och analyser i God Markkarteringssed i [bilaga 4](#).

### 1.1.1 Analysera efter dina behov

Beroende på vilken jordart och odlingsinriktning du har, behöver du olika typer av analyser. Viktigast är att bestämma pH-värde samt fosfor och kalium. Lättlösligt magnesium (Mg) och kalcium (Ca) kan analyseras i samma extrakt som fosfor och kalium. Om du får dessa analyser utan extra kostnad, bör du även göra dem på alla prover.

På lätta jordar, på mulljordar och på jordar där det kan finnas risk för brist på koppar (Cu), bör du även beställa analys av detta ämne. Om du ska beräkna kalkbehovet behöver du analysera lerhalt och mullhalt samt pH. Lerhalten är oförändrad över tid, så den analysen kan man utesluta vid kommande markkartering. Lerhalt, mullhalt och pH kan också ge vägledning om växttillgänglighet av andra näringsämnen och eventuella risker för brister. Du kan läsa mer om detta i [kapitel 7](#).

För att bestämma lättlöslig fosfor, kalium, magnesium och kalcium använder man AL-lösning (ammoniumlaktat-acetat), medan man använder HCl-lösning (saltsyra) för att bestämma det svårslösliga förrådet.

Gödslingsrekommendationerna för fosfor ([kapitel 5](#)) grundar sig på jordens innehåll av lättlöslig fosfor, P-AL. För kalium ([kapitel 6](#)) används både K-AL och K-HCl. K-HCl ger värdefull information om jordens långsiktiga leverans av kalium. Jordarnas förråd av kalium kan också bedömas utifrån lerhalten. Lätta jordar har ett litet kaliumförråd medan styva jordar oftast har ett större kaliumförråd.

Jordens innehåll av lättlöslig fosfor (P-AL) delas in i sex klasser ([tabell 33](#)), medan innehållet av kalium delas in i fem klasser ([tabell 37](#)).



**Bild 1.** Oftast tas jordprover vid markkartering med jordborr som är monterad på en fyrhjulig. Provpplatsernas positioner fastställs med GPS. **Foto:** Magnus Westöö

### 1.1.2 Täck in variationen inom fälten

Det är viktigt att täcka in så mycket som möjligt av variationen inom fälten i markkarteringen. Det är nödvändigt för att kunna anpassa gödsling och kalkning efter ett varierande behov och för att få ett rättvisande medelvärde. Det vanligaste sättet är att ta ett prov per hektar i ett regelbundet rutnät över fälten. På så vis får du god geografisk täckning.

Ibland kan variationen inom fält göra att ett regelbundet rutnät missar övergångar till exempel i jordart. Dessutom kan prover hamna på fläckar som inte är representativa. Då kan du flytta enskilda provpunkter i rutnätet eller lägga till nya punkter för att få med variationen (Wetterlind m.fl., 2018). Som stöd för ny provplacering kan du till exempel använda mätningar med mark-sensorer, variationer i grödan som syns på satellitbilder, skördekartor eller grödsensormätningar, jordartsinformation från gamla karteringar eller digitala åkermarkskartan (läs mer på [precisionsskolan.se](http://precisionsskolan.se)).

Hur tätt du behöver ta prov beror på hur stor variation du har inom fältet och hur du har tänkt använda analyserna. Ett prov per hektar ger en bild av den övergripande variationen inom fältet och fungerar generellt bättre som underlag för precisionsstyrning av växtnäring och kalk än ett medelvärde för fältet (Söderström, 2008). Om du har stor variation inom fältet eller om du vill fånga en mer detaljerad variation i jordart och näringsämnen är det bra att ta två prov per hektar. Fler prov ger säkrare kartor vid en interpolation (Söderström, 2010).

### 1.1.3 Gödsling och kalkning kan påverka analysresultaten

Du ska provta tidigast en månad efter senaste gödsling och tidigast ett år efter kalkning för att vara säker på att utförd gödsling eller kalkning inte påverkar analyserna.

Vill du se trender mellan olika karteringsomgångar är det viktigt att du tar proverna på samma plats i växtföljden. Du bör sträva efter att ta proverna vid samma årstid, under liknande fuktförhållanden i marken och ungefär lika lång tid efter senaste stora gödselgivan. Det är svårt att pricka helt rätt. När du tolkar analysen är det viktigt att du är medveten om var i växtföljden du tog proverna och när du tillförde större gödselgivor senast.

Höga givor av framför allt organiska gödselmedel påverkar analyserna. Stora givor av fosfor (till exempel 100 kg P per hektar) höjer P-AL tillfälligt och det kan vara förhöjt under ett antal år efter givan (Ringdahl, 2018). Ett exempel på betydelsen av när i växtföljden provtagningen görs är att K-AL-analysvärdena i vall blir väldigt olika om man tar provet före första vallåret eller efter andra vallåret (Gruvæus, 1989). Läs mer om kaliumgödsling till vall i [kapitel 6](#).



### 1.1.4 Markkartera med fem till femton års mellanrum

Normalt bör du markkartera med fem till femton års mellanrum. Läs mer om markkartering i [bilaga 4](#).

**Kortare intervall** kan vara aktuellt om du odlar specialgrödor med stort näringsbehov som potatis och sockerbetor, eller om det finns stort kalkbehov. På lättare jordar med lägre buffringsförmåga kan du förvänta dig snabbare förändringar av till exempel pH och kalium. Därför kan det vara aktuellt med kortare intervall mellan markkarteringarna på lätta jordar. Det gäller även på gårdar med tillförsel av stora mängder organiska gödselmedel och vid intensiv vallodling utan regelbundna uppföljningar med växtnäringsbalanser. Vid kortare tidsintervall mellan provtagningarna kan du snabbare avgöra om markens växtnäringsinnehåll ökar, minskar eller ligger kvar på oförändrad nivå.

**Längre intervall** kan vara aktuellt om du har jämna jordarter, inget behov av kalkning och endast tillför mineralgödsel eller har en måttlig tillförsel av organiska gödselmedel samt om du gör regelbundna växtnäringsbalanser för fosfor och kalium eller uppföljningskarteringar. Om den första uppföljande karteringen visar förväntade resultat utifrån gödsling och skörd och om du fortsätter att följa gödslingsråden, kan du också vänta längre med nästa kartering.



**Bild 2.** Med markkartan som underlag kan du planera tillförseln av växtnäring och kalk till varje gröda samt över växtföljden. Du kan också använda markkartan som grund om du vill variera mängden gödsel eller kalk inom fältet. Färgmarkeringarna på markkartan visar interpolerade värden mellan provpunkterna, i detta fall pH. **Foto:** Hushållningssällskapet

## 1.2 Gödslingsstrategi efter grödans behov

Ett viktigt mål med gödningen är uppnå högsta möjliga effektivitet av den växtnäring du tillför. Genom att anpassa gödningen efter på hur mycket som förs bort med skörden samt fältets leverans av olika näringsämnen, ökar du gödningseffektiviteten.

### 1.2.1 Bortförel med grödan

Mängden växtnäring som förs bort från fältet beror på skördens storlek och näringsinnehåll. [Tabell 1](#) visar exempel på bortförel av växtnäring med några olika grödor vid en angiven skördenivå och normala halter av kväve, fosfor och kalium.

I stråsädens halm och rötter finns cirka 40 % av grödans totala kväveinnehåll. Av det totala näringsinnehållet i en vallgröda finns ungefär en tredjedel i rotsystemet. Brukar du ner halm och blast återgår en stor del av växtnäringen direkt till jorden. Om du använder skörderesterna som strö eller foder till egna djur kan merparten av näringen återföras med stallgödseln.

**Tabell 1.** Ungefärlig mängd kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) i några olika grödor och skördeprodukter.

Gröda	Skörd ton/ha	Kg/ha		
		N	P	K
Fodervete, kärna, 11 % protein	6	100	19	26
Brödvete, kärna, 12 % protein	7	110	22	30
Korn, kärna	5	80	17	22
Stråsädeshalm	4	30	4	40
Oljevaxter	3,5	126	25	28
Ärter	3,5	120	14	35
Potatis, knölar	40	105	21	200
Vall, 25 % klöver	6 (ts)	140	16	150
Socketbetor, betor	65	120	21	80–100
Socketbetor, blast	30	100	15	150

### 1.2.2 Gödslingsstrategi för fosfor och kalium

För fosfor och kalium kan du välja gödningstrategi utifrån markvärden och vilka grödor du odlar i växtföljden. Låt den mest krävande grödan bestämma vilket innehåll av fosfor och kalium som ska bibehållas. Markkartan och grödornas behov ger vägledning för om du bör förbättra markens näringsstatus över tid eller om du kan tära på förrådet.

Om du till exempel odlar grödor som är känsliga för låga fosforvärden bör du sträva efter att bibehålla högre fosfortal än om du odlar grödor som inte kräver lika mycket fosfor. Läs mer om strategier för gödning med fosfor och kalium i [kapitel 5](#) och [6](#).

Genom att göra en växtnäringsbalans på gårdsnivå eller på fältnivå över hela växtföljden, kan du få information om huruvida markens fosfor och kaliuminnehåll ökar eller minskar över tid. Då har du också möjlighet att gödsla mer



till de grödor som svarar mest på gödningen och mindre till de grödor i växtföljden som inte ger samma utbyte det enskilda året.

Du ska också fundera över om du vill använda sammansatta gödselmedel eller om det är lämpligare att använda enkla gödselmedel:

- Om fälten har ett ojämnt innehåll av fosfor och kalium och du vill jämna ut nivåerna är det lämpligt att precisionsgödsla med dessa näringsämnen ett i taget.
- Har du jämna fält och vill kombiså är det lämpligt att använda ett sammansatt gödselmedel som exempelvis en NPKS-produkt. Då sparar du dessutom körningar.

Använder du organiska gödselmedel ska dessa utgöra en grund och vid behov kompletteras med mineralgödsel.



**Bild 3.** Vid behov kan organiska gödselmedel kompletteras med mineralgödsel.  
**Foto:** Mårten Svensson

### 1.2.3 Kvävestrategin ska möjliggöra årsmånsanpassning

Skördepotential och odlingsmål avgör varje grödas totala kvävebehov. Detta behov kan tillfredsställas genom gödning, men också genom markens egen leverans av kväve.

Eftersom markens kväveleverans (restkväve från året innan, förfruktseffekter samt mineralisering) varierar mycket beroende på årsmånen, måste gödningen anpassas noga efter varje enskilt års förutsättningar.

För att kunna anpassa mängden kväve till årets förutsättningar och för att minska riskerna för förluster bör du planera för två eller flera kvävegivor till de flesta grödor. Genom att lägga lite mindre kväve än genomsnittliga behovet till stråsåden inför stråskjutningen, möjliggör du för anpassning efter totala behovet. Skulle årets skördepotential vara låg eller markens egen kväveleverans vara hög, behöver du kanske inte komplettera med mer kväve. Men om

det visar sig att grödan har hög potential eller om markens mineralisering är låg, kompletterar du med mer kväve.

Du kan skapa dig en god uppfattning om markens kväveleverans för ett enskilt år genom att anlägga noll och maxrutor:

- En **nollruta** är en jämförelseyta på fältet som inte är kvävegödslad. Rutan skapar du enkelt genom att lägga en presenning över grödan före varje gödslingsstillfälle. Vid kombisådd kan du stänga gödslingsutmatningen på ett par meter. Du kan uppskatta kväveupptaget i nollrutan på flera sätt. Genom att titta på grödans färg eller mäta strålängden kan du bilda dig en uppfattning. Mer exakt resultat får du om du har möjlighet att mäta med en kvävesensor. Jämför nollrutans upptag med omkringliggande normalgödslad gröda. Då ser du skillnaden i kväveupptag och förstår om markens kväveleverans är stor eller liten. Detta kan vara en god hjälp när resterande kvävebehov ska bestämmas.
- Förutom nollrutan kan du också anlägga en så kallad **maxruta**. I maxrutan lägger du på extra kväve utöver normal kvävegödsling, så att du är säker på att grödan inte lider av kvävebrist. Bedöm grödan i maxrutorna på samma sätt som i nollrutorna och jämför med omkringliggande gröda. Om maxrutorna är betydligt frodigare än omkringliggande gröda vid tidpunkten för axgång eller senare, kan det indikera att komplettering behövs.

Det finns idag också flera tekniska hjälpmedel att använda för att bestämma totala genomsnittliga kvävebehovet ett enskilt år, exempelvis N-tester. Kvävegödslingsbehovet varierar också inom samma fält. För att variera kvävegivan över fältet kan till exempel CropSAT användas. Läs mer om teknik för att bedöma gödslingsbehovet i [kapitel 3](#).

### 1.3 Optimal gödsling gynnar både ekonomi och miljö

Störst skördeökning per kilo kväve får du vid låga och måttliga kvävegivor. Kväveutnyttjandet sjunker om du gödslar över ekonomiskt optimum. Samtidigt ökar risken för stora restkvävemängder i marken efter skörd och det ökar i sin tur risken för förluster genom utlakning eller lustgasavgång från marken. Även risken för liggsäd ökar, speciellt om det även är hög mineralisering i marken. Med hänsyn till ekonomi, resurshushållning och miljö bör du därför undvika att gödsla mer än den ekonomiskt optimala givan.

Kväveutlakningen ökade betydligt från försöksfält med havre då gödslingen överskred den optimala givan enligt en undersökning av Delin & Stenberg (2012). Men så länge man fick minst 10 kg högre skörd för varje extra kg kväve så ökade utlakningen obetydligt. Detta stämmer relativt väl med ekonomiskt optimal gödsling. Bli skördeökningen mindre än 10 kg per extra kg kväve så ökar kväveutlakningen för varje ytterligare kilo kväve som tillförs.

Kväveförsök i höstvetete har visat att restkvävemängden i marken efter skörd ökar först efter det att mängden tillfört kväve överstiger ekonomiskt optimum.



**Bild 4.** Om du gödslar mer än optimum minskar kväveutnyttjandet samtidigt som risken för kväveförluster ökar. I värsta fall kan liggsäd förstöra skörden. **Foto:** Hans Jonsson

## 1.4 Växtnäringsbalanser ger facit på växtnäringseffektiviteten

En växtnäringsbalans gör du genom att räkna på skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Detta kan göras på olika nivåer och för kortare och längre tid. Du kan räkna på kväve, fosfor och kalium, eller andra växtnäringsämnen. För att kunna jämföra olika balanser eller överskott måste de vara gjorda på samma sätt och ha samma avgränsning. Det går inte att jämföra en balans för ett fält med en balans för hela gården.

### Gårdsbalans:

Du kan räkna på hela gården för att få koll på flödena av växtnäring. I tillförseln summerar du all inköpt växtnäring. Den tillförs i form av foder, levande djur, organisk gödsel, mineralgödsel, atmosfäriskt nedfall och fixering via baljväxter. Från denna summa dras sedan bortförseln, det vill säga all näring som lämnar gården i växt och djurprodukter samt stallgödsel. Du kan själv göra en växtnäringsbalans på Greppa Näringens webbsida [greppa.nu](https://greppa.nu), under Mina sidor.

Inom Greppa Näringen har vi gjort sammanställningar av ett stort antal växtnäringsbalanser på gårdsnivå från gårdar med olika driftsinriktningar vilket gör att vi har ett gediget referensmaterial (Hjelm m fl, 2021). Det finns stora skillnader i växtnäringsutnyttjande mellan olika produktionsinriktningar men även mellan enskilda gårdar. Genom Greppa Näringens rådgivning kan du få hjälp att analysera din växtnäringsbalans och få tips om olika åtgärder. Om du har ett stort växtnäringsöverskott, kan du få råd om hur du kan minska överskottet och utnyttja växtnäringen på ett mer effektivt sätt.

### Fältbalans:

När du gör en fältbalans räknar du på tillförsel och bortförsel för ett visst fält. För fosfor och kalium kan du relatera balansen till markkartan och din odlingsinriktning. Då får du en indikation på fosfor och kaliumtillståndets utveckling mellan markkarteringstillfällena. Du kan läsa mer om fosfor och kalium i [kapitel 5](#) och [6](#). Om du tillför stallgödsel får du normalt ett högre kväveöverskott i fältbalansen än om du enbart använder mineralgödsel eftersom det organiska kvävet i stallgödsel inte har omedelbar effekt.



### 1.4.1 Gör en växtodlingsplan

Genom att dokumentera planerad tillförsel av växtnäring och kalk i en växtodlingsplan som uppdateras efter eventuella justeringar samt skördenivåer, kan du hålla koll på tillförda mängder på längre sikt. Om du regelbundet markkarterar och gör växtnäringsbalanser ser du tydligt skillnaden mellan tillförsel och bortförsel. På lång sikt kan det leda mot önskat växtnäringsstillstånd.

Ligger din gård inom nitratkänsligt område enligt Jordbruksverkets föreskrift om miljöhänsyn i jordbruket, SJVFS 2004:62, behöver du dokumentera hur du har beräknat grödornas kvävebehov utifrån förväntad skörd och riktiga för respektive gröda, se [bilaga 1](#). Du behöver också ta hänsyn till stallgödselels långsiktiga kväveeffekt, förfruktseffekt från föregående gröda, om du odlar på mulljord och hur mycket kväve som kommer från stallgödsel och andra organiska gödselmedel. Oftast kan du ange dessa uppgifter i ett växtodlingsprogram. Har du inte tillgång till ett program behöver du dokumentera uppgifterna enligt [bilaga 1](#) på annat sätt.

## 2 Gödselmedel

### 2.1 Mineralgödsel

#### 2.1.1 Kvävegödselmedel med olika egenskaper

Enkla kvävegödselmedel (vanligen innehållande svavel) står för ungefär två tredjedelar av kvävetillförseln via mineralgödsel (Jordbruksverket, 2020a).

Dessa gödselmedel innehåller oftast lika delar ammonium och nitratkväve. **NS 27-3 eller NS 27-4** är exempel på sådana produkter. Nitratkvävet löses i markvätskan och kan därför lätt transporteras till rötterna för upptag. Ammoniumkvävet däremot kan fastläggas och behöver omvandlas till nitrat för att kunna transporteras i marken. Även **N<sub>34</sub>** består av ammoniumnitrat, men saknar svavel. Detta gödselmedel används i mindre omfattning.

**Kalksalpeter (N<sub>15,5</sub>)** innehåller bara nitratkväve. Produkten är löslig och kan snabbt transporteras till rötterna. Den har också en säkrare effekt vid torr väderlek. Kalksalpeter används främst för kompletteringsgödsling.

**Urea (N<sub>46</sub>)** är världens mest använda kvävegödselmedel, men används inte i någon större utsträckning i norra Europa på grund av sin långsammare effekt. Urea måste omvandlas i flera steg innan kvävet kan transporteras i marken och tas upp av grödorna.



**Bild 6.** Det vanligaste kvävegödselmedlet är ammoniumnitrat.  
**Foto:** Mårten Svensson

Det förekommer också andra kväveprodukter som används i mindre omfattning. **Ammonsulfat (NS 21-24)** innehåller enbart ammoniumkväve medan **Sulfammo 22** innehåller både ammonium och ureakväve.

Att gödsla med flytande produkter är inte så vanligt i Sverige. Som exempel kan nämnas **N<sub>30</sub>** och **flytande NS 27-3**. Flytande NS 27-3 innehåller dessutom ammoniumtiosulfat. Tiosulfatdelen bromsar upp omvandlingen från urea till ammoniumkväve. **NS 30-7** är en blandning av ammoniumnitrat och ammonsulfat.

I försöksserien L3-2300 som låg 2016–2018 jämfördes effekten av olika kvävegödselmedel. Resultaten visar att för att nå samma kväveskörd är kvävebehovet ungefär lika stort för (NS 27-4), **N<sub>34</sub>** och urea. För kalksalpeter behövdes mindre kväve jämfört med Axan för att nå samma kväveskörd, för sulfammo något mer och för flytande NS 27-3 ytterligare mer (Jönsson & Hansson, 2018). Äldre försök har dock visat att vid gödsling av urea i höstsäd är kväveeffekten sämre jämfört med gödselmedel baserade på ammoniumnitrat. I vårsäd där gödselmedlet myllas ner är effekten däremot jämbördig även i äldre försök.

De olika kvävegödselmedlen påverkar markens pH-värde på olika sätt och olika mycket. Läs mer i [kapitel 8.2](#).

#### 2.1.2 Sammansatta gödselmedel beroende på ändamål

**NPK-gödselmedel**, oftast med tillsats av svavel (S), har ett brett användningsområde.

Vårsådda grödor får en god start om du kombisår en NPK-produkt anpassad efter grödans behov samt markvärden för fosfor och kalium. Ofta är det lämpligt att grundgödsla med NPK för att sedan komplettera med anpassad mängd kvävegödselmedel.



Även till höstsådda grödor används NPK-gödselmedel. De tillförs då i samband med sådd alternativt vid första gödslingstillfället på våren. Höstgödsling med NPK rekommenderas i första hand till höstoljeväxter. Stråsåden behöver mindre kväve på hösten och klarar sig ofta utan mineralgödselkväve.

Det finns också mer skräddarsydda NPK-produkter med tillsats av natrium (Na), magnesium (Mg) och/eller mikronäringsämnen. Dessa gödselmedel är främst avsedda för oljeväxter, sockerbeter och frilandsgrönsaker.

NPK-produkter står för ungefär 32 % av allt kväve, 72 % av all fosfor och 77 % av allt kalium som säljs via mineralgödsel i Sverige (Jordbruksverket, 2020a).

Om markens innehåll av fosfor och kalium är lågt rekommenderas höstgödsling med dessa näringsämnen till höstsåden. Aktuella gödselmedel är till exempel **P20**, **PK 11–21** eller **NP 12–23 (MAP)**.

NP 12–23 används, förutom vid gödsling i samband med höstsådd, också ofta vid startgödsling till majs på våren.

Enkla kaliumgödselmedel, till exempel kaliumklorid, är främst aktuella i situationer där du inte kan trygga kaliumtillgången i marken på annat sätt. Läs mer om kalium i [kapitel 6](#).

### 2.1.3 Välj gödselmedel med låg klimatpåverkan

En stor del av klimatavtrycket i växtodlingen kommer från användningen av mineralgödsel, och då framför allt tillverkningen av kvävegödselmedel. Du kan minska odlingens påverkan på klimatet drastiskt genom att välja produkter som är tillverkade med bästa möjliga teknik (BAT – Best Available Technique). Klimatavtrycket från olika gödselmedel uttrycks som kg koldioxid-ekvivalenter per kg kväve (kg CO<sub>2</sub>e/kg N). Klimatavtrycket har de senaste åren halverats för många kvävegödselmedel. Det finns dock fortfarande vissa tillverkare som använder sig av äldre teknik med höga utsläpp av växthusgaser. Nästa steg för att minska klimatpåverkan är tillverkning av kvävegödselmedel med fossilfri energi. 2023 levererades de första volymerna till svensk marknad.

### 2.1.4 Regler för spridning av mineralgödsel

Det svenska regelverket för gödselspridning gäller i huvudsak stallgödsel och andra organiska gödselmedel. I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket, SJVFS 2004:62 (Jordbruksverket, 2004), vad avser växtnäring finns några regler som gäller mineralgödsel också.

#### 2.1.4.1 Hela landet – bruka ned urea inom 4 timmar

Mineralgödsel som innehåller urea ska du mylla eller bruka ned inom 4 timmar vid spridning på obevuxen mark.



### 2.1.4.2 Känsliga områden – sprid inte gödsel för nära sjöar och vattendrag

Inom känsliga områden får gödselmedel inte spridas närmare än två meter från fältkant som gränsar till vattendrag eller sjö eller på jordbruksmark som gränsar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överstiger 10 %. Under perioden 1 november–28 februari får inga gödselmedel spridas i känsliga områden.

Du får tillföra högst 60 kg lättillgängligt kväve per hektar inför sådd av höst-oljeväxter och högst 30 kg lättillgängligt kväve per hektar inför sådd av övriga höstgrödor. Du ska anpassa mängden lättillgängligt kväve som du tillför till grödornas behov på hösten.

## 2.2 Stallgödsel

Stallgödsel består av träck, urin, vatten, foderrester och strömedel i olika proportioner. Grovt brukar man dela in stallgödseln i urin, flyt-, klet-, fast- och djupströgödsel beroende på konsistens och hanteringsegenskaper (tabell 2).

Fjäderfärgödsel har annorlunda egenskaper jämfört med annan stallgödsel. Värdena i tabell 2 kan därför inte tillämpas på fjäderfärgödsel. Bland annat krävs det betydligt högre ts-halt för att den ska kunna staplas till angiven höjd. Volymvikten är också högre. Eftersom fåglar utsöndrar en stor del av kvävet som urinsyra är andelen ammoniumkväve liten i färsk gödsel och gödsel som lagrats torrt, men den ökar om gödseln fuktas upp.

**Tabell 2.** Egenskaper hos olika typer av stallgödsel. Värdena i tabellen kan inte tillämpas på fjäderfärgödsel.

Gödselslag	Ts-halt (%)	pH-värde	Andel NH <sub>4</sub> -N (%) <sup>a)</sup>	Ungefärlig C/N-kvot	Volymvikt (kg/m <sup>3</sup> )	Hanterings-egenskaper
Urin	1–5	7,5–9	90	2	1 000	Pumpbar
Flytgödsel	3–12	6,5–8	50–70	<10	1 000	Pumpbar
Kletgödsel	12–16	7–8,5	40–50	12	900	Flyter ut
Kletgödsel	15–20	7–8,5	40–50	15	900	Inte helt stapelbar
Fastgödsel	18–25	7,5–9	25	20	750	Kan staplas >1 m
Djupströgödsel	>25	7,5–9	10	30	500	Kan staplas >2 m

a) Andelen NH<sub>4</sub>-N avser procent av totalt kväveinnehåll. Där det finns intervall avser den lägre siffran nötgödsel och den högre grisgödsel.

### 2.2.1 Räkna ut behovet av lagringskapacitet

Hur mycket gödsel som produceras och gödselns egenskaper varierar beroende på bland annat djurslag, foderstat, inhysningssystem, gödselhantering, mängd och typ av strömedel och intensitet i produktionen. I tabell 3 hittar du normaltal för hur mycket gödsel som produceras från olika djurslag. Du kan använda värdena i tabellen för att räkna fram behovet av lagringskapacitet,

men i praktiken kan gödselmängden variera. För flytgödsel och urin kan även en liten förändring i ts-halt ha stor inverkan på gödselvolymen. Var uppmärksam på detta när du beräknar behovet av lagringskapacitet. I beräkningsprogrammet Vera går det att göra mer gårdsanpassade beräkningar. Mer information om Vera hittar du på [greppa.nu/vera](https://greppa.nu/vera).

### Så beräknas schablonvärdena

När vi har räknat fram schablonvärdena för gödselproduktion och behov av lagringskapacitet har vi summerat träck- och urinproduktion, strö-tillsats, vattenspill, tvättvatten och vattentillskott via nederbörd. Vi har också tagit hänsyn till omsättningsförluster vid lagring av fast- och djupströgödsel. När vi har räknat fram fördelningen av torrsubstans (ts), kväve, fosfor och kalium mellan fastgödsel och urin har vi för mjölkkor räknat med att 25 % av urinen suggs upp av ströet och hamnar i fastgödseln medan resten hamnar i urinbehållaren. För kletgödsel har vi räknat med att andelen urin som suggs upp är 50 %.

### Regnvatten påverkar gödselvolymen

I schablonvärdena ingår ett vattentillskott via nederbörd på 300 mm (halva årsnederbörden). I en 3 meter djup flytgödsel- eller urinbehållare motsvarar det en utspädning av gödseln med 10 %. Tillskottet via dräneringsvatten från gödselplatta som leds till urin- eller flytgödselbehållaren baseras på antagandet att den fasta gödseln lagras till 1 meters höjd, det vill säga att plattan är lika många kvadratmeter stor som lagringsbehovet för fastgödseln i kubikmeter. Tak över behållaren minskar behovet av lagringskapacitet med cirka 10 % för flytgödsel och 5 % för urin. I ett fastgödselsystem minskar tak över gödselplattan lagringsbehovet i urinbrunnen med cirka 40 % för nöt och 20 % för gris.

### Gödselns torrsubstanshalt påverkar behovet av lagringskapacitet

Hur stort behovet av lagringskapacitet är beror till stor del på gödselns torrsubstanshalt. För fasta gödselslag har också volymvikten och hur stora omsättningsförlusterna blir vid lagring stor betydelse. Baserat på gödselanalyser har vi antagit rimliga ts-halter för respektive djur- och gödselslag och på så sätt standardiserat mängden gödsel som varje djurkategori producerar.



**Bild 7.** Beroende på djurslag, foderstat, strömedel och gödselhantering kan du beräkna hur mycket gödsel som produceras och vad den innehåller.

**Foto:** Janne Andersson

Tabell 3 visar normalt för producerad mängd gödsel för olika djurslag och lagringstider. För mjölkkor tillkommer 200–450 liter diskvatten per ko och månad. Den större vattenmängden gäller för stallar med mjölkkningsrobot.

**Tabell 3. Normalt för producerad mängd gödsel (inklusive normal strömängd och nederbörd) för olika djurslag och lagringstider. Värdena för fast- och djupströgödsel avser nettomängder efter omsättningsförluster.**

Djurslag	Producerad mängd gödsel per djurplats och år vid olika lagringstid (m <sup>3</sup> )											
	Fastgödsel <sup>a)</sup>				Urin + gödselvatten				Flytgödsel <sup>b)</sup>			
	Lagringstid (antal månader)				Lagringstid (antal månader)				Lagringstid (antal månader)			
	6	8	10	12	6	8	10	12	6	8	10	12
<b>Nöt</b>												
Mjölko, 8 000 kg ECM <sup>d)</sup> /år	7,1	9,5	11,9	14,3	4,4	5,9	7,3	8,8	14,5	19,4	24,2	29,1
Mjölko, 10 000 kg ECM <sup>d)</sup> /år	7,2	9,6	12,0	14,4	4,5	6,0	7,5	9,0	14,8	19,7	24,6	29,5
Mjölko, 12 000 kg ECM <sup>d)</sup> /år	8,0	10,7	13,4	16,1	5,1	6,8	8,5	10,2	16,6	22,1	27,6	33,1
Diko inkl. kalv upp till 6 mån <sup>e)</sup>	3,9	5,2	6,5	7,8	2,8	3,7	4,6	5,5	7,3	9,7	12,2	14,6
Mellankalv 2–8 mån, 2,0 omg/år	2,3	3,1	3,9	4,7	1,6	2,1	2,6	3,2	4,1	5,5	6,8	8,2
Kviga mjölkras <1 år (2–12 mån), 1,0 omg/år	1,6	2,1	2,6	3,1	1,0	1,4	1,7	2,1	2,7	3,7	4,6	5,5
Kviga mjölkras >1 år (12–24 mån), 1,0 omg/år	2,9	3,8	4,8	5,7	2,2	2,9	3,6	4,4	5,4	7,2	9,0	10,8
Intensiv tjur mjölkras, 2–16 mån, 0,86 omg/år	2,6	3,5	4,4	5,3	1,8	2,4	3,0	3,6	4,7	6,2	7,8	9,4
Extensiv tjur mjölkras, 2–20 mån, 0,67 omg/år	3,0	4,0	4,9	5,9	2,0	2,6	3,3	4,0	5,3	7,1	8,9	10,6
Stut mjölkras, 2–24 mån, 0,55 omg/år	2,7	3,7	4,6	5,5	2,1	2,8	3,5	4,2	5,1	6,9	8,6	10,3
Intensiv tjur lätt köttaras, 6–13 mån, 1,0 omg/år	1,8	2,3	2,9	3,5	1,2	1,6	1,9	2,3	3,2	4,2	5,3	6,3
Extensiv tjur lätt köttaras 6–18 mån, 1,0 omg/år	3,4	4,5	5,6	6,7	2,2	3,0	3,7	4,5	6,1	8,2	10,2	12,2
Intensiv tjur tung köttaras, 6–13 mån, 1,0 omg/år	2,0	2,7	3,3	4,0	1,4	1,8	2,3	2,7	3,6	4,8	6,0	7,3
Extensiv tjur tung köttaras 6–18 mån, 1,0 omg/år	3,7	4,9	6,1	7,4	2,5	3,3	4,1	5,0	6,7	9,0	11,2	13,5
<b>Gris</b>												
Sugga i produktion, 2,2 omg/år	1,5	2,0	2,5	3,0	3,0	4,0	4,9	5,9	4,7	6,3	7,8	9,4
Digivande sugga (inkl. 10,7 smågrisar till 10 kg per omgång), 8,7 omg/år	1,9	2,5	3,1	3,7	3,1	4,2	5,2	6,3	5,5	7,3	9,2	11,0
Sinsugga, 6,5 omg/år	0,6	0,8	1,0	1,2	1,1	1,5	1,9	2,3	1,7	2,3	2,8	3,4
Slaktgris 3,0 omg/år	0,4	0,5	0,6	0,7	1,1	1,4	1,8	2,1	1,6	2,1	2,6	3,1
<b>Övriga djurslag</b>												
Värphöns, frigående 100 st	2,1	2,7	3,4	4,1					5,1	6,8	8,5	10,2
Unghöns 100 st, 2,2 omg/år	0,6	0,8	1,0	1,2					1,5	2,0	2,5	3,0

Djurslag	Djupströgödsel <sup>d)</sup> Lagringstid (antal månader)			
	6	8	10	12
<b>Nöt</b>				
Mjölkkor, 8 000 kg ECM <sup>d)</sup> /år	14,4	19,2	23,9	28,7
Mjölkkor, 10 000 kg ECM <sup>d)</sup> /år	14,6	19,5	24,4	29,3
Mjölkkor, 12 000 kg ECM <sup>d)</sup> /år	15,3	20,3	25,4	30,5
Diko inkl. kalv upp till 6 mån <sup>e)</sup>	3,9	5,2	6,5	7,8
Mellankalv 2–8 mån, 2,0 omg/år	2,8	3,7	4,6	5,6
Kviga mjölkras <1 år (2–12 mån), 1,0 omg/år	1,5	2,0	2,5	3,1
Kviga mjölkras >1 år (12–24 mån), 1,0 omg/år	3,1	4,2	5,2	6,3
Intensiv tjur mjölkras, 2–16 mån, 0,86 omg/år	3,8	5,1	6,3	7,6
Extensiv tjur mjölkras, 2–20 mån, 0,67 omg/år	3,8	5,0	6,3	7,5
Stut mjölkras, 2–24 mån, 0,55 omg/år	3,0	4,0	5,0	6,0
Intensiv tjur lätt köttras, 6–13 mån, 1,0 omg/år	2,5	3,3	4,2	5,0
Extensiv tjur lätt köttras 6–18 mån, 1,0 omg/år	4,5	6,0	7,5	9,1
Intensiv tjur tung köttras, 6–13 mån, 1,0 omg/år	2,9	3,9	4,9	5,9
Extensiv tjur tung köttras 6–18 mån, 1,0 omg/år	5,1	6,8	8,5	10,2
<b>Gris</b>				
Sugga i produktion, 2,2 omg/år	2,6	3,5	4,3	5,2
Digivande sugga (inkl. 10,7 smågrisar till 10 kg per omgång), 8,7 omg/år	2,7	3,7	4,6	5,5
Sinsugga, 6,5 omg/år	1,4	1,9	2,4	2,9
<b>Övriga djurslag</b>				
Häst, fritid (500 kg)	5,0	6,6	8,3	9,9
Häst, ponny (300 kg)	3,5	4,7	5,9	7,1
Får + 1,8 lamm, 6 mån stallperiod	1,0			
Slaktkyckling 100 st, 7,0 omg/år	0,7	1,0	1,2	1,5
Kalkon 100 st, 2,3 omg/år	2,4	3,1	3,9	4,2

a) Volymvikt för fastgödsel: Nöt, sugga och slaktgris 750 kg/m<sup>3</sup>; värphöns och unghöns 900 kg/m<sup>3</sup>.  
Ts-halt: Nöt 18 %, gris 24 %, värphöns och unghöns 30 %.

b) Volymvikt för flytgödsel: 1 000 kg/m<sup>3</sup>. Ts-halt före tillskott av nederbörd: Mjölkkor 9 %, övriga nöt 10 %, slaktgris 6 %, sugga 8 %, sinsugga 10 %, värphöns 12 %.

c) Volymvikt för djupströgödsel: Slaktkyckling och kalkon: 600 kg/m<sup>3</sup>, övriga djurslag: 500 kg/m<sup>3</sup>. Ts-halt: Nöt 28 %, gris 30 %, slaktkyckling och kalkon 50 %.

d) ECM = energikorrigerad mjölk.

e) Viktat medelvärde för lätt och tung köttras samt vinter- och vårkalvning (4/9 lätt ras vårkalvning, 2/9 lätt ras vinterkalvning, 2/9 tung ras vårkalvning och 1/9 tung ras vinterkalvning).

## 2.2.2 Hur mycket växtnäring innehåller stallgödseln?

Tabell 4 visar mängden kväve, fosfor och kalium som djuren utsöndrar per djurplats och år (brutto före förluster). Värdena är beräknade utifrån standardfoderstater för varje djurslag. Från 2011 och framåt har vi uppdaterat foderstaterna för mjölkkor, gris och fjäderfä och nu i år även för dikor och ungnöt. Beräkningarna för nötkreatur och grisar är baserade på Jordbruksverkets rapporter 2001:13 för gris (Jordbruksverket, 2001) och 1995:10 för nöt (Jordbruksverket, 1995).

Utfodringen och hur produktionen bedrivs varierar mellan olika gårdar och det påverkar mängden växtnäring i stallgödseln, både per djurplats och per ton gödsel. En effektiv produktion där foder och andra insatsmedel utnyttjas väl ger mindre näring kvar i gödseln eftersom en större andel hamnar i produkterna som säljs (mjölk, kött, ägg, livdjur etc.). I beräkningsprogrammet Vera kan du välja om du vill räkna på schablonvärden eller göra en stallbalans (växtnäringsbalans för djurhållningen) baserad på den egna gårdens foderstat och produktion. Med en stallbalans får du mer exakta värden på hur mycket kväve, fosfor och kalium gödseln på just din gård innehåller.

**Tabell 4.** Årsproduktion av kväve (N), fosfor (P) och kalium (K) i färsk träck och urin från olika djurslag.

Djurslag	Innehåll av växtnäring (kg/djurplats och år)		
	N	P	K
<b>Nöt</b>			
Mjölkkko, 8 000 kg ECM <sup>a)</sup> /år	132	15,2	114
Mjölkkko, 10 000 kg ECM <sup>a)</sup> /år	142	16,5	106
Mjölkkko, 12 000 kg ECM <sup>a)</sup> /år	178	21,0	117
Diko inkl. kalv upp till 6 mån <sup>b)</sup>	76	6,6	76
Mellankalv 2–8 mån, 2,0 omg/år	38	5,9	20
Kviga mjölkras <1 år (2–12 mån), 1,0 omg/år	24	3,9	24
Kviga mjölkras >1 år (12–24 mån), 1,0 omg/år	56	8,1	59
Intensiv tjur mjölkras, 2–16 mån, 0,86 omg/år	50	7,0	34
Extensiv tjur mjölkras, 2–20 mån, 0,67 omg/år	49	6,2	47
Stut mjölkras, 2–24 mån, 0,55 omg/år	51	7,1	54
Intensiv tjur lätt köttras, 6–13 mån, 1,0 omg/år	34	5,1	20
Extensiv tjur lätt köttras 6–18 mån, 1,0 omg/år	60	7,6	54
Intensiv tjur tung köttras, 6–13 mån, 1,0 omg/år	40	6,0	24
Extensiv tjur tung köttras 6–18 mån, 1,0 omg/år	68	7,5	61
<b>Gris</b>			
Sugga, 2,2 omg/år (inkl. 23 smågrisar till 30 kg)	35	6,7 <sup>c)</sup>	13
Slaktgris, 3,0 omg/år	10	1,6 <sup>c)</sup>	4,3
<b>Övriga djurslag</b>			
Häst, fritid (500 kg)	48	9	58
Häst, ponny (300 kg)	33	6,4	42
Får inkl. 1,8 lamm	14	2,0	19
Värphöns, frigående 100 st	71	15,5 <sup>c)</sup>	24
Värphöns, EKO 100 st	79	18,3	17
Unghöns 0–16 veckor, 100 st, 2,2 omg/år	23	6,0 <sup>c)</sup>	7,6
Unghöns 0–16 v EKO 100 st, 2,2 omg/år	29	6,0	6,0
Slaktkyckling 100 st, 7,0 omg/år	39	7,6 <sup>c)</sup>	15
Kalkon 100 st, 2,3 omg/år (medeltal av höna 0–10 veckor och tupp 0–19 veckor)	125	35	43

a) ECM = energikorrigerad mjölk.

b) Viktat medelvärde för lätt och tung köttras samt vinter- och vårkalvning (4/9 lätt ras vårkalvning, 2/9 lätt ras vinterkalvning, 2/9 tung ras vårkalvning och 1/9 tung ras vinterkalvning).

c) Förutsätter användning av foder med tillsats av fytas. Om fytas inte används blir fosforinnehållet i gödseln högre.

Tabell 5 visar riktvärden för växtnäringsinnehåll per 10 ton gödsel efter lagring och ungefärlig kväveeffekt vid vårspridning. I praktiken är dock variationerna stora. Använd därför tabellvärdena med försiktighet.

**Tabell 5.** Riktvärden för växtnäringsinnehåll i stallgödsel efter lagring och ungefärlig kväveeffekt vid vårspridning. Ts-halterna i flytgödsel avser ts-halter före vattentillskott via nederbörd.

Gödseltyp	Växtnäringsinnehåll (kg/10 ton)			Andel ammoniumkväve (% av tot-N)	Ungefärlig kväveeffekt vid vårspridning (kg per 10 ton)
	Tot-N	P	K		
<b>Fastgödsel</b>					
Fastgödsel, nöt	52	15	50	25	10
Fastgödsel, gris <sup>a)</sup>	65	25	25	25	10
Fastgödsel, höns, 30 % ts <sup>b)</sup>	150	41	65	60	90
Fastgödsel, höns, 60 % ts <sup>b)</sup>	275	88	140	40	110
<b>Djupströ/ströbädd</b>					
Djupströgödsel, nöt	54	15	100	10	5
Djupströgödsel, gris	48	15	45	10	5
Djupströgödsel, häst	49	15	100	10	5
Djupströgödsel, får	95	15	200	10	5
Ströbäddsgödsel slaktkyckling, 50 % ts	380	86	170	20	150
Ströbäddsgödsel kalkon, 50 % ts	360	125	155	20	140
<b>Urin</b>					
Urin, nöt, täckt behållare <sup>c)</sup>	35	<1	50	90	25
Urin, gris, täckt behållare <sup>c)</sup>	18	2	12	90	15
<b>Flytgödsel</b>					
Flytgödsel, nöt, 9 % ts <sup>d)</sup>	43	6	38	50	15
Flytgödsel, gris, 8 % ts <sup>e)</sup>	36	8	19	70	20
Flytgödsel, gris, 6 % ts <sup>e)</sup>	27	6	14	70	15
Flytgödsel, höns, 12 % ts	60	15	24	75	45

a) avser gödsel från suggor – gödsel från slaktgris har något högre kväveinnehåll.

b) avser kletig respektive torr fastgödsel från värphöns.

c) om urinen lagras utan täckning är kväveeffekten cirka 30 % lägre.

d) avser gödsel från mjölkkor – gödsel från övriga nöt har något lägre kväveinnehåll och högre kaliuminnehåll.

e) avser gödsel från slaktgris – gödsel från suggor har något lägre kväveinnehåll.



**Bild 8.** Foderstaten påverkar hur mycket växtnäring gödseln innehåller. Om du inte använder foder med tillsats av fytas till grisar eller fjäderfä blir fosforinnehållet högre än vad som anges i tabell 5.

Foto: Janne Andersson

### 2.2.3 Effekten varierar beroende på gödselslag, spridningsteknik och tidpunkt

Stallgödsel har en mer varierande och i vissa fall långsammare kväveeffekt än mineralgödsel. Hur snabbt du får effekt av stallgödseln beror bland annat på hur mycket ammoniumkväve respektive organiskt bundet kvävegödseln innehåller. Andelen växttillgängligt kväve varierar beroende på gödselslag, från ca 10 % för djupströgödsel till 90 % för urinen – se tabell 2 och 5. Resten av kvävet är organiskt bundet och frigörs allt eftersom det organiska materialet bryts ner.



Färsk djupströgödsel har svag kväveeffekt medan komposterad djupströgödsel kan ge ungefär lika mycket kväve som fastgödsel. Kletgödselns kväveeffekt ligger någonstans mittemellan fast och flytgödsel. Torvinblandning minskar ammoniakavgången från både stall och lager för fasta gödselslag och kan förbättra gödselns kväveeffekt ytterligare.

När på året och till vilken gröda du sprider gödseln har också stor betydelse för kväveutnyttjande och förluster. Vid sommarspridning på vall kan kväveförlusterna via ammoniakavgång bli stora.

### 2.2.3.1 Analysera flytgödsel och urin

Genom att analysera gödseln får du ett bättre underlag för att bedöma kväveeffekten. Skillnaderna mellan olika gårdar är ofta stora och kväveinnehållet kan också variera under året på en och samma gård.

Oftast är det aktuellt att analysera gödseln i samband med vårspridning. Du kan analysera gödselns innehåll av ammoniumkväve själv med hjälp av en kvävemätare för gårdsbruk, den så kallade ”kväveburken”. Du kan också skicka in ett gödselprov till ett laboratorium för analys.

Det är viktigt att gödseln är väl omblandad när du tar ut provet, särskilt om innehållet av ts, fosfor och totalkväve ska analyseras. Eftersom det är svårt att ta ut representativa prover av fast och kletgödsel rekommenderar vi bara analyser av flytgödsel och urin. Instruktioner för provtagning och hantering av gödselprover, beställning av provburkar och följesedlar hittar du på laboratoriernas webbplatser.

För de flesta gödselslag kan du också räkna fram stallgödselns kväveeffekt utifrån innehållet av ammoniumkväve efter avdrag för förluster i stall, under lagring och i samband med spridning. Undantaget är fast fjäderfägödsel där en stor andel av kvävet kan finnas i form av urinsyra, vilket ger en högre kväveeffekt än vad innehållet av ammoniumkväve indikerar. Kol/kväve-kvoten har också betydelse. Läs mer om det och om kväveeffekten hos olika typer av stallgödsel och andra organiska gödselmedel i skriften [Att sprida organiska gödselmedel](#) (Delin & Engström, 2021). Du kan göra beräkningar av kväveeffekt och kväveförluster via ammoniakavgång och utlakning med hjälp av beräkningsprogrammet Vera som du hittar på [greppa.nu](http://greppa.nu).

### 2.2.3.2 Sprid gödsel med stor andel lättillgängligt kväve på våren

Flytgödsel, urin och biogödsel ger normalt bäst effekt vid spridning på våren och i växande gröda eftersom de innehåller en stor andel lättillgängligt kväve. Det gäller även fjäderfägödsel. I försök har man fått mycket goda effekter av grisflytgödsel som bandspridits på våren i växande höstgröda (Hammarstedt, 2013). Det ammoniumkväve som finns kvar efter spridningsförluster i flytgödsel från gris antas ha lika stor effekt som mineralgödselkväve medan ammoniumkvävet i nötflytgödsel antas ha 75 % effekt jämfört med mineralgödselkväve.

Vid höstspredning av flytgödsel, urin och biogödsel kan kväveeffekten variera, men som regel är den lägre än på våren. Under senhösten och vintern är det stor risk för förluster genom utlakning och denitrifikation om det finns mycket lättillgängligt kväve i marken. Därför bör du i möjligaste mån undvika eller i varje fall begränsa höstspredning av dessa gödselslag, särskilt på obevuxen mark och till andra grödor än höstoljeväxter och vall. Höstoljeväxter kan dock ta upp en hel del kväve på hösten. Sprider du inför sådd av höstoljeväxter eller till gräsdominerad vall kan du få ett godtagbart kväveutnyttjande.

Sprider du däremot fast och djupströgödsel med liten andel ammoniumkväve kan växtnäringseffekten bli lika god vid spridning på hösten som på våren. Risken för förluster vid höstspredning kan uppvägas av att en del av det organiskt bundna kvävet omsätts i marken under höst och vår och blir tillgängligt för grödan snabbare än om du sprider gödseln på våren. Om du sprider fast- eller djupströgödsel på våren kommer en del kväve att frigöras på hösten efter att grödan är skördad. Därför bör du bara sprida sådan gödsel på våren om du planerar en höstväxande gröda eller har sått in vall eller en fånggröda som fortsätter växa på hösten.

Förlusterna och därmed också kväveeffekten av höstspridd stallgödsel påverkas av nederbörd, temperatur, jordart, geografiskt läge och om marken är bevuxen under höst och vinter. Störst risk för utlakningsförluster är det på lätta jordar i varmt, nederbördsrikt klimat. På lerjordar kan de gasformiga kväveförlusterna via denitrifikation vara betydande. Om du vill räkna på stallgödselns kväveeffekt och ekonomiska värde vid olika spridningstidpunkter kan du använda beräkningsverktyget Gödselkalkylen. Den finns på Greppa Näringens webbplats [greppa.nu](https://greppa.nu) och ingår också som en del i beräkningsverktyget Vera.

### *2.2.3.3 Minska förlusterna genom att sprida vid rätt tidpunkt och bruka ner gödseln snabbt*

En stor del av kväveförlusterna från stallgödsel sker via ammoniakavgång. Förluster uppkommer i olika led i hanteringskedjan, från stall, lager och i samband med spridning, men med rätt åtgärder går det att minska dem. Läs mer om detta i skriften ”Ta vara på kvävet! – God jordbrukarsed för att begränsa ammoniakförluster” (Durling m.fl., 2023).

Ammoniakavgången vid spridning stod 2019 för 27 % av Sveriges samlade ammoniakutsläpp. Sprider du stallgödsel vid mulet, svalt och fuktigt väder och brukar ned gödseln snabbt kan du hålla ammoniakförlusterna på en rimlig nivå. Det är helt avgörande för att du ska få god effekt av ammoniumkvävet. Efter spridning kan stora mängder kväve gå förlorat i form av ammoniak om du inte myllar eller brukar ner gödseln tillräckligt snabbt. Förlusterna blir särskilt stora vid soligt, blåsigt och varmt väder. Vid spridning på vall efter första skörd kan i ogynnsamma fall allt ammoniumkväve gå förlorat.



**Bild 9.** Genom att snabbt bruka ner gödseln efter spridning kan du begränsa ammoniakförlusterna. Då utnyttjas kvävet i stallgödseln bättre. **Foto:** Henrik Nätterlund

Om du sprider stallgödsel när marken är frusen kan kväveförlusterna via ammoniakavgång öka på grund av att gödseln inte kommer i tillräckligt god kontakt med markpartiklarna. Frusen mark innebär också större risk för fosforförluster via ytavrinning i samband med regn eller snabb snösmältning. För att minska risken att stallgödsel rinner av på markytan bör du undvika att sprida gödsel på frusen eller snötäckt mark eller där det är risk för ytavrinning eller stående vatten på fältet. Läs mer om regler kring detta i [avsnitt 2.2.4](#).

Om du brukar ner gödseln i nära anslutning till spridningen kan förlusterna vid vårspridning uppgå till 20 % av ammoniumkvävet för fastgödsel och urin och 10 % för flytgödsel. Om du inte brukar ner gödseln direkt blir förlusterna högre.

Sprider du i växande gröda ger bandspridning mindre ammoniakavgång och bättre kväveeffekt jämfört med bredspridning. Genom att gödseln läggs i strängar på marken och inte på bladverket blir den exponerade gödselytan mindre samtidigt som gödseln lättare tränger ner i marken där den kommer i kontakt med jordpartiklar.

Om du använder ytmylningsaggregat för att sprida flytgödsel på vall får du både lägre kväveförluster och bättre foderhygien. Läs mer om spridningsteknik i [kapitel 3](#).

Kväve från stallgödsel frigörs under hela säsongen, även efter att kväveupptaget i många grödor har upphört. Då finns det risk för att kvävet utlakas under påföljande höst och vinter. Störst är risken om du sprider djupströgödsel som inte är komposterad på våren eller senare under växtsäsongen. I sådana fall är det bra om du sår in vall eller en fånggröda. Det minskar risken för utlakningsförluster under hösten och vintern efter huvudgrödan. I [bilaga 2](#) och [3](#) hittar du scheman som visar när och till vilka grödor du bäst sprider stallgödsel beroende på gödselslag och jordart. [Bilaga 2](#) hanterar sand- och mojordar och [bilaga 3](#) lerjordar.

### 2.2.3.4 God effekt av fosfor och kalium i stallgödsel

Andelen oorganisk fosfor är cirka 90 % i flytgödsel och 50–80 % i fastgödsel. På lång sikt är fosfor i stallgödsel lika tillgänglig som i mineralgödsel, men på kort sikt brukar man räkna med att fosforeffekten är 60–70 % jämfört med mineralgödsel. Kalium förekommer främst i oorganisk form och är därmed lika tillgängligt som kalium i mineralgödsel. Liksom kväveinnehållet kan halterna av fosfor och kalium i stallgödsel avvika betydligt från schablonvärdena i [tabell 5](#). En variation på  $\pm 50$  % är inte ovanligt. Varierande ts-halt, foderstater och halter av fosfor och kalium i fodermedlen är de främsta orsakerna.



**Bild 10.** Bandspridning i växande gröda ger bättre kväveeffekt än bredspridning. När gödseln läggs i strängar på marken och inte på bladverket blir ammoniakavgången lägre genom att den gödselbemängda ytan minskar. Gödseln tränger också lättare ner i marken. **Foto:** Jens Blomquist

### 2.2.3.5 Räkna med övriga växtnäringsämnen också

Förutom kväve, fosfor och kalium innehåller stallgödseln även kalcium, magnesium, svavel och mikronäringsämnen. I [tabell 6](#) kan du se ungefär hur mycket av dessa ämnen gödseln innehåller. Värdena är i huvudsak hämtade från Naturvårdsverkets rapport 4974 (Steineck m.fl., 1999) och JTI-rapport Lantbruk & industri 349 (Salomon m.fl., 2006), men är här omräknade enligt angivna ts-halter.

Fodertillsatser, till exempel zink (Zn), påverkar gödselns innehåll av mikronäringsämnen och tungmetaller. Foder som odlats på jord med lågt innehåll av mikronäringsämnen ger mikronäringsfattig gödsel.

Stallgödsel innehåller en del svavel, men andelen växttillgängligt svavel är liten eftersom det mesta är bundet i organisk form. På sikt kan du räkna med att svavel och kväve mineraliseras från stallgödseln i förhållandet 1:10, vilket är rätt proportioner för de flesta grödor utom de mest svavelkrävande grödorna, till exempel oljväxter. Läs mer om magnesium, svavel och mikronäringsämnen i [kapitel 7](#).

**Tabell 6.** Riktvärden för innehåll av kalcium, magnesium, svavel och mikro-näringsämnen i stallgödsel. Värdena avser gödsel från konventionell djurhållning. Stallgödsel från ekologisk nötkreaturshållning innehåller ofta något mer kalcium men mindre svavel, magnesium, koppar och mangan.

Växtnäringsämne	Näringsinnehåll i stallgödsel (kg/10 ton)			
	Nöt		Gris	
	Fastgödsel 18 % ts	Flytgödsel 9 % ts	Fastgödsel 24 % ts	Flytgödsel 8 % ts
Kalcium (Ca)	23	14	60	21
Magnesium (Mg)	11	6	14	6
Svavel (S)	9	6	14	6
Bor (B)	0,04	0,03	0,02	0,02
Koppar (Cu)	0,06	0,04	0,31	0,14
Mangan (Mn)	0,41	0,22	0,63	0,24

### 2.2.3.6 Ta hänsyn till stallgödseleffekt

Stallgödseleffekten innehåller mullämnen som bidrar till att bygga upp markens struktur och bördighet. Det organiskt bundna kvävet frigörs successivt och behöver mineraliseras innan det kan utnyttjas av växterna. De mer svårnedbrytbara fraktionerna bidrar till att bygga upp markens mullhalt och har en långsam verkan som varar i flera år.

Vid regelbunden tillförsel av stallgödsel motsvarande ett ton torrsubstans per hektar och år i minst 30 år ökar markens kväveleverans med cirka 10 kg kväve per hektar och år genom den långsiktiga stallgödseleffekten. Efter cirka 10 års regelbunden tillförsel av samma mängd stallgödsel kan du räkna med att kväveleveransen ökar med 5 kg per hektar och år. Det går också att beräkna långsiktig kväveeffekt utifrån hur många djur per hektar som funnits på gården under de senaste 30 åren, se [tabell 7](#).

**Tabell 7.** Långsiktig kväveeffekt efter minst 30 års djurhållning med angivet djurantal. Värdena gäller i all växtodling utom vall. I kväverekommendationerna till vall ingår redan en långsiktig kväveeffekt motsvarande 20 kg per hektar och år.

Antal djur per hektar (motsvarar 1 djurenhet)	Långsiktig kväveverkan (kg/hektar och år)
1 mjölkko	20
6 kalvar, 1–6 månader	21
3 övriga nöt, 6 månader eller äldre	22
10 slaktgrisplatser	15
3 suggor i produktion	18
100 värphöns	10
200 slaktkycklingar	10

När du ska räkna ut grödornas kvävebehov enligt [bilaga 1](#) bör du justera givan i alla grödor utom vall för att ta hänsyn till den långsiktiga stallgödseleffekten. För vall ingår den långsiktiga stallgödseleffekten redan i rekommendationerna med 20 kg kväve per hektar, se [tabell 23](#). Anledningen till detta är att vallodling utan stallgödsel är ovanligt och de flesta vallgödslingsförsök har legat på platser med regelbunden stallgödsetillförsel. Vid lägre eller högre



djurtäthet än en djurenhet per hektar gör du ett tillägg eller avdrag i kväverekommendationen till vall i proportion till värdena i [tabell 7](#). Om det tidigare bara varit 0,5 djurenheter per hektar bör du alltså höja kvävegivan till vall med 10 kg kväve per hektar jämfört med vad som anges i [tabell 23](#). Genom att anlägga en nollruta får du en god bild av markens kväveleverans på det aktuella fältet. Då ingår både förfruktseffekt, långsiktig stallgödseffekt, mullhalt, årsmån och andra påverkande faktorer.

### 2.2.3.7 Anpassa givan till grödans behov

Stora stallgödselgivor innebär ökad risk för förluster och sämre växtnäringsutnyttjande. Generellt är det en god regel att anpassa givan till grödans behov och markens fosforinnehåll och tillföra måttliga givor av stallgödsel oavsett tidpunkt. Sprid inte större givor än att grödan kan utnyttja kvävet som frigörs under odlingssäsongen.

Du bör inte lägga mer än cirka 30 ton nötflytgödsel, 25 ton grisflytgödsel eller 20 ton urin per hektar vid vårspridning. Om du sprider i växande vall är det särskilt viktigt att hålla nere givorna med tanke på foderhygien. Vid höstspridning bör du minska givan med 5–10 ton per hektar för att minska risken för utlakning kommande höst och vinter. Du bör heller inte lägga mer än 30 ton fastgödsel per hektar. Fjäderfärgödsel är högkoncentrerad och innehåller mycket växttillgängligt kväve. Därför bör du endast sprida sådan gödsel på våren och då med en giva på max 7–8 ton per hektar. Förslag till hur du bör gödsla med stallgödsel till olika grödor finns i [bilaga 2](#) och [3](#).

Oftast är det lämpligt att anpassa stallgödselgivan till grödans fosforbehov och komplettera med kväve via mineralgödsel eller på annat sätt. Använd markkartan som ett hjälpmedel för att bedöma fosforbehovet. I dag finns teknik för att skapa tilldelningsfiler och styra stallgödselgivan inom fält efter till exempel markens fosforklass. Läs mer om spridningsteknik i [kapitel 3](#) och fosforgödsling i [kapitel 5](#).

## 2.2.4 Regler för spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring, SJVFS 2004:62 (Jordbruksverket, 2004), och Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket, SJVFS 2020:2 (Jordbruksverket, 2020b), innehåller regler för spridning av gödsel i jordbruksföretag. På [Jordbruksverkets webbplats](#) hittar du de aktuella versionerna.

Spridningsreglerna omfattar bland annat regler för hur mycket kväve och fosfor man får tillföra vid spridning av stallgödsel och andra organiska gödselmedel, begränsningar i när och hur gödsel får spridas, krav på skyddsavstånd vid gödselspridning intill sjöar och vattendrag i känsliga områden och förbud mot spridning av gödsel på naturbetesmarker. Gödsel får heller inte spridas så att den hamnar utanför åkern.

Vissa regler gäller i hela landet medan andra varierar beroende på om gården ligger i eller utanför känsligt område. I Skåne, Halland och Blekinge finns det också särskilda regler för att minska ammoniakavgången. Mer information om reglerna och vilka områden som betraktas som känsliga hittar du på



Jordbruksverkets webbplats, <https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/vaxtnaring>.

Kommunen kan också ställa mer långtgående krav inom till exempel detaljplanelagt område och vattenskyddsområde.

Skriften Gödsel och miljö 2022 (Lindgren, 2022) är en vägledning till regler om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (främst lagring och spridning av gödsel) som Jordbruksverket tagit fram. Du kan ladda ner den senaste versionen från [Jordbruksverkets webbutik](#).

Här nedan sammanfattar vi några av de viktigaste reglerna för spridning av stallgödsel. Du kan läsa mer om regler som gäller specifikt för slam i [kapitel 2.4.2](#).



**Bild 11.** Karta över Sveriges känsliga områden enligt nitratdirektivet. Grönfärgade områden är känsliga.

**Källa:** Jordbruksverket

#### 2.2.4.1 Hela landet – max 22 kg fosfor per hektar och år via organiska gödselmedel

Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får inte spridas i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar spridningsareal och år, räknat som ett genomsnitt på hela spridningsarealen under en femårsperiod.

Om det finns betesdjur på gården får du också räkna in betesmark i spridningsarealen i den omfattning som den bidrar till foderstaten på årsbasis. Om till exempel 20 % av djurens årliga foderintag kommer från betet får högst 20 % av spridningsarealen utgöras av betesmark.

##### I spridningsarealen får du inte räkna in:

- mark som ligger i träda
- mark där förbud mot spridning råder eller där spridning är olämplig, till exempel på grund av närhet till ytvatten eller vattentäkt.

#### 2.2.4.2 Hela landet – förbjudet att sprida gödsel i naturbetesmarker

För att värna den biologiska mångfalden är det enligt Statens jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur och kulturvärden i jordbruket, SJVFS 2020:2 (Jordbruksverket, 2020b) förbjudet att sprida gödsel i naturbetesmarker. Det är också förbjudet att sprida gödsel så att den hamnar utanför åkern.

#### 2.2.4.3 Känsliga områden – begränsningar under höst och vinter

Enligt EU:s nitratdirektiv måste alla medlemsländer peka ut känsliga områden. En översiktlig karta över nitratkänsliga områden i Sverige ser du i bild 11. Mer exakt vilka områden som ingår kan du se i [bilaga 1–3](#) i föreskriften SJVFS 2004:62 (Jordbruksverket, 2004). Vart fjärde år ser Jordbruksverket över vilka områden som ska ingå. Här nedan kan du se en kort sammanfattning av de viktigaste reglerna som gäller i känsliga områden. Det är vissa regler som endast gäller i Blekinge, Skåne och Halland.

**I alla känsliga områden gäller att:**

- gödselmedel inte får spridas närmare än två meter från fältkant som gränisar till vattendrag eller sjö\*
- gödselmedel inte får spridas på jordbruksmark som gränisar till vattendrag eller sjö och där markens lutning mot vattnet överskrider 10 %\*
- inga gödselmedel får spridas under perioden 1 november–28 februari\*
- det är förbjudet att sprida gödselmedel på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark\*
- kvävetillförseln via stallgödsel inte får överstiga 170 kg totalkväve per hektar och år, räknat som ett genomsnitt på hela spridningsarealen det aktuella året
- max 60 kg lättillgängligt kväve per hektar får tillföras inför sådd av höstoljeväxter\*
- max 30 kg lättillgängligt kväve per hektar får tillföras inför sådd av övriga höstgrödor\*.

Dessutom ska tillförseln av kväve via gödselmedel begränsas så att den inte överstiger grödans behov med hänsyn till förväntad skördenivå och kväveleverans från marken på växtplatsen. Det finns också krav på att dokumentera hur kvävebehovet har beräknats, se [bilaga 1](#).

Utöver dessa regler finns det också begränsningar i när och till vilka grödor stallgödsel och andra organiska gödselmedel får spridas under hösten. De syftar främst till att minska risken för kväveutlakning och varierar mellan olika delar av de känsliga områdena.

**I känsliga områden utanför Blekinge, Skåne och Halland gäller följande:**

- 1 augusti–31 oktober: Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får endast spridas i växande gröda eller inför höstsådd.
- 1–31 oktober: Fasta gödselslag (med undantag för fjäderfågödsel) får även spridas på obevuxen mark utan krav på höstsådd.
- 1–31 oktober: Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark ska brukas ner inom 12 timmar.


**I känsliga områden i Blekinge, Skåne och Hallands län gäller:**

- 1 augusti–31 oktober: Stallgödsel och andra organiska gödselmedel får endast spridas i växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter. På lerjordar är dock spridning även tillåten inför höstsådd av annan gröda än oljeväxter.
- 1–31 oktober: Fasta gödselslag (med undantag för fjäderfågödsel) får även spridas på obevuxen mark utan krav på höstsådd.
- 1–31 oktober: Fasta gödselslag som sprids på obevuxen mark ska brukas ner inom 4 timmar.

\* Gäller alla typer av gödsel, både stallgödsel, andra organiska gödselmedel och mineralgödsel.

**I hela Blekinge, Skåne och Hallands län gäller att:**

- Stallgödsel som sprids på obevuxen mark ska myllas ned inom 4 timmar (OBS! Inom känsliga områden ska fasta gödselslag som sprids under perioden 1–31 oktober brukas ner inom 4 timmar).
- Spridning av flytgödsel i växande gröda ska ske med bandspridningsteknik eller annan liknande teknik som innebär att gödseln placeras på marken under växttäcket, myllningsaggregat, teknik som innebär att 1 del gödsel spås ut med minst ½ del vatten före spridning eller teknik som innebär att spridningen följs av bevattning med minst 10 mm vatten. Om det regnar får regnmängden räknas från kravet på minst 10 mm vatten.



#### 2.2.4.4 Utanför känsliga områden – bruka ned gödseln inom 12 timmar om du sprider på senhöst eller vinter

Utanför de känsliga områdena ska stallgödsel och andra organiska gödselmedel som sprids under tiden 1 december–28 februari brukas ned inom 12 timmar. För övriga tider under året finns inga specifika restriktioner förutom Miljöbalkens allmänna hänsynsregler.

## 2.3 Biogödsel

Med biogödsel menar vi rötrest från biogasanläggningar. Substraten som man matar anläggningen med är ofta en blandning av olika organiska restprodukter som till exempel stallgödsel, matrester från hushåll och restauranger, restprodukter från livsmedelsindustrin och ensilerade växtprodukter. I biogasanläggningen omvandlas delar av det organiska materialet till gas (främst metan, koldioxid och vattenånga). Växtnäringen (N, P, K, S och mikronäringsämnen) passerar däremot anläggningen i stort sett utan förluster och finns alltså kvar i biogödseln.

Under rötningen i biogasanläggningen avgår kol i gasform främst som metan och koldioxid. Då minskar mängden kol i biogödseln och kol-/kvävekvoten (C/N) sjunker jämfört med den i de ingående råvarorna. Samtidigt mineraliseras en del av det organiskt bundna kvävet och blir mer tillgängligt. Därför kan du förvänta dig en snabbare kväveeffekt från biogödsel än vad du hade

fått om du hade spridit de restprodukter som förs in i biogasanläggningen direkt. Andelen ammoniumkväve brukar vanligtvis vara cirka 10 procentenheter högre i rötad stallgödsel än i öröad.

Ofta brukar leverantören tillhandahålla analysvärden som visar hur mycket växtnäring och andra ämnen biogödseln innehåller. Om du lagrar biogödseln på gården utan täckning eller med bara svämtäcke kan det vara bra att göra en ny analys av ammoniumkväve inför spridning.

Då biogödseln innehåller en större andel ammoniumkväve och har högre pH-värde än obehandlad stallgödsel ökar risken för ammoniakavgång vid lagring och spridning. Därför är det extra viktigt att du täcker rötrestbehållaren och använder spridningsteknik som minskar ammoniakavgången, till exempel bandspridning med släpslang i växande gröda, ytmyllning eller snabb nedbrukning.

Biogödsel som är certifierad enligt [Avfall Sveriges certifiering SPCR 120](#) är godkänd av flertalet branschföreningar och många uppköpare. Håll dig uppdaterad och kontrollera alltid uppköparens krav innan du tar emot och sprider biogödsel.



**Bild 13.** Du får oftast en snabbare kväveeffekt av biogödsel än av öröad stallgödsel eller annan organisk gödsel eftersom en del av det organiskt bundna kvävet mineraliseras under rötningsprocessen. **Foto:** Märten Svensson

## 2.4 Avloppsslam

Avloppsslam påminner i flera avseenden om stallgödsel. Slammet innehåller dock inte lika mycket ammoniumkväve och kalium eftersom dessa ämnen i stor utsträckning lämnar reningsverken med utgående vatten. En hel del kväve avgår också i gasform i samband med kvävereningen. Trots det kan du räkna med en viss kväveeffekt av slam. Fosforinnehållet är högt eftersom en stor del av fosfor i avloppsvattnet fälls ut och hamnar i slammet. Fosfor är dock inte lika lättillgänglig som i mineralgödsel eftersom fällningskemikalierna som används i reningsverken skapar svårösliga fosforföreningar. Även om lagkravet tillåter 7 årsgivor bedömer vi att större givor än 5 årsgivor är olämpligt i de flesta fall.

### 2.4.1 Begär en varudeklaration för slammet

Om du tänker ta emot slam bör du se till att få en varudeklaration som anger hur mycket växtnäring slammet innehåller och att det innehåller tillräckligt låga halter av tungmetaller och svårnedbrytbara organiska ämnen. Via certifieringssystemet Revaq (Renare vatten – bättre kretslopp) arbetar branschen kontinuerligt med att förbättra kvaliteten på slammet, bland annat genom att minska tillförseln av metaller och andra farliga ämnen uppströms reningsver-

ken. Målet är att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit. Mer information om Revaq och vad certifieringen innebär hittar du på Svenskt Vattens webbplats [svensktvatten.se](https://svensktvatten.se).

## 2.4.2 Regler för spridning av slam – begränsad tillförsel av fosfor och metaller

Regler för spridning av slam finns både i Jordbruksverkets och i Naturvårdsverkets föreskrifter. I Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2004:62 (Jordbruksverket, 2004), omfattar definitionen ”övriga organiska gödselmedel” även avloppsslam och alla spridningsregler som gäller ”övriga organiska gödselmedel” gäller därmed även vid slamspridning.

Du får inte använda avloppsslam på betesmark, inte heller på åkermark du ska använda för bete eller där du ska skörda vallfodergrödor inom tio månader från att du sprid slam. Du får inte heller sprida slam på mark där du odlar eller ska odla bär, potatis, rotfrukter, grönsaker eller frukt (gäller inte frukt på träd) som ska sköras inom tio månader. Det gäller också produkter som normalt är i direkt kontakt med jorden och normalt konsumeras råa, under tio månader före skörden enligt Naturvårdsverkets föreskrift SNFS 1994:2 (Statens Naturvårdsverk, 1994).

Du måste anpassa mängden slam efter markens fosfortillstånd och tungmetallinnehåll samt slammets innehåll av totalfosfor, ammoniumkväve och tungmetaller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter, SNFS 1994:2. Maximalt tillåtna givor med hänsyn till fosfor och ammoniumkväve hittar du i [tabell 8](#). Begränsningarna i Naturvårdsverkets föreskrifter gäller på varje enskilt hektar åkermark där slam sprids.

I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring SJVFS 2004:62, (Jordbruksverket, 2004), står det att stallgödsel och andra organiska gödselmedel inte får spridas i större mängd än vad som motsvarar 22 kg totalfosfor per hektar och år. Det ska beräknas som ett genomsnitt på hela spridningsarealen under en femårsperiod. Läs mer i [kapitel 2.2.4.1](#).

**Tabell 8.** Maximal mängd totalfosfor och ammoniumkväve som får tillföras åkermark via avloppsslam och andra avloppsfraktioner enligt SNFS 1994:2, (Statens Naturvårdsverk, 1994).

P-AL-klass	Totalfosfor (kg/ha och år)	Ammoniumkväve (kg/ha och år)	Totalfosfor (kg/ha och spridningstillfälle)
I och II	35	150	245
III – V	22	150	154

För att inte höja metallhalterna ännu mer i jordar där de redan är höga får avloppsslam inte spridas alls på åkermark med metallhalter över en viss nivå enligt Naturvårdsverkets föreskrifter. Det finns även gränsvärden för hur stor mängd metaller som får tillföras på marker där spridning är tillåtet, se [tabell 9](#).

**Tabell 9.** Högsta tillåtna metallhalter i åkermark och maximal tillförsel av metaller vid användning av avloppsslam enligt Naturvårdsverkets föreskrifter SNFS 1994:2, (Statens Naturvårdsverk, 1994).

Metall	Gränsvärden för metallhalter i åkermark (mg/kg ts jord)	Maximal tillförsel av metaller vid användning av avloppsslam (g/ha och år)
Bly (Pb)	40	25
Kadmium (Cd)	0,4	0,75
Koppar (Cu)	40	300 <sup>a)</sup>
Krom (Cr)	60	40
Kvicksilver (Hg)	0,3	1,5
Nickel (Ni)	30	25
Zink (Zn)	100	600

a) Större mängder kan godtas om den aktuella åkermarken behöver koppartillskott.

### 2.4.3 Särskilda villkor för användning av slam i odlingskontrakt

I juli 2018 tillsatte regeringen en utredning som skulle föreslå hur ett krav på utvinning av fosfor ur avloppsslam och ett förbud mot att sprida avloppsslam bör utformas. Utredningens betänkande SOU 2020:3 [Hållbar slamhantering](#) (Holmgren m.fl, 2020) publicerades i januari 2020 och finns tillsammans med inkomna remissvar på regeringen webbplats, [regeringen.se](#).

Redan 2012–2013 genomförde Naturvårdsverket ett arbete om hållbar återföring av fosfor från avloppsslam och andra fosforhaltiga restprodukter, till exempel biogödsel och kompost, på uppdrag från regeringen. I Naturvårdsverkets rapport 6580, Hållbar återföring av fosfor, (Naturvårdsverket, 2013), kan du läsa mer om återföring av fosfor och om olika fosforresurser och deras innehåll av oönskade ämnen.

För närvarande är det möjligt att sälja slamgödselad spannmål inom ordinarie handel, men inte i alla kvalitetssegment. Förutsättningen är att slammet uppfyller kraven i branschorganisationen Svenskt Vattens certifierings-system, Revaq. Revaq har även regler som berör spridning av slam. Innan du bestämmer dig för att ta emot slam bör du ta reda på om det finns särskilda villkor för slam användning i dina odlingskontrakt eller leveransvillkor. En del livsmedelsföretag vill inte köpa grödor som odlats på slamgödselad mark. Avloppsslam är heller inte tillåtet att använda i ekologisk odling. Uppdatera dig med aktuella certifieringsregler inför varje spridningstillfälle.

## 2.5 Gödselmedel för ekologisk odling

En väl genomtänkt växtföljd som ger ett lågt sjukdomstryck lägger en bra grund för en frisk gröda som kan utnyttja växtnäring effektivt. Etableringen av grödan är viktig. En bra struktur i marken gynnar grödornas rotsystem. Då får grödan goda förutsättningar att ta upp växtnäringen bra genom hela markprofilen. Växtnäringstillförsel i ekologisk odling sker huvudsakligen genom att

- odla baljväxtrika vallar, trindsäd och grön gödselingsgrödor
- odla växter med djupt rotsystem
- använda stallgödsel och andra biprodukter.



Stallgödsel, biprodukter och annat organiskt material ska i första hand komma från ekologisk produktion. Vissa typer av stallgödsel och biprodukter från konventionell produktion får också användas om de uppfyller fastställda krav.

### 2.5.1 Vilka gödselmedel är tillåtna i ekologisk odling?

EU:s och KRAV:s regler styr vilka gödselmedel du får använda i ekologisk odling. Grundprincipen är att allt som inte uttryckligen är tillåtet att använda enligt reglerna, är förbjudet. Du hittar vilka insatsmedel som ekologiska odlare i Sverige får använda i Insatslistan för Sverige. Den tillkom hösten 2021. Läs mer om listans bakgrund på Insatslistans webbplats, [insatslista.se](https://insatslista.se). KRAV:s regler är i hög grad anpassade till EU:s regler, men KRAV har ytterligare några regler utöver EU:s. Du kan läsa mer om EU:s regler på Jordbruksverkets webbplats, [jordbruksverket.se](https://jordbruksverket.se). Information om KRAV:s regler finns på KRAV:s webbplats, [krav.se](https://krav.se).

EU:s regler för ekologisk produktion förordar framför allt stallgödsel från ekologisk djurhållning, men du får använda stallgödsel från några typer av konventionell djurhållning. Det är inte tillåtet att använda stallgödsel från ett antal former av mer intensiv konventionell djurhållning, till exempel från specialiserad produktion av nötkreatur i spaltgolvsboxar och från vissa typer av produktion av slaktgris och fjäderfä. Det är tillåtet att använda bi-gödsel från biogasproduktion där viss typ av slakteriavfall används i rötningen. Biogasanläggningen ska då vara KRAV-certifierad eller tillåtetbedömd. Om biogödseln kommer från animaliska råvaror får den inte spridas på någon ätlig del av grödan.

Förutom stallgödsel och biogödsel finns ett antal fasta och flytande specialgödselmedel som är tillåtna i ekologisk odling. Många har sitt ursprung i olika organiska restprodukter, till exempel kycklinggödsel, vinass, köttmjöl, benmjöl, blodmjöl eller andra biprodukter från livsmedelsindustrin. Vissa oorganiska gödselmedel är också tillåtna enligt EU:s regler till exempel kaliumråsalt, kaliumsulfat framställt av kaliumråsalt genom fysikalisk extraktion, och kalimagnesia. Naturligt förekommande magnesiumsulfat (kieserit) är också tillåtet. Du kan också kontakta ditt kontrollorgan för mer information.

Om du använder animaliska biprodukter med hygieniserade slaktrester som blod- eller benmjöl, ofta komponenter i olika ekopellets, gäller särskilda regler för spridning i växande grödor. Regler för växtnäring i ekologisk produktion hittar du på [Jordbruksverkets webbplats](https://jordbruksverket.se) och under [Nationella riktlinjer](#).

### 2.5.2 Tungmetallinnehållet kan begränsa tillförseln

För vissa gödselmedel kan tungmetallinnehållet begränsa hur stora givor du får sprida. I [KRAV:s regler](#) hittar du gränsvärden för högsta tillåtna tillförsel av tungmetaller med införda gödselmedel per hektar och år under en femårsperiod.

### 2.5.3 Mylla eller bruka ner organiska gödselmedel

Fasta, organiska gödselmedel är ofta pelleterade men kan också säljas i mjölform, som granulat eller minigranulat. Växtnäringsinnehåll och kemisk sammansättning varierar beroende på vilka råvaror som ingår. Växtnäringsinnehållet ligger ofta lägre än i mineralgödsel men högre än i stallgödsel. Det är vanligt med givor mellan 500 och 1000 kg per hektar. Välj en spridningsteknik som passar gödselslaget och den giva du har tänkt sprida. Du får bäst effekt av både fasta och flytande organiska gödselmedel om du myllar eller brukar ner dem. Du kan kombiså eller bredsprida pelleterade produkter med mineralgödselspridare. Om du kombisår får du som regel ett bättre kväveutnyttjande samtidigt som du undviker problem med fåglar som kan äta betydande mängder gödselpellets. Nyare försök visar att du får ett bättre kväveutnyttjande av pelletsen på lerjordar om du myllar ner den 4–6 cm. På lättare jordar visar försöken ännu bättre effekt vid myllning då det ger högre skörd (Delin & Engström, 2021).

Flytande produkter som till exempel vinass, fruktsaft från stärkelseindustrin och biogödsel kan du med fördel mylla ned i samband med radhackning. Andra alternativ är bredspridning och nedbrukning före sådd eller bandspridning med släpplangsramp i växande gröda.



**Bild 14.** Du får bäst effekt av både fasta och flytande organiska gödselmedel om du myllar eller brukar ner dem. **Foto:** Henrik Andersson

### 2.5.4 Kol/kväveknoten visar hur mycket kväve som blir tillgängligt

Hur snabbt kvävet i organiska gödselmedel blir tillgängligt för växterna varierar mellan olika gödselmedel och påverkas bland annat av gödselmedlets kol/kväveknot. Men det påverkas också av spridningstidpunkt, spridningsteknik, nedmyllning samt markens fuktighet och temperatur.

Effekten av kväve under spridningsåret kan anges i förhållande till kväveeffekten hos mineralgödsel. Mineralgödselns effekt sätts till 100 % och effekten av de organiska gödselmedlen anges i relation till detta. Det värde du får

fram kallas mineralgödselvärdet och beskriver hur stor andel av totalkvävet som kan förväntas bli tillgängligt för grödan under växtsäsongen. Mineralgödselvärdet anges oftast i procent av gödselns totala kväveinnehåll (Delin & Engström, 2021).

I flera fältförsök i spannmål med köttmjölspellets (Biofer och Ekoväx) blev 50–90 % av totalkvävet tillgängligt för grödan under spridningsåret. Motsvarande mineralgödselvärdet var 50–80 % för vinass och 60–80 % för biogödsel. För stallgödsel, förutom fjäderfågödsel, var mineralgödselvärdet ungefär lika stort som andelen ammoniumkväve vid spridning. För nötflytgödsel blev till exempel 30–50 % av kvävet tillgängligt under spridningsåret (Delin & Engström, 2021).

Med hjälp av kol/kväveknoten (C/N-kvoten) kan du få en uppfattning om hur stor andel av kvävet som kan bli tillgänglig för grödan. Generellt sett blir större andel kväve snabbt tillgängligt om C/N-kvoten är låg. Flera försök har lett fram till följande tumregler (Delin m.fl., 2010; Delin & Engström, 2021):

- I gödselmedel med låga C/N-kvoter (1–5), till exempel biogödsel och blodmjöl, kan du räkna med att 60–80 % av kvävet frigörs första året.
- För pelleterade köttmjölsprodukter med C/N-kvot 45 frigörs 50–90 % av kvävet.
- Hästgödsel och vissa kompostmaterial med höga C/N-kvoter på 12–14 ger mycket liten kvävegödslingseffekt på kort sikt, ofta under 10 %.

Det kväve som finns i köttbenmjöl, vinass och kycklinggödsel och som blir växttillgängligt under första året frigörs ofta inom 1–2 månader efter spridning (Delin m.fl., 2010).

När det gäller långtidseffekten av organisk gödsel så är efterverkan störst året efter spridning. Effekten kan då vara 0–20 % av den mängd kväve som tillförts första året (Delin & Engström, 2021). De 2–3 följande åren är efterverkan ofta kring 3–5 %.

# 3 Spridningsteknik

## 3.1 Mineralgödsel och torkade, pelleterade organiska gödselmedel

Det finns olika tekniker för att sprida mineralgödsel. Är gödseln i fast form (granulerad, prillad eller kornad) kan den bredspridas med centrifugal- eller rampspridare eller myllas med kombisåmaskin i samband med sådd. Är den i flytande form kan spridningen ske med hjälp av växtskyddssprutan.

Fasta, organiska gödselmedel är ofta pelleterade men kan också säljas i mjölform, som granulat eller minigranulat. Växtnäringsinnehållet är ofta lägre än i mineralgödsel men högre än i stallgödsel, läs mer i [kapitel 2](#). Det är vanligt med givor mellan 500 och 1000 kg per hektar. Välj en spridningsteknik som passar gödselslaget och den giva du har tänkt sprida. Organiska gödselmedel bör kombisås, myllas eller brukas ned för att få bästa effekt.

### 3.1.1 När passar bredspridning med centrifugalspridare, rampspridare och kombisådd?

Vid bredspridning har centrifugalspridaren en fördel med en hög kapacitet till en lägre investeringskostnad än rampspridaren. Rampspridaren ger dock full giva ända ut till fältkant samtidigt som den är mindre vindkänslig.

Centrifugalspridaren kan förses med lastceller för att underlätta kalibrering och styrning av givan. Den stora nackdelen är spridning intill fältkanter. Utmaningen är att begränsa kastlängden ut mot fältkanten samtidigt som givan inåt fältet inte blir för hög och spridningsbilden acceptabel.

Med kantspridningsutrustning minskar risken att gödsel hamnar utanför fältet. Några tekniska lösningar som finns på marknaden är ledskenor, justering av varvtal samt förflyttning av nedsläppspunkten på tallriken.



**Bild 15.** Kantspridningsutrustning minskar risken för att gödsel hamnar utanför fältet.  
**Foto:** Jens Blomquist

Kastlängden ut mot fältkant kan i regel ställas in i två lägen:

- Miljöoptimerad
- Skördeoptimerad

Miljöoptimerad inställning används exempelvis intill en kant där ingen gödsel får spridas utanför fältkanten. Enligt Jordbruksverkets föreskrifter 2020:2 (Jordbruksverket, 2020b) om hänsyn till natur och kulturvärden i jordbruket får mineralgödsel, stallgödsel samt slam eller andra organiska gödselmedel inte spridas på åkermark så att de hamnar utanför åkern, läs mer i [kapitel 2](#). Med den skördeoptimerade inställningen sprids mer av granulatet intill fältkanten och mängden som hamnar utanför fältkanten ökar i regel med någon procent. Inställningen används när man kan acceptera att gödsel hamnar utanför fältkanten, exempelvis där skiftet gränsar till ett närliggande skifte.

Vid gödsling i samband med sådd används med fördel kombisåmaskin. Kombisåmaskinen placerar gödseln i marken på lagom avstånd från såraderna, vilket ger förutsättningar för ett bättre växtnäringsutnyttjande och snabbare tillväxt i början av säsongen innan rotsystemet har hunnit utvecklas, särskilt under torra förhållanden. För organiska gödselmedel innebär det också att det organiskt bundna kvävet frigörs snabbare samtidigt som risken för kväveförluster via ammoniakavgång minskar.

### 3.1.2 Gödselns egenskaper påverkar resultatet

För att få ett bra spridningsresultat krävs också att gödselmedlet uppfyller kraven på fysikaliska egenskaper. För en centrifugalspridare med 24 m arbetsbredd ska gödselkornen ha en tryckhållfastighet på minst 3 kg och medelkornstorleken ligga över 2 mm i diameter. Rampspridare och kombisåmaskiner med valsutmatning är mindre känsliga för hårdhet och kornstorlek, men dammig och fuktig gödsel bildar lätt klumpar och beläggningar på utmatningsvalsar vilket kan påverka både utmatning och spridningsbild.

### 3.1.3 Testa din spridare

En annan förutsättning för att nå ett bra spridningsresultat är att spridaren är korrekt inställd. Instruktionsboken ger bra grundförutsättningar, men slitage och variationer i gödselmedlens egenskaper påverkar också spridningsresultatet. Att testa spridaren i fält med den aktuella gödseltypen är den bästa lösningen för att få ett bra spridningsresultat. Ett test med spridarbackar ger en snabb uppfattning om spridningsjämnheten i sidled. Backar kan köpas från flera leverantörer. Vissa organisationer tillhandahåller dem också för utlåning. Är du medlem i Greppa Näringen finns möjligheten att ta del av rådgivningen Test av mineralgödselspridare (modul 16B) förutsatt att den är upphandlad i ditt län. Läs mer på [greppa.nu](http://greppa.nu).



**Bild 16.** I Greppa Näringen finns möjligheten att genomföra test av mineralgödselspridare.

**Foto:** Christer Johansson

**Tabell 10.** Bedömning av spridningsjämnhet. En variationskoefficient på upp till 15 % accepteras i fält.

Variationskoefficient	Bedömning
0–5 %	Mycket bra
5–10 %	Bra
10–15 %	Tillfredsställande
15–20 %	Ej tillfredsställande
> 20 %	Dålig



### Vad säger variationskoefficienten?

Variationskoefficienten är ett mått på spridningsjämnheten. Matematiskt beräknas den som standardavvikelsen dividerat med medelvärdet.

Standardavvikelsen i sin tur beräknas enligt nedanstående formel:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (x - m)^2}{n}}$$

där x = varje enskilt mätvärde, m = medelvärdet och n = antalet mätvärden.

Backarna som används vid test av spridare är 50x50 cm. Om alla backar innehåller exakt lika mycket gödsel efter överlappning med intilliggande kördrag skulle variationskoefficienten vara 0, men så jämn blir sällan spridningen i praktiken.

Arbetsbredden kan variera beroende på gödselns egenskaper. Optimal arbetsbredd är det avstånd mellan kördragen som ger lägst variationskoefficient efter överlappning.

## 3.2 Stallgödsel och andra organiska gödselmedel

### 3.2.1 Flytgödsel, urin och biogödsel

#### 3.2.1.1 Tankvagn eller matarslangsystem

Tankvagn är den vanligaste tekniken för att transportera och sprida flytgödsel och urin. Samma teknik används också vid spridning av andra flytande organiska gödselmedel, t.ex. rötrest från biogasframställning och vinass. På moderna tankvagnar är centrifugalpumpen ofta tillräckligt dimensionerad för att flödet ska kunna hållas konstant med flödesreglering. Flödet delas då mellan spridning och retur till tanken.

Nyttillverkade tankvagnar finns i storlekar från 12 m<sup>3</sup> till över 25 m<sup>3</sup>. Trenden har gått mot allt större vagnar för ökad transportkapacitet. Problemet är de stora totalvikterna. De stora vagnarna kan väga 30 ton vilket innebär en stor risk för markpackning och körskador. För att minska packnings- och körskadorna blir det allt vanligare med 24 meters arbetsbredd, vilket minskar antalet körspår på fältet. I verktyget Gödselkalkylen på [greppa.nu](http://greppa.nu) kan du jämföra kostnader för transport, spridning och markpackning samt värdet av växtnäringen för olika kombinationer av gödselslag, gröda, jordart, tidpunkt och spridningsteknik.

#### Matarslang minskar markpackningen

En annan lösning för att behålla en hög transport- och spridningskapacitet och samtidigt minska risken för markpackning är att pumpa ut gödseln till spridarekipaget på fältet. Flera tillverkare marknadsför matarslangsystem där gödseln pumpas från en gödselbehållare eller ett mellanlager vid fältkanten. Med ett mellanlager vid fältkanten kan du få hög spridningskapacitet även med en mindre tankvagn. Transporten mellan gård och mellanlager kan då ske med en större tankvagn eller med lastbil.



**Bild 17.** Gödseltunna eller tankvagn är det vanligaste sättet att transportera och sprida flytgödsel. Tankvagnen kan förses med olika typer av spridaraggregat, på bilden en släpfotsramp.

**Foto:** Christer Johansson





**Bild 18.** Med ett materslangsystem går det att minska markpackningen jämfört med att köra med en tankvagn. **Foto:** Christer Johansson

Mellanlagret kan utgöras av till exempel en växelflakscontainer eller en begagnad tank från en lastbil. System med materslang är fortfarande inte så vanliga, men intresset har ökat på senare tid. Tekniken gör det möjligt att i högre grad styra flytgödselspridningen till de tider på året då du får bäst växt-näringsseffekt.

### 3.2.1.2 Bredspridning, bandspridning eller myllning

Principiellt skiljer man mellan bredspridning där gödseln sprids över hela markytan, bandspridning där den läggs i strängar eller band på marken och myllning där den placeras nere i marken.

#### Bredspridning – enkel och billig teknik

Den enklaste och billigaste tekniken är bredspridning där gödseln sprids över hela markytan. Den vertikala spridarplattan är vanligast. Den riktar gödseln nedåt och utåt sidorna och spridningsbilden påverkas därför mindre av vinden än med en horisontell spridarplatta. Fördelarna med bredspridning är framför allt att tekniken är billig och okomplicerad. Nackdelen är att gödseln hamnar på grödan, vilket gör att den exponerade gödselytan blir stor. Avgången av både lukt och ammoniak kan därmed också bli stor, särskilt vid spridning på vall, stubb eller i växande stråsåd. Vid spridning på vall är risken också stor att gödsel följer med in vid skörd och ger försämrad kvalitet på ensilaget.

#### Spridning med släpslang eller släpfot minskar kväveförlusterna

Med släpslängs- eller släpfotsramp bandsprider man gödseln i strängar på markytan. Fördelarna jämfört med bredspridning är framför allt lägre ammoniakavgång, mindre lukt och minskad nedsmutsning av grödan vid spridning i växande stråsåd och på vall. Bandspridning ger dessutom en bestämd arbetsbredd och bättre spridningsjämnhet i sidled. En nackdel kan vara att tekniken är mer känslig för störningar än spridarplattan, till exempel föroreningar i gödseln. Rampens fasta arbetsbredd gör att man kan använda fasta körspår, vilket minskar körskadorna. Bandspridning ger lägre ammoniakförluster än bredspridning i växande gröda och på stubb, men inte alltid på öppen jord. Det beror på att ytan som täcks av gödsel och ytan som ammoniak kan avgå från blir mindre. På öppen jord sker ammoniakavgången långsammare, men om gödseln inte brukas ned blir skillnaden inte så stor i slutändan.



**Bild 19.** Med släpfot får man en bättre markkontakt. **Foto:** Johan Malgeryd

Släpfoten ger gödseln bättre markkontakt än släpslängen. Den har till skillnad från släpslängen en fjädrande upphängning och söker sig fram längs markytan. Vid spridning i växande gröda och på vall viker släpfoten undan strån och växtdelar och placerar gödseln i strängar med god markkontakt. Om jorden är lucker, till exempel vid spridning i växande stråsåd eller på öppen jord, myllas gödseln till och med ned under markytan. Under sådana förhållanden blir ammoniakavgången nästan lika låg som vid spridning med ytmyllningsaggregat. Vid spridning på vall däremot blir ammoniakavgången ungefär densamma som vid spridning med släpslängsramp. Släpfotsteknikens fördelar jämfört med myllningsaggregat är lägre dragkraftsbehov, större arbetsbredd och mindre vikt.

### Myllning ger lägst ammoniakavgång

Vid ytmyllning av flytgödsel i stubb eller på bearbetad jord, så kallad svartjordsmyllning, kan relativt enkla och billiga myllare användas. Vanligast är kultivatoraggregat som har kompletterats med en gödselördelare och slangar som fördelar ut gödseln. Principen är densamma som för en vanlig kultivator, men till varje kultivatorpinne är en gödselslang kopplad.

För ytmyllning av flytgödsel på vall och i växande stråsåd används som regel skivbillsaggregat. Aggregat med två vinkelställda skivor har visat sig fungera bäst under hårda markförhållanden (Rodhe, 2003). Jämfört med andra metoder ger spridning med myllningsaggregat avsevärt lägre förluster av ammoniak. Öppen ytmyllning på vall kan minska ammoniakavgången med 50 % jämfört med bandspridning. Myllningsaggregat har dock större dragkraftsbehov och en begränsad arbetsbredd och ger därmed en högre spridningskostnad. Myllning kan i vissa fall öka förlusterna av lustgas vid spridning i vall, särskilt om marken blir helt eller delvis vattenmättad efter spridning. Eftersom de totala kväveförlusterna minskar jämfört med bandspridning är myllning ändå att rekommendera (Rodhe, 2014).



**Bild 20.** Spridning med matarslang och ytmyllningsaggregat för spridning i vall minskar både markpackning och ammoniakförluster. **Foto:** Pernilla Kvarmo

### 3.2.2 Fast- och kletgödsel

Dagens fastgödselspridare är konstruerade för att sprida olika typer av fastgödsel och andra organiska gödselmedel med liknande egenskaper, t. ex. slam. De har en hydrauliskt driven bottenmatta och kan också utrustas med lastceller för enklare kalibrering och styrning. Spridare med skruvutmatning förekommer också. De är framför allt anpassade för spridning av kletgödsel.

Det finns olika lösningar för sönderdelning och fördelning av stallgödseln:

- Horisontella spridarvalsar.
- Vertikala spridarvalsar.
- Roterande tallrikar eller vingar.
- Tvåstegspridare med horisontella eller vertikala valsar samt spridar-tallrikar eller vingar.

I rapporter från tyska DLG (organisation som bl.a. testar lantbruksmaskiner) kan man hitta testresultat för olika typer av gödselspridare, se [tabell 11](#).

**Tabell 11.** Exempel på spridningsresultat från DLG-tester av stallgödselspridare (DLG 2006a; DLG, 2006b).

Testad spridartyp, fabrikat och modell	Stallgödseltyp	Giva, ton/ha	Arbetsbredd, m	Variationskoefficient, %
Två stående valsar, Samson SP 12 (DLG. 2006a)	Ströbädd	10	11	14
	Ströbädd	30	13	17
	Höns gödsel	2,7	7,5	17
Tvåstegspridare, Bergman TSW 2016 S (DLG. 2006b)	Ströbädd	10	17,5	15
	Ströbädd	30	18	16
	Höns gödsel	2,7	10	17

### 3.3 Teknik för att styra gödselgivan



**Bild 21.** Tvåstegsspridare som sprider fastgödsel.

**Foto:** Christer Johansson

Det finns idag stora möjligheter att precisionsstyra spridningen av både mineral- och stallgödsel. Tidigare har man ofta utgått från hela fältet när man beslutat om gödsling. Om du använder sensorteknik och geografisk positionering med hjälp av satellit (GPS) kan du variera givan efter hur markförhållanden och skördepotential varierar inom fältet. Genom GPS-teknik kan centrifugalspridaren anpassa inställningen av spridaren vid exempelvis kilkörning. Till- och frånslag styrs automatiskt för att undvika dubbelspridning vid vändtegen.

Det finns flera verktyg för att bestämma hur mycket kväve grödan har tagit upp i fält. Ett sätt är göra snabbanalyser där du klipper några skott och får ett värde på nitrathalten i växtsaften. Det finns också små sensorer som du kan bära med dig ut i fält och som mäter reflekterat ljus från grödan eller genomlyser bladet. Det finns även traktorburna sensorer som mäter reflekterat ljus i olika våglängder från grödan under körning. Med hjälp av en traktorburen sensor kan du styra och variera kvävegivan inom fältet med hänsyn till grödans färg och täthet vid spridning av mineralgödsel.

Ett annat alternativ är att använda styrfiler från nyligen tagna satellitbilder för att styra gödselspridaren och anpassa givan efter hur grödan varierar inom fältet. Via exempelvis CropSAT kan du få tillgång till satellitbilder och framställa styrfiler. CropSAT visar ett vegetationsindex som är korrelerat till biomassa och kväveinnehåll. På [cropsat.se](https://cropsat.se) finns bilder från hela Sverige. Upplösningen i bilderna är i allmänhet 20 × 20 m, i vissa fall ned till 10 × 10 m. Du kan förstora ditt fält och se hur vegetationsindex varierar inom fältet.

Med hjälp av markkarteringsdata och lämplig programvara kan man också framställa styrfiler till både flyt- och fastgödselspridare för att styra givan efter markens fosforinnehåll. Några leverantörer kan även utrusta flytgödseltunnor med NIR-instrument som mäter ts-halt, totalkväve-, ammoniumkväve- och kaliuminnehåll i varje lass.



**Bild 22.** I CropSAT kan du skapa tilldelningsfiler som kan användas för att styra spridare utifrån satellitbilder baserade på vegetationsindex. **Foto:** [Cropsat.se](https://cropsat.se)

Alla metoder som utnyttjar den gröna färgen för att styra kvävegödsling förutsätter att grödan är frisk, att det inte finns några andra växtnäringsbrister eller störningsmoment, exempelvis torka eller alltför mycket ogräs i förhållande till grödan. Därför är det viktigt att även titta i fält för att bedöma orsakerna till att grödan ser ut som den gör på satellitbilden.

Det är bra att kombinera olika metoder när du ska bedöma hur mycket kväve grödan behöver. Du kan använda metoderna både för att bedöma nivån på grödans kväveupptag och hur gödseln ska fördelas inom fältet. Läs mer om olika verktyg och metoder på Greppa Näringens webbplats, [greppa.nu](https://greppa.nu) och på Precisionsskolans webbplats, [precisionsskolan.se](https://precisionsskolan.se).



**Bild 23.** Kvävesensorn på traktorns tak läser av grödans färg och täthet. Gödselspridaren varierar sedan kvävegivan efter grödans behov. **Foto:** Lantmännen



# 4 Strategier och riktgivor för kvävegödsling

Kväve är det näringsämne som har störst påverkan på skördens storlek och kvalitet. Brist på kväve sänker skörden och ger låg proteinhalt. Överskott på kväve kostar pengar och utgör en stor risk för förluster till miljön i form av lustgasavgång och utlakning.

Kväve ingår i protein, klorofyll och vissa hormoner (Fogelfors, 2001). Symtom på kvävebrist kan du se först på äldre blad som blir blekgroena och gulaktiga. Det ska inte förväxlas med svavelbrist där symtomen syns på de yngre bladen. Vid kraftig kvävebrist hämmas tillväxten, blad vissnar och kärn- eller frösättning minskar. I spannmål kan stjälken bli kort och tunn och få en rödaktig färg på nedre delen av stjälken. I raps kan de äldre bladen få gul till rödviolett färgton och stjälken bli tunn (Aasen, 1997; West Larsen, 1998).

## Planera och anpassa gödslingen:

- I. Välj strategi och planera noggrant. Ta hänsyn till
  - a. riktgivor utifrån förväntad skörd och önskad kvalitet.
  - b. förfrukt, organiska gödselmedel, såtidpunkt och såteknik.
  - c. egen erfarenhet av fältets skördepotential och kvävelevererande förmåga.
- II. Anpassa gödslingen under säsongen
  - a. efter årsmån.
  - b. efter fältets förutsättningar.
  - c. med hänsyn tagen till inomfältvariationen (precisionsgödsling).



**Bild 24.** Använd riktgivorna för att planera gödslingen, men anpassa givan efter fältets och årets förutsättningar. **Foto:** Hans Jonsson

## 4.1 Målet är att uppnå ekonomiskt optimal kvävegiva

### 4.1.1 Optimal kvävegiva – kostnad för kväve är lika stor som värdeökning för skörden

Vid ökad kvävegödsling ökar normalt även skörden upp till en viss nivå. Vår definition av ekonomiskt optimal giva är den kvävegiva där kostnaden för det sist tillförda kilot kväve är lika stort som värdeökningen för skörden. Värdeökningen för skörden kan bero på högre skörd och/eller förbättrad kvalitet på skördad produkt, till exempel högre proteinhalt.

### 4.1.2 Totala behovet kan inte förutsägas

Du kan planera din gödsling i förväg, men aldrig förutsäga slutligt kvävegödslingsoptimum. De årliga variationerna i gödslingsbehov är stora och

enda sättet att hitta rätt kvävenivå är att gödsla två eller flera gånger under säsongen och ta hänsyn till årsmånen. För att kunna göra det måste du välja en strategi som börjar med en första giva som gärna är lite lägre än normalbehovet. Om det sedan visar sig att behovet är större kan du fylla på med mer kväve. På så sätt riskerar du inte att gödsla för mycket ett dåligt år eller att förlora intäkt ett bra år.



**Bild 25.** Vid optimal giva är kostnaden för det sista kilot kväve lika stor som värdeökningen för skördeprodukten. **Foto:** Erik Karlsson

#### 4.1.3 Riktgivor som utgångspunkt i planeringen

Vi har tagit fram riktgivor för kvävegödsling till spannmål, vall och oljeväxter utifrån gödslingsförsök inom den regionala försöksverksamheten och utifrån forskningsresultat. Använd riktgivorna när du planerar gödslingen inför kommande säsong.

**Riktgivorna för spannmål och oljeväxter** är anpassade efter odling på mineraljordar med spannmål som förfrukt och på gårdar utan djur. Du kan alltså behöva ändra kvävegivan om du har en annan förfrukt än spannmål eller om du har haft djur på gården under lång tid. Du kan även använda schemat i [bilaga 1](#) för att göra justeringar.

**Riktgivorna för vall** är anpassade efter att gården har en djurenhet per hektar. Därför behöver du inte justera vallgödslingen för långsiktig stallgödseffekt om inte djurhållningen är betydligt större eller mindre än en djurenhet per hektar.

Uppskatta ungefärlig skördenivå på fältet och läs i [tabell 16](#) hur mycket kväve som behövs vid den förväntade skördenivån. Därefter anpassar du givan efter förfrukt, mineralisering mm. Förutsättningarna varierar kraftigt mellan olika fält och endast i undantagsfall kommer siffrorna i tabellerna att stämma för ett enskilt fält.

I riktgivorna ska du räkna in allt kväve som tillförs i lättillgänglig form med stallgödsel och mineralgödsel. Tänk på att justera givan efter kväveeffektiviteten hos det gödselmedel du väljer. Läs mer i [kapitel 2](#).

**Tabell 12.** Antagna priser inför 2024 för gödsel, spannmål och rörliga kostnader. För vall gäller pris på rot.

Gödsel	Pris (kr/kg)
Kväve	14,0
Fosfor	28,7
Kalium	12,1
Spannmål	Pris (kr/kg)
Höstvete (bröd)	2,04
Höstvete (foder)	1,95
Vårkorn (malt)	2,23
Vårkorn (foder)	1,84
Vall	Pris på rot (kr/kg ts)
3 skördar	0,95
Rörliga kostnader spannmål	Pris (kr/kg)
P, K	0,12
Torkning	0,12
Frakt	0,08
Summa (cirka)	0,32

**Tabell 13.** Prisjustering protein brödvete.

Proteinhalt (%)	Prisjustering (öre/kg)
> 12,0	+5
11,9	+4
11,8	+3
11,7	+2
11,6	+1
<b>11,0–11,5</b>	<b>0</b>
10,9	-1
10,8	-2
10,7	-3
10,6	-4
10,5	-5
< 10,5	<b>Foder</b>



Tabell 14. Prisjustering protein malkorn.

Malkorn	
Proteinhalt (%)	Prisjustering (öre/kg)
> 12,0	Foder
12	-10
11,9	-8,0
11,8	-6,0
11,7	-4,0
11,6	-2,0
11,5	-1
11,4	-0,8
11,3	-0,6
11,2	-0,4
11,1	-0,2
10,0–11,0	0
9,9	-0,2
9,8	-0,4
9,7	-0,6
9,6	-0,8
9,5	-1
9,4	-2,5
9,3	-4,0
9,2	-5,5
9,1	-7,0
9,0	-8,5
< 9,0	Foder

Tabell 15. Prisjustering protein vårvete.

Vårvete	
Proteinhalt (%)	Prisjustering (öre/kg)
≥ 14,0	+10
13,9	+8
13,8	+6
13,7	+4
13,6	+2
13,0–13,5	0
12,9	-2
12,8	-4
12,7	-6
12,6	-8
12,5	-10
< 12,5	Foder

#### 4.1.4 Antagna kostnader och intäkter

Från och med 2018 räknar vi med ett femårsmedelvärde för priser på gödsel och skördeprodukter. Rekommendationerna räknas fram med hjälp av en priskvot som är kvävepriset delat med nettopriset för varan. Erfarenheten visar att priskvoten påverkar de rekommenderade kvävegivorna betydligt mindre än de biologiska faktorerna som till exempel nederbörd och mineralisering i marken. Priskvotens betydelse har ofta legat inom +/- 10 kg per hektar, medan skillnaden i optimal gödsling mellan olika försöksplatser ligger på en högre nivå. Läs mer i [kapitel 4.2.3](#). Därför har vi valt att tona ner priskvotens betydelse för gödslingsnivån.

Under de senaste åren har vi dock upplevt en mycket turbulent marknad för såväl mineralgödsel som avsalugrödor. Kvävepriserna har varit väldigt höga, men eftersom även spannmålspriserna har varit höga, avviker gödslingsoptimum inte mycket från "normalåret". Men med tanke på det ostabila marknadsläget är det viktigt att följa prisutvecklingen på såväl gödsel som spannmålsmarknaderna. För att belysa hur prisvariationer kan påverka gödslingsoptimum har vi gjort känslighetsanalyser för höstvetete och vall, där vi visar hur mycket den rekommenderade givan ökar eller minskar vid olika prisnivåer, läs mer i [kapitel 4.2.3](#) och [4.4](#).

För spannmål grundar sig femårsmedelvärdet på Lantmännens priser för Pool 1 under de fem senaste åren (2018–2022). När vi beräknat optimum har vi dragit bort rörliga, skördeberoende kostnader från spannmålspriset. Vi har även gjort prisjusteringar utifrån proteinhalt för brödvete, malkorn och vårvete se [tabell 13](#), [14](#) och [15](#). För gödsel grundar sig femårsmedelvärdet på priset för kväve, fosfor och kalium i juli inför respektive odlingssäsong (2018–2022). Priser för spannmål och gödsel hittar du i [tabell 12](#).

Eftersom flera olika faktorer används för att beräkna optimal kvävegiva till oljeväxter har variationer i priskvoten inte så stor betydelse för rekommendationerna. Därför används en fast priskvot på 3 för oljeväxter. Det motsvarar ett pris på 3,30 kr per kg för höstraps om kvävepriset är 10 kr per kg.

Eftersom det inte finns någon reguljär marknad för vall och eftersom skörde- och lagringskostnaderna varierar kraftigt, har vi valt att uppskatta värdet för vallen på rot före skörd. Vi uppskattar att vallfoderpriset på rot motsvarar ungefär halva spannmålspriset för fodervete och foderkorn, se [tabell 12](#). Fler skördar ger spädare växtmaterial och högre näringsmässig kvalitet.

## 4.2 Kväverekommendationer och strategier för stråsäd

### 4.2.1 Optimal giva utgår från hur skörd och proteinhalt varierar med ökande kvävegödsling

För höstvetete och vårkorn finns det många försök med varierande kvävegivor, så kallade kvävestegar. Vi använder resultat från de senaste 10 årens försök, vilket ger en bild av aktuellt sortmaterial och aktuell odlingsteknik. I vissa fall har vi fått göra undantag, bland annat om det inte genomförts tillräckligt många försök eller om försöken inte varit representativa för odlingen. För övriga stråsådesgrödor använder vi de försöksresultat som finns tillgängliga och gör jämförelser med höstvetete och vårkorn. I gödslingsförsöken används

främst mineralgödsel i form av ammoniumnitrat ( $\text{NH}_4\text{NO}_3$ ). Som kompletteringsgiva används kalksalpeter.

Vi har beräknat ekonomiskt optimal kvävegiva efter hur skörd och proteinhalt varierar med ökande kvävegödsling. Vi har anpassat skörd och proteinhalt efter tredjegradsfunktioner och beräknat nettointäkten för olika kvävenivåer utifrån antagna priser. Därefter bestäms den kvävegiva som är ekonomiskt optimal i varje enskilt försök.

Vi utgår sedan från ett medelvärde för alla försök och korrigerar givan till olika skördenivåer. För all spannmål förutom brödvete har vi använt korrektionsfaktorn 15 kg kväve per ton skörd. Det betyder att riktgivan ökar med 15 kg per hektar om skörden ökar med ett ton per hektar. För brödvete har vi använt korrektionsfaktorn 20 kg per ton skörd. Korrektionsfaktorerna har vi tagit fram utifrån sambandet mellan optimal kvävegiva och skörd i samtliga försök.

#### 4.2.2 Förebygg liggsäd

Det går att förebygga liggsädsbildning genom att välja en stråstark sort, undvika tidiga givor i täta bestånd, gödsla flera gånger och anpassa totala kvävegivan efter skördepotential och markens mineralisering. En behandling med tillväxtreglerande medel kan förbättra stråstyrkan och därmed minska risken för liggsäd. Tillväxtreglering är dock inte någon garanti för att liggsäd helt undviks. Det är bättre att jobba med förebyggande åtgärder. Risken för liggsäd är störst i vårsäd, råg och höstkorn. I höstvetete och rågvete är risken för liggsäd mindre. Riktgivorna för råg i [tabell 16](#) är anpassade för att tillväxtreglering används, medan övriga grödor är anpassade för odling utan tillväxtreglering.

**Tabell 16.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha till strånsäd 2024. Gäller för mineraljord och med förfrukt strånsäd. Utgå alltid från normalskörd på fältet. Du kan inte läsa tabellen baklänges och räkna med att en högre kvävegiva automatiskt kommer att ge en högre skörd.

Gröda	Skörd (ton/ha)							
	4	5	6	7	8	9	10	11
Höstvetete bröd		120	140	160	180	200	220	240
Höstvetete foder		120	135	150	165	180	195	210
Rågvete/höstkorn		105	125	140	155	170		
Råg		95	115	130	145	160		
Vårvete <sup>a)</sup>	125	145	165	185	205			
Korn foder <sup>a)</sup>	70	85	100	115	130	145		
Korn malt <sup>a)</sup>	70	85	100	115	130	145		
Havre <sup>a)</sup>	60	80	95	110				

a) Givorna till vårsäd avser radmyllning av gödsel. Vid bredspridning öka givan med ca 10 kg N/ha.

### 4.2.3 Höga priser påverkar rekommendationerna

För att ge en bild av hur priskvoten påverkar riktgivorna har vi beräknat den ekonomiskt optimala givan vid varierade kväve- och spannmålspriser. Beräkningarna utgår ifrån en skörd på 7 ton per hektar för höstvetete till bröd (tabell 17 och diagram 1) och 5 ton per hektar för malkorn (tabell 18 och diagram 2). Tabellerna visar hur olika priskvoter teoretiskt kan påverka optimal giva. I praktiken sker dock justeringar på marknaden så att de ”extrema värdena” för priskvoter sällan blir långvariga.


Det är inte bara priserna som påverkar hur mycket kväve som är lämpligt att lägga i varje enskilt fall. Det finns flera andra aspekter att ta hänsyn till, såsom kvalitetskrav och foderbehov med mera. De biologiska faktorerna som till exempel nederbörd, temperatur och fältets kväveleverande förmåga påverkar gödslingsbehovet mer än prisförändringarna, läs mer i [kapitel 4.1.2](#).

**Tabell 17.** Riktgiva för 7 ton höstvetete bröd per hektar vid olika priskvoter. Tabellen visar hur priskvoter teoretiskt kan påverka optimal giva.

Spannmålspris (brutto) kr/kg	Kvävepris (kr/kg)	Priskvot <sup>a)</sup>	Optimal kvävegiva (kg/ha)
2,04	14,0	8,1	160
2,04	20,0	11,6	145
3,00	20,0	7,5	155
3,00	30,0	11,2	135
3,00	40,0	14,9	115
4,00	20,0	5,4	165
4,00	30,0	8,1	150
4,00	40,0	10,9	135

a) Priskvot = kvävepris delat med spannmålspris (efter avdrag på 0,32 kr/kg för rörliga kostnader).

**Diagram 1.** Teoretisk optimal kvävegiva beroende på priskvot, brödvetete 7 ton/ha.




**Tabell 18.** Riktgiva för 5 ton maltkorn per hektar vid olika priskvoter. Tabellen visar hur priskvoter teoretiskt kan påverka optimal giva.

Spannmålspris (brutto) kr/kg	Kvävepris (kr/kg)	Priskvot <sup>a)</sup>	Optimal kvävegiva (kg/ha)
2,23	14,0	7,3	85
2,23	20,0	10,5	80
3,00	20,0	7,5	90
3,00	30,0	11,2	80
3,00	40,0	14,9	70
4,00	20,0	5,4	95
4,00	30,0	8,1	90
4,00	40,0	10,9	80

a) Priskvot = kvävepris delat med spannmålspris (efter avdrag på 0,32 kr/kg för rörliga kostnader).

**Diagram 2.** Teoretisk optimal kvävegiva beroende på priskvot, maltkorn 5 ton/ha.



#### 4.2.4 Stora variationer i ekonomiskt optimal giva

Variationen i gödslingsoptimum är stor mellan fält och år. I de fältförsök som ligger bakom rekommendationerna ligger optimum i höstvetete vid 8–9 ton på mellan 85 och 250 kg per hektar, vilket innebär en skillnad på 45–120 kg N jämfört med riktvärdet.

För maltkorn varierade den optimala givan i försöken mellan 50 och 160 kg per hektar vid skördar på 6–7 ton per hektar. Vilket är en skillnad på 45–65 kg per hektar jämfört med riktvärdet. Detta visar hur viktigt det är att du anpassar givan till förutsättningarna på ditt eget fält. Att anlägga en nollruta är ett bra sätt att ta reda på fältets förutsättningar, läs mer i [kapitel 1.2.3](#).



**Bild 26a och b.** Lägg ut en presenning eller stäng av gödselutmatningen några meter (bild 26a) så får du en nollruta där du ser hur mycket kväve marken levererar (bild 26b). Om nollrutan är frodig och grön kan du minska gödslingen i fältet. Om nollrutan är tunn och blek medan fältet i övrigt är frodigt, kan du i stället behöva öka gödslingsnivån.

**Foton:** Katarina Börling

#### 4.2.5 Riktgivorna för höstveten utgår från aktuella försöksresultat

För höstveten utan proteinbetalning har 94 försök med stråsåden som förfrukt från åren 2011–2020 använts i beräkningarna. Beräkningar med antagna priser ger ett medelvärde på optimum för höstveten utan proteinbetalning på 190 kg kväve per hektar vid en skördenivå på cirka 9 800 kg per hektar och proteinhalten 11,0 %.

För höstveten med proteinbetalning har vi inte tagit med försöken med fodersorter. Försöksunderlaget består därför av 79 försök. Beräkningar med antagna priser ger ett medelvärde på optimum för höstveten med proteinbetalning på cirka 215 kg kväve per hektar vid en skördenivå på cirka 9 950 kg per hektar och proteinhalten 12,0 %.

##### 4.2.5.1 Anpassa gödslingen efter sort

Höstvetesorterna kan delas in i tre grupper utifrån hur kvävebehovet varierar: hög-, medel-, respektive lågproteinsorter enligt försöksserie L7–150 (Hammarstedt & Nilsson, 2019; 2020).

Högproteinsorterna Praktik, Julius, Linus, Etana och Bright har relativt höga proteinhalter vid ekonomiskt optimal gödsling, oavsett skördenivå (12–13 %). Därför lämpar sig dessa sorter för odling med krav på en viss proteinhalt, som krävs vid odling av brödvete.



Lågproteinsorterna Mariboss, Torp och Hereford ger ofta höga skördar, men har proteinhalter på 10–11 % vid optimum. Det är svårt att höja proteinhalten i dessa sorter även om man försöker reglera med kvävegödslingen. Därför passar dessa sorter bäst för odling utan krav på proteinhalt som till exempel vid odling av fodervete, stärkelsevete eller etanolvete.

För mellangruppen kan proteinhalten i viss mån regleras med gödslingen beroende på vad spannmålen ska användas till. I denna grupp finns sorterna Ellvis, Reform, Brons, Informer och Hallfreda. Eftersom det kan vara svårt att reglera proteinhalten med gödslingen är det viktigt att välja en sort som passar odlingsinriktningen på gården.

För Mariboss visar tidigare försök att den svarar bra skördemässigt på relativt låga kvävegivor. Därför kan du dra ner kvävegivan cirka 10–20 kg per hektar jämfört med rekommendationerna i [tabell 16](#) och ändå nå ekonomiskt optimal kvävegiva.



**Bild 27.** Höstvete.  
**Foto:** Urban Wigert

#### 4.2.6 Strategier för höstvete – välj strategi efter odlingsinriktning

Välj en gödslingsstrategi som passar inriktningen och kvalitetskraven i din odling. Det är en fördel att planera för flera kvävegivor så att du kan anpassa gödslingen under säsongen. Det minskar risken för liggsäd och även risken för kväveförluster genom utlakning och lustgasavgång.

För att kunna uppnå en hög kväveeffektivitet är det viktigt med ett väl etablerat bestånd under hösten. Normalt sett är det inte lönsamt att gödsla med kväve till höstvete på hösten. Det kan ändå vara ekonomiskt och miljömässigt försvarbart att lägga en mindre mängd kväve under hösten om det ingår i ett annat gödselmedel med till exempel fosfor och kalium (Gruvaeus, 2005b). Tänk dock på att följa lagkraven för gödsling med kväve till höstsäd på hösten (se [kapitel 2](#)).



**Bild 28.** Genom att dela upp gödslingen i flera kvävegivor minskar du riskerna för förluster och gör det möjligt att anpassa totala kvävegivan efter årets förutsättningar.  
**Foto:** Janne Andersson

En tidig gödsling kan öka bestockningen till sent sådd höstvete. Tänk på att en tidig giva oftast inte kompenserar hela skördebortfallet i ett svagt bestånd som haft en dålig etablering eller delvis utvintrat. Det finns snarare en risk att kvävet försvinner innan grödan hinner ta upp det. I ett bra höstvetebestånd



finns det normalt sett inte något behov av tidig kvävegödsling på våren för att gynna bestockningen.



Kvävet på våren bör läggas så att en tillräckligt stor del är tillgänglig inför stråskjutningen. Om det inte finns tillräckligt med kväve för plantan inför stråskjutningen kan antalet skott reduceras. Grödan kan dock till viss del kompensera färre antal skott med fler småax och större kärnor. Utvecklingsrytmen i olika höstvetesorter varierar. Tidiga sorter har genetiskt en tidigare utveckling och tillväxt och behöver därför tillgång till kväve något tidigare än medelsena och sena sorter.

Gödlingsstrategierna baseras på att du använder gödselmedel med ammoniumnitrat eller kalksalpeter vid gödsling i växande gröda.

## Strategier för kvävegödsling till höstvet

Utvecklingsstadiet för stråsåden enligt Zadoks skala (DC)

- |                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| 5 - Roten växer ut från kärnan | 39 - flaggbladets slida just synlig |
| 10 - Uppkomst                  | 45 - flaggbladets slida vidgad      |
| 13 - 3 blad utvecklade         | 55 - halva axen framme              |
| 22 - huvudskott + 2 sidokott   | 65 - full blom                      |
| 24 - huvudskott + 4 sidokott   | 75 - mjölkmodnad                    |
| 30 - begynnande stråskjutning  |                                     |
| 31 - 1:a noden kan kännas      |                                     |
| 32 - 2:a noden kan kännas      |                                     |
| 37 - flaggbladet just synligt  |                                     |



**Bild 29.** Bilden visar olika strategier för kvävegödsling till höstvet och ungefär hur stor andel av den totala kvävegivan som du bör ge vid olika utvecklingsstadiet.

#### 4.2.6.1 Tvådelad kvävegiva ger möjlighet att årsmånsanpassa

Om du har som mål att odla brödvete med minst 11,5 % proteinhalt, eller om du förväntar dig en hög skörd bör du dela upp kvävegivan i minst två givor. Vanligen delas gödslingen upp i huvudgiva och kompletteringsgiva. Grundrekommendationen är att tillföra cirka 70 % av totalmängden som huvudgiva i senare delen av bestockningsfasen och att komplettera med cirka 30 % (strategi A).

Avvakta så länge som möjligt med den sista kvävegivan. Då har du möjlighet att öka, minska eller helt avstå från ytterligare gödsling beroende på markens mineralisering och hur grödan ser ut. Fältförsök har visat att sista givan strax före axgång (i DC 45, när flaggbladets slida är vidgad) ger samma skördenivå men högre proteinhalt och tusenkornvikt jämfört med att tillföra allt kväve före stråskjutning (Nilsson, 2016). Andra fältförsök visar att det går att påverka både skörd och proteinhalt vid gödsling fram till avslutad blomning (DC 69). Men då behöver kvävet ges i form av kalksalpeter så att det är direkt växttillgängligt (Jönsson & Hansson, 2018).

Ett alternativ på fält med svag kvävetillgång i försommartorra områden är att lägga en tidig, så kallad bestockningsgiva i DC 22 för att grödan ska klara en eventuell torrperiod och för att sidokotten inte ska reduceras i lika stor utsträckning. Bestockningsgivan kan vara cirka 25 % av planerad totalgiva (strategi D). Resterande 75 % av kvävet läggs strax före stråskjutningen. Du har dock ingen möjlighet att årsmånsanpassa givan med denna strategi.

#### 4.2.6.2 Tre eller flera kvävegivor vid höga skördar och krav på proteinhalt

Om du förväntar dig höga skördar och det är angeläget att nå viss proteinhalt kan du dela upp givan på tre eller fyra tillfällen.

Minska huvudgivan i bestockningsfasen något jämfört med strategi A och fördela resterande kvävemängd ungefär lika mellan en giva i tidig stråskjutning och en sen kompletteringsgiva. Fördelningen kan då bli 60 % till huvudgivan, 20 % vid tidig stråskjutningsfas och 20 % kompletteringsgiva (strategi B). Precis som för en tvådelad giva är det bra att avvakta så länge som möjligt med den sista kvävegivan och anpassa den efter markens mineralisering och hur grödan ser ut. Försöksresultat visar att du kan få effekt av gödslingen ända fram till avslutad blomning (se resonemang för strategi A) (Jönsson & Hansson, 2018).

I vissa fall kan första givan behöva läggas relativt tidigt för att klara en eventuell torrperiod, precis som i strategi D. Då kan det vara lämpligt att lägga 25 % av den totala kvävegivan i bestockningsfasen och sedan 50 % strax före stråskjutning och 25 % vid en sen kompletteringsgiva (strategi C). Fördelen jämfört med strategi D är att du då kan anpassa den sista givan efter årsmånerna.

#### 4.2.6.3 Planera alltid för att gödsla mer än en gång

Du bör alltid planera för att gödsla minst två gånger. Om du lägger allt på en gång (strategi E) finns ingen möjlighet till anpassning efter årets förhållanden. Du kan aldrig veta hur mycket kväve din gröda verkligen behöver förrän senare under säsongen. Risken för förluster ökar också. Men ett år med lågt



**Bild 30.** Rågvete.  
**Foto:** Lina Norrlund

kvävebehov kan du hamna i en situation där en sista giva inte behövs och det räcker med bara den första giva du lagt inför stråskjutningen.

#### 4.2.7 Riktgivor och strategier för rågvete – dela givan

Under åren 2001–2008 ingick rågvete i sort/kväveförsök i norra Götaland och Svealand tillsammans med höstvetete. Även om det inte fanns några försök i södra Götaland, kan vi anta att motsvarande förhållanden gäller även där. Ekonomiskt optimal kvävegiva ligger ungefär som för fodervete, men pris skillnaden mellan fodervete och rågvete gör dock att rekommendationen till rågvete är något lägre än till fodervete.

Precis som i andra stråsådesgrödor bör du planera för att gödsla två gånger. Du kan ge en mindre giva, cirka 30 % av beräknat totalbehov, så snart marken är farbar för att säkerställa grödans tidiga kvävebehov. Resten tillförs när grödan är i sent bestockningsstadium.

#### 4.2.8 Riktgivor och strategier för höstkorn – dela givan och minska risken för liggsäd

För höstkorn har vi använt resultat från 23 kväveförsök i höstkorn i södra och mellersta Sverige från 2010–2012. Kväveoptimum i försöken låg något över det för fodervete, men då vi bara har tre års försök och det dessutom finns risk för liggsäd i höstkorn har vi valt att lägga rekommendationen på samma nivå som för rågvete.

Du bör normalt planera för att gödsla två gånger med kväve till höstkorn. Dels minskar du då risken för liggsäd och dels får du möjlighet att anpassa totala givan efter årets förutsättningar. En tidig kvävegiva ökar grödans bestockning. Var därför försiktig med tidig giva till ett mycket tätt bestånd då det ökar risken för liggsäd.

Huvudgivan bör läggas i tid inför stråskjutningen. Håller du nere huvudgivan kan du bättre anpassa gödslingen efter årsmånen. Om du bedömer en högre skördepotential och om tillväxtbetingelserna är goda, kan du komplettera med mer kväve i mitten av stråskjutningen.



**Bild 31.** Blommande råg.  
**Foto:** Lina Norrlund

#### 4.2.9 Riktgivor och strategier för höstråg – något lägre givor än i höstvetete

I höstråg genomfördes 12 kväveförsök i norra Götaland och i Svealand under åren 2006–2008. I försöken jämfördes led med och utan tillväxtreglering. Tillväxtregleringen ökade odlingssäkerheten och skördepotentialen i viss utsträckning. Optimal gödslingsnivå i försöken var genomgående lägre än i de flesta höstveteförsök. Det gällde både i led med och utan tillväxtreglering. Skördeökningen var måttlig för givor över 120 kg kväve per hektar.

Eftersom det finns få försök med råg i Sverige har vi även vägt in resultat av danska försök samt praktisk erfarenhet för att bestämma lämpliga riktgivor.

Precis som för höstkorn bör du dela kvävegivan till höstråg på grund av risken för liggsäd och för att bättre anpassa gödslingen efter skördepotential och tillväxtbetingelser. Var försiktig med tidig kvävegiva till ett frodigt bestånd för att minska risken för liggsäd. Lägg huvudgivan i tid inför stråskjutningen och komplettera med ytterligare giva om behov finns.

#### 4.2.10 Riktgivor och strategier för vårvete – dela kvävegivan för att nå hög proteinhalt

Rekommendationerna för vårvete syftar till att nå minst 13 % proteinhalt och vi har gjort en prisjustering för proteinhalt vid beräkning av optimal giva. Riktgivorna grundar sig på ett äldre försöksmaterial tillsammans med försöksmaterialet för höstvete. Nya försök i vårvete (2019–2021) bekräftar stora variationer i gödslingsbehov på grund av fältens förutsättningar och årsmån och ger därför ingen anledning att ändra nuvarande rekommendationer för vårvete.

Om du ska nå tillräcklig proteinhalt i vårvete är det viktigt att dela upp kvävegivan i minst två, gärna fler givor. Dessutom krävs ofta att marken kan leverera tillräckligt med kväve, som till exempel mullrika jordar, en kväverik förfrukt eller att mycket stallgödsel har tillförts. Proteinhalten i vårvete är även sortberoende, därför är sortvalet viktigt om du strävar efter att kunna sälja vårvetet som brödvete (Johansson, 2017).

Den första kvävegivan tillför du i anslutning till sådden. Den andra givan tillför du normalt under stråskjutningsfasen, men i försommartorra områden bör du tillföra den andra givan redan under bestockningsfasen. Genom att anpassa en tredje giva runt axgång kan du säkra proteinhalten.

#### 4.2.11 Riktgivor för vårkorn – stor variation mellan platser och år

Det finns ett relativt stort försöksmaterial i vårkorn eftersom det genomförts kväveförsök i vårkorn i stort sett varje år. Vi har använt resultat från 52 försök under perioden 2010–2020 med stråsåd som förfrukt. Försöken från 2014 tas inte med då de inte var representativa för produktionen. 2019 fanns inga försök utlagda. Vi har också tagit hänsyn till resultatet från 6 försök i Skåne från 2010–2011 med sockerbetor som förfrukt.

Utifrån antagna priser blir optimal kvävegiva för foderkorn i medeltal cirka 120 kg kväve per hektar och skörd vid optimal giva 7 250 kg per hektar och proteinhalten 11,0 %. För malkorn blir optimal giva i medeltal cirka 120 kg kväve per hektar och skörd vid optimal giva cirka 7 220 kg per hektar och proteinhalten 11,0 %. Variationen i gödslingsoptimum är stor även för vårkorn.

För att uppnå högsta möjliga skörd och för att pricka in rätt proteinhalt i malkorn är det viktigt att justera kvävegivan utifrån de lokala förhållandena och din egen erfarenhet. Om det är ett torrt år med lägre skördenivåer eller om du fått för höga proteinhalter de senaste åren kan du behöva minska kvävegivan jämfört med rekommendationerna. Om du ofta får för höga proteinhalter kan du undersöka möjligheten att odla malkorn för whiskeyframställning där det finns en nedre gräns men ingen övre gräns för proteinhalt.

Om det varit svårt att få tillräckligt hög proteinhalt i malkornet under de senaste åren, kan du behöva öka kvävegivan i förhållande till riktgivorna och tidigare års gödsling och/eller omfördela kvävet över odlingssäsongen. En senare kvävegiva ger oftast en högre proteinhalt än en tidig giva. Vid gödslingen behöver du också ta hänsyn till att vissa malkornssorter som till exempel RGT Planet har lägre proteinhalt än andra sorter.

#### 4.2.12 Riktgivor för havre – något lägre givor än för foderkorn

I havre finns endast ett fåtal gödslingsförsök och de är relativt gamla. Därför bedömer vi att det är rimligt att relatera havrerekommendationen till försök-

smaterialet i vårkorn. Eftersom priset för havre är något lägre än för korn ligger riktgivorna för havre (som ska användas till foder) 5 kg per hektar lägre än rekommendationerna för foderkorn. Om du odlar grynhavre kan du öka kvävegivan med 5–10 kg per hektar jämfört med rekommendationerna för havre i [tabell 16](#).



**Bild 32.** Optimal giva varierar mycket mellan olika fält och olika år. Justera kvävegivan efter det enskilda fältet och årets förutsättningar. **Foto:** Janne Andersson

#### 4.2.13 Strategier för vårkorn och havre – delade givor ger möjlighet att årsmånsanpassa

Att kvävegödsla två gånger gör det lättare att anpassa givan efter behovet. Dessutom minskar risken för liggsäd och kväveförluster i form av lustgas och utlakning.

Fältförsök i malkorn har visat att det går att dela givan i två delar med bibehållen skörd. Fördelen med att dela upp givan är att du kan anpassa den andra givan efter hur grödan ser ut och hur mycket kväve marken bidrar med. Det är lämpligt att lägga cirka 70 % av kvävebehovet vid sådd och sedan tillföra resterande 30 % i växande gröda. Andra givan bör du lägga i tidig stråskjutning (när grödan har en till två noder, DC 31–32).

Om du sprider stallgödsel till foderkorn eller havre kan du komplettera den med mineralgödsel för att nå önskad kvävenivå. Du kan till exempel grundgödsla med mineralgödsel vid sådd och sedan gödsla med flytgödsel i växande gröda (ungefär när grödan är 10–15 cm hög) med marknära spridning. Effekten av flytgödseln kan dock bli liten om det är mycket torrt vid och efter spridningstillfället, läs mer om spridningstidpunkt i [kapitel 2.2.3](#).

På lätta jordar där risken för packning inte är så stor kan du sprida stallgödsel före sådd. Då kan du komplettera med mineralgödsel före eller efter sådd.

##### 4.2.13.1 Anpassa gödselgivan efter såtidpunkten

Riktgivorna i [tabell 16](#) utgår från normal såtidpunkt. Vid tidig vårsådd utnyttjas växtsäsongen på ett bättre sätt, vilket ofta ger en högre skörd. Sen sådd medför som regel lägre skörd. Justera skördeförväntningarna eller ändra enligt tumregeln nedan.

#### Anpassa gödslingen till vårsäd efter såtidpunkt

Sådd av vårsäd upp till 10 dagar tidigare än normalt: + 1 kg kväve per dag

Sådd av vårsäd upp till 10 dagar senare än normalt: - 1 kg kväve per dag



**Bild 33.** Tidig sådd resulterar ofta i högre skörd. Då kan du behöva öka kvävegivan något. Vid sen sådd kan du minska kvävegivan.

**Foto:** Göran Molin



## 4.3 Kväverekommendationer och strategier för oljeväxter

### 4.3.1 Höstgödsling till höstoljeväxter

Höstoljeväxter behöver ha tillgång till kväve redan på hösten för att få en bra tillväxt. Efter en spannmålsgröda behöver höstraps cirka 60 kg kväve per hektar vid sådd (Gunnarson & Nilsson, 2010). Om du har en bra förfrukt, till exempel klövervall eller ärter, eller om det finns mycket restkväve kvar i marken, kan du normalt sett dra ner på kvävegivan till höstrapsen. Enligt spridningsreglerna får du lägga maximalt 60 kg lättillgängligt kväve inför sådd av höstoljeväxter inom nitratkänsligt område.

### 4.3.2 Vårgödsling till höstoljeväxter – utgå från höstupptag, mineralisering och skörd

För att bestämma kvävegivan på våren till höstoljeväxter behöver du bedöma kväveupptag på hösten, mineralisering samt förväntad skörd i dina höstoljeväxtfält.

**Kväveupptag på hösten** kan du bestämma genom att:

- klippa all ovanjordisk bladmassa på en kvadratmeter av fältet sent på hösten när tillväxten har avstannat, och sedan väga bladmassan. Mer information och en instruktionsfilm finns på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, [sfo.se](http://sfo.se).
- använda en traktorburen kvävesensor och köra i fältet.
- göra en uppskattning utifrån bilderna på nästa sida.

**Mineraliseringen under vår eller försommar** bedömer du utifrån tidigare erfarenhet från fältet, vilken förfrukt det är och om du regelbundet tillför organiska gödselmedel. Du kan använda följande riktvärden:

- Låg mineralisering: 10–20 kg per hektar.
- Medelhög mineralisering: cirka 30 kg per hektar.
- Hög mineralisering: 40–50 kg kväve per hektar.

**Förväntad skörd** bedömer du genom att utgå från normalskörd på fältet och hur grödan ser ut.

Ta sedan fram kvävebehovet genom att antingen titta i [tabellerna 19–21](#) eller räkna fram det enligt [kapitel 4.3.2.2](#).

Kvävebehovet till höstoljeväxter är lägre på våren om grödan har tagit upp mycket kväve under hösten. Behovet minskar också om det är en hög mineralisering under våren/försommaren, medan behovet är högre vid hög skördenivå. Modellen som vi använder för att beräkna riktgivor är framtagen utifrån 27 försök med höstraps utförda 2011–2016 (Engström, 2015). Modellen är framtagen utifrån försök i höstraps, men du kan utgå från den även när du planerar vårgödsling till höstrybs.



**Bild 34.** Klipp en kvadratmeter höstraps på hösten och uppskatta mineralisering och skörd för att bedöma kvävegivan på våren.  
**Foto:** Anders Lindgren



Exempel på hur höstrapsen kan se ut under sen höst vid olika kväveupptag. Ramarna är 1 m<sup>2</sup> stora.



**Bild 35.** Höstupptag 16 kg N/ha



**Bild 36.** Höstupptag 49 kg N/ha



**Bild 37.** Höstupptag 77 kg N/ha

**Foto:** Lena Engström



**Bild 38.** Höstupptag 90 kg N/ha

#### 4.3.2.1 Ta fram kvävebehovet ur tabeller med tre olika nivåer på markens mineralisering

I [tabellerna 19–21](#) hittar du riktgivor utifrån tre nivåer av mineralisering under vår/försommar. Om du har ett fält som har en låg mineralisering på våren och försommaren läser du i [tabell 19](#). Om du har ett fält med medelhög mineralisering läser du i [tabell 20](#). Och om du har ett fält med hög mineralisering läser du i [tabell 21](#). Riktgivorna i tabellerna är avrundade till jämna femtal. Om du har funderingar kring låga riktgivor kan du läsa mer i [kapitel 4.3.2.3](#).

#### Exempel om du har klippt och vägt bladmassa på hösten

Medelhög mineralisering – Gå till [tabell 20](#). Höstklippning gav 1,8 kg bladmassa på en kvadratmeter

– Läs på raden för 1,8 kg i kolumnen Vikt bladmassa (kg/m<sup>2</sup>).

Förväntad skörd är cirka 4 500 kg – Läs i kolumnen för 4 500 kg skörd.

**Resultat:** Vårbehovet är cirka 110 kg kväve per hektar.

#### Exempel om du har mätt eller uppskattat kväveupptaget

Hög mineralisering – Gå till [tabell 21](#).

Du har inte klippt bladmassa på hösten, men beståndet under sen höst ser ut ungefär som det på bild 37 med höstupptag 77 kg kväve per hektar. Du antar då att kväveupptaget är cirka 80 kg/ha – Läs på raden för 80 kg kväve per hektar i kolumnen Kväveupptag höst (kg N/ha).

Förväntad skörd är cirka 3 000 kg – Läs i kolumnen för 3 000 kg skörd.

**Resultat:** Vårbehovet är cirka 85 kg kväve per hektar.

**Tabell 19.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha på våren till höstoljeväxter. **Låg mineralisering** vår eller försommar (15 kg N/ha).

Kväveupptag höst (kg/ha)	Vikt bladmassa (kg/m <sup>2</sup> )	Skörd (kg/ha)					
		2500	3000	3500	4000	4500	5000
20	0,4	175	185	195	205	215	225
40	0,7	150	160	170	185	195	205
60	1,1	130	140	150	160	170	180
80	1,4	105	120	130	140	150	160
100	1,8	85	95	105	115	125	140
120	2,1	65	75	85	95	105	115
140	2,5	40	50	60	75	85	95
160	2,8	20	30	40	50	60	70

**Tabell 20.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha på våren till höstoljeväxter. **Medelhög mineralisering** vår eller försommar (30 kg N/ha).

Kväveupptag höst (kg/ha)	Vikt bladmassa (kg/m <sup>2</sup> )	Skörd (kg/ha)					
		2500	3000	3500	4000	4500	5000
20	0,4	155	165	180	190	200	210
40	0,7	135	145	155	165	180	185
60	1,1	115	125	135	145	155	165
80	1,4	90	100	110	120	135	145
100	1,8	70	80	90	100	110	120
120	2,1	45	55	70	80	90	100
140	2,5	25	35	45	55	65	75
160	2,8	5	15	25	35	45	55

**Tabell 21.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha på våren till höstoljeväxter. **Hög mineralisering** vår eller försommar (45 kg N/ha).

Kväveupptag höst (kg/ha)	Vikt bladmassa (kg/m <sup>2</sup> )	Skörd (kg/ha)					
		2500	3000	3500	4000	4500	5000
20	0,4	140	150	160	170	180	195
40	0,7	120	130	140	150	160	170
60	1,1	95	105	115	130	140	150
80	1,4	75	85	95	105	115	125
100	1,8	50	65	75	85	95	105
120	2,1	30	40	50	60	70	85
140	2,5	10	20	30	40	50	60
160	2,8	0	0	5	20	30	40

#### 4.3.2.2 Räkna fram kvävebehovet med hjälp av Höstrapssnuran

Du kan beräkna vårkvävegivan i vår höstrapssnurra på Greppa Näringens webbplats, [greppa.nu](http://greppa.nu). I beräkningssnuran kan du sätta in dina värden och få ut en rekommenderad vårkvävegiva.

Om du vill räkna fram kvävebehovet själv kan du använda ekvationerna nedan. Den första använder du om du har klippt och vägt bladmassa. Den andra använder du om du har mätt kväveupptaget med kvävesensor eller använder bilderna som underlag för bedömning.

### Om du har klippt och vägt bladmassa på hösten

Rekommenderad giva =  $159 - (61,9 \times \text{vikt bladmassa i kg/m}^2) - (1,1 \times \text{mineralisering i kg N/ha}) + (0,021 \times \text{skörd i kg/ha})$ .

#### Exempel

Höstklippning ger 1,1 kg bladmassa på en kvadratmeter.

Mineraliseringen på fältet uppskattas till 15 kg N/ha.

Förväntad skörd är cirka 3 000 kg/ha.

Rekommenderad giva =  $159 - (61,9 \times 1,1) - (1,1 \times 15) + (0,021 \times 3\,000) = 137$  kg kväve per hektar.

### Om du har mätt eller uppskattat kväveupptaget

Rekommenderad giva =  $159 - (1,1 \times \text{kväveupptag höst i kg/ha}) - (1,1 \times \text{mineralisering i kg N/ha}) + (0,021 \times \text{skörd i kg/ha})$ .

#### Exempel

Du har inte gjort någon höstklippning, men du uppskattar kväveupptaget på hösten till cirka 80 kg/ha efter jämförelse med bilderna.

Mineraliseringen på fältet uppskattas till 45 kg N/ha.

Förväntad skörd är cirka 4 000 kg/ha.

Rekommenderad giva:  $159 - (1,1 \times 80) - (1,1 \times 45) + (0,021 \times 4\,000) = 106$  kg kväve per hektar

#### 4.3.2.3 Om du får mycket lågt kvävebehov

När du tar fram ditt kvävebehov för våren kan det hända att behovet blir mycket lågt eller till och med noll. Detta sker om höstoljeväxterna har tagit upp stora mängder kväve på hösten. Försöksresultaten har visat att den optimala kvävegivan kan vara ända ner till noll kg kväve per hektar, så det är rimligt att tro att höstoljeväxterna kan klara sig utan tillfört kväve på våren. I vissa fall kan det vara motiverat med en startgiva på våren, även om beräkningen visar att kvävebehovet är mycket lågt. Lägg i sådana fall en liten giva och lämna gärna en nollruta i fältet. På så sätt kan du se hur oljeväxterna klarar sig utan kväve på våren och kan ta hänsyn till det nästa gång du odlar höstoljeväxter.

### 4.3.3 Strategier för höstoljeväxter – första vårgivan så tidigt som möjligt

Höstoljeväxter har kraftig tillväxt redan under hösten. Därför behöver du oftast gödsla dem direkt vid sådd om du har stråsäd som förfrukt. Om du däremot har en förfrukt som ger god kväveefferverkan kan du dra ner eller låta bli kvävegivan på hösten. Det är viktigt att se till att du sår och gödslar i god tid på hösten så att grödan hinner växa till sig före invintring. Om

plantorna är kraftiga på hösten men inte börjat sträcka på sig ökar chanserna för en god övervintring. Dessutom minskar behovet av kväve på våren om beståndet är kraftigt och övervintringen varit god.

Du bör dela upp kvävegivan på våren i två givor och vår grundrekommendation är att du använder gödselmedel med ammoniumnitrat och svavel till båda givorna. Den första givan bör du lägga på nattfrusen mark eller så fort marken bär efter tjällossningen. Tänk dock på att du i känsliga områden inte får gödsla under perioden november till februari. Den första givan ska täcka ungefär halva vårens kvävebehov. Resten ger du när du med säkerhet vet att oljeväxterna övervintrat eller cirka fyra veckor efter den första givan.

Om du inte har lagt något kväve före mitten av april bör du lägga hela givan på en gång. I sådana fall bör du dra ner något på skördeförväntningarna och därmed även kvävegivan. Annars är risken stor för tidig liggbildning.

#### 4.3.4 Riktgivor för våroljeväxter och lin

Under 2014–2016 har Engström, SLU genomfört 17 försök med kvävegödsling till hybridvårrops (Engström, 2017). Sambandet mellan skördenivå och optimal giva var mycket svagt på grund av variation i markens kväveleverans på försöksplatserna och variation i nederbörd och årsmån. I medeltal var optimal kvävegiva i försöken något högre än den riktgiva vi anger. Efter variationen i optimal kvävegiva var stor i försöken har vi i dagsläget valt att behålla riktgivorna på samma nivå som tidigare (tabell 22). Det är viktigt att anpassa kvävegivan både efter förväntad skörd och efter odlingsplatsens förutsättningar, årsmån och hur grödan utvecklas.

Ett fåtal kväveförsök samt praktisk erfarenhet ligger bakom riktgivorna i oljelin (Krijger & Gunnarson, 2011b; Gunnarson, 2014). Den skörderelaterade justeringen av gödslingen till våroljeväxter och lin är 20 kg kväve per ton skördeavvikelse.



**Bild 39.** Blommande oljelin.  
**Foto:** Urban Wigert

**Tabell 22.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha till våroljeväxter och lin. Gäller för mineraljord och med förfrukt stråsäd.

Gröda	Skörd (ton/ha)			
	1,5	2,0	2,5	3,0
Våroljeväxter	100	110	120	130
Oljelin	50	70	90	

## 4.4 Kväverekommendationer och strategier för slåtter- och betesvall samt gräsfrövall

### 4.4.1 Kväverekommendationer för slåttervall

Rekommendationer för kvävegödsling till gräsvallar och blandvallar med olika klöverhalter visas i tabell 23. De är beräknade utifrån 14,0 kr per kg kväve och 0,95 kr per kg ts för vall på rot. Med gräsvall avser vi både vallar med arter som ängssvingel och timotej, och nyare arter som rörsvingelhybrider. Riktgivan för gräsvall i alla skördesystemen är justerad med 20 kg

kväve per ton torrsbstans ökad eller minskad skörd vid alla skördenivåer (Anne-Maj Gustavsson, muntligt meddelande, 2016).

Rekommendationerna i [tabell 23](#) påverkas av:

- skördenivå
- antal skördar
- gräsarter
- mängd baljväxter i vallen
- hur mycket kväve marken levererar
- kostnad för kväve och värdet på vallfodret
- vilket djurslag som ska äta fodret.

I kommande avsnitt kan du läsa mera om hur de olika faktorerna påverkar vallfodret.

**Tabell 23.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha till slåttervall vid två, tre eller fyra skördar per år. Givorna är beräknade utifrån 14,00 kr/kg kväve och 0,95 kr/kg ts för vall på rot.

Gräsvallar vid två skördar avser traditionella arter som timotej och ängssvingel. Gräsvallar vid tre och fyra skördar avser rörsvingelhybrider. Om du odlar gräsvall med traditionella arter kan du sänka kvävegivan med ungefär 25 kg per ha vid samma skördenivå. Skördenivån avser bärgad skörd efter 15 % fältförluster.

Gröda	Bärgad skörd (ton ts/ha)						
	6	7	8	9	10	11	12
<b>Två skördar</b>							
Gräsvall (traditionella arter)	130	150	170	190			
Blandvall, 10 % klöver	115	135	155	170			
Blandvall, 20 % klöver	90	105	120	135			
Blandvall, 40 % klöver	40	45	50	55			
<b>Tre skördar</b>							
Gräsvall (rörsvingelhybrider)		180	200	220	240	260	
Blandvall, 10 % klöver		160	180	200	215	235	
Blandvall, 20 % klöver		135	150	165	180	195	
Blandvall, 40 % klöver		80	90	100	110	115	
<b>Fyra skördar</b>							
Gräsvall (rörsvingelhybrider)		230	250	270	290	310	330
Blandvall, 10 % klöver		205	225	245	260	280	295
Blandvall, 20 % klöver		175	190	205	220	235	250
Blandvall, 40 % klöver		105	115	120	130	140	150

#### 4.4.1.1 Bakgrund till rekommendationerna för vall

Rekommendationerna för kvävegödsling till gräsvallar och tre skördar i [tabell 23](#) utgår från Bodil Frankow-Lindbergs sammanställning (Frankow-Lindberg, 2017). I sammanställningen ingår försök med kväve till rena gräsvallar och



blandvallar med röd- och/eller vitklöver. Ofta har skördarna varit väldigt höga och de optimala kvävegivorna låga i blandvallar. För blandvallar har vi därför valt att utgå från rekommendationerna för gräsvallar med rörsvingelhybrider för 2024 och justerat givorna utifrån klöverhalt enligt [tabell 24](#). Om du har krav på att proteinhalten ska bli hög och odlar gräsvall bör du höja gödslingen jämfört med givorna i [tabell 23](#).

I de flesta fall är produktionsfunktionen beräknad som en andragradsekvation, där skörden ökar med ökande kvävegiva för att slutligen nå ett optimum. I blandvallar är det ofta så att ökande kvävegiva först sänker skörden när klöverhalten sjunker. När kvävegivan har stigit så pass mycket att gräsen gynnas ökar skörden igen.

Utifrån de priser vi har räknat med i år blir ekonomiskt optimal kvävegiva för rena gräsvallar med traditionella arter som ängssvingel och timotej lägre än för gräsvallar med rörsvingelhybrider. Vi har valt att redovisa riktgivorna till tre och fyra skördar för gräsvallar med rörsvingelhybrider i [tabell 23](#). För rena gräsvallar med traditionella arter som timotej och ängssvingel kan du sänka kvävegivan till gräsvall med ungefär 25 kg vid motsvarande skörd. Observera att vid två skördar avser riktgivorna gräsvall med traditionella arter. I [kapitel 4.1](#) kan du läsa mer om vilka priser vi har antagit vid beräkningarna.

#### 4.4.1.2 Gödsla vallen efter fältets skördepotential

Börja med att uppskatta skördepotentialen utifrån tidigare års skördenivåer på fältet. Utgå från den uppskattade skördenivån i tabellen och läs av rekommendationen för den typ av vall som du har. Andra faktorer än kväve som markens egenskaper och väderförhållanden kan begränsa skördenivån och därför kan du inte självklart gödsla dig till en högre skörd. Det innebär exempelvis att om du normalt sett tar en skörd på 8 ton ts per hektar, ökar den inte automatiskt till 9 ton ts per hektar bara för att du ökar gödslingen motsvarande en högre skörd. Vi bedömer att det är ekonomiskt optimalt att gödsla med de kvävegivor som vi anger för respektive valltyp, skördenivå och antal skördar.

I [kapitel 3.3](#) kan du läsa mer om hur du kan variera givan över fältet.



**Bild 40.** Justera gödslingen beroende på antal skördar, baljväxtandel och kvalitetskrav på fodret. **Foto:** Mårten Svensson



#### 4.4.1.3 Vad händer om priserna ökar?

I [kapitel 4.1](#) kan du läsa mer om vilka priser vi har antagit vid beräkningarna. Från och med 2018 räknar vi med ett femårsmedelvärde för kostnaderna. Erfarenheten visar att priskvoten påverkar de rekommenderade kvävegivorna ganska lite, mindre än de biologiska faktorerna som till exempel nederbörd och mineralisering i marken. Men kväve och spannmålspriserna varierar och marknaden är fortfarande ganska turbulent. Nedan ser du fem exempel för optimal kvävegiva och beräknad nettoskörd vid optimum för gräsvall med tre skördar vid förändrade kostnader för vall och kväve.

I exemplen är vallens kostnad beräknad till kostnaden för vall på rot, alltså är rörliga kostnader avdragna. Optimal kvävegiva och beräknad nettoskörd vid optimum redovisas först för gräsvall med traditionella arter och sedan med rörsvingelhybrider, båda med tre skördar.

**Exempel 1.** Om kvävepriset stiger till 20 kr per kg och vallkostnaden är densamma som i tabell 24, det vill säga 0,95 kr per kg ts, sjunker optimal kvävegiva till ca 180–200 kg/ha och nettoskörd vid optimum beräknas till 9 300–10 740 kg ts/ha. Det betyder att rekommendationen till gräsvall med tre skördar vid en skörd på 9 ton ts per hektar sjunker med ca 20–40 kg kväve per hektar.

**Exempel 2.** Om kvävepriset stiger till 20 kr per kg och vallkostnaden till ca 1,50 kr per kg ts, stiger optimal kvävegiva till ca 230–250 kg/ha och nettoskörd vid optimum beräknas till 10 030–10 740 kg ts/ha. Det betyder att rekommendationen till gräsvall med tre skördar vid en skörd på 9 ton ts per hektar sjunker med ca 15 kg kväve per hektar.

**Exempel 3.** Om kvävepriset stiger till 20 kr per kg och vallkostnaden till 2,50 kr per kg ts, stiger optimal kvävegiva till ca 260–280 kg/ha och nettoskörd vid optimum beräknas till 10 280–11 780 kg ts/ha. Det betyder att rekommendationen till gräsvall med traditionella arter med tre skördar ökar med 45 kg kväve per ha medan rekommendationen till gräsvall med rörsvingelhybrider är oförändrad.

**Exempel 4.** Om kvävepriset stiger till 25 kr per kg och vallkostnaden till ca 2,00 kr per kg ts, stiger optimal kvävegiva till ca 230–260 kg/ha och nettoskörd vid optimum beräknas till 10 030–10 610 kg ts/ha. Det betyder att rekommendationen till gräsvall med traditionella arter med tre skördar ökar med 15 kg kväve per ha medan rekommendationen till gräsvall med rörsvingelhybrider är oförändrad.

**Exempel 5.** Om kvävepriset stiger till 30 kr/kg och vallkostnaden till 2,00 kr/kg ts är optimal kvävegiva till 210–250 kg/ha och beräknad nettoskörd vid optimum till 9 790–11 500 kg ts/ha. Det är samma som rekommendationen i [tabell 24](#).

Var observant på att när gödslingen förändras påverkas även proteinhalten, artsammansättning och vallens kvalitet, läs mer i [kapitel 4.4.1.5](#).

#### 4.4.1.4 Beräkna kvävegivor till två eller fyra skördar

För fyra skördar har kvävegivan vid samma skördenivå ökat med 50 kg kväve per hektar jämfört med för tre skördar (Frankow-Lindberg & Jansson, 2014). I ett fyrskördesystem ökar råproteinhalten och smältbarheten eftersom skördarna tas tidigare jämfört med i ett treskördesystem.

För gräsvall med två skördar har vi rekommenderat en lägsta giva på 150 kg kväve vid 7 ton ts i skörd. Skillnaden i rekommenderad kvävegiva mellan två och tre skördar blir då liten (Anne-Maj Gustavsson, muntligt meddelande, 2017). Om kvävepriset sjunker eller om priset för vall på rot stiger kommer rekommendationerna för två skördar att höjas. Då beräknas rekommendationerna utifrån tre skördar men med ett avdrag på 30 kg kväve vid samma skördenivå.

#### 4.4.1.5 Baljväxter i vallen minskar behovet av kväve

Kvävegödsling gynnar gräsen på baljväxternas bekostnad. Att gynna gräsen kan förbättra deras möjlighet att ta över utrymme som utvintrade klöverplantor lämnar. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klöver till en ökad proteinhalt i vallfodret. I [tabell 23](#) anger vi kväverekommendationer för 10, 20 respektive 40 % klöver.

Om du vill uppnå en hög klöverhalt i den färdiga skörden, över 40 %, krävs att det finns ett mycket tätt bestånd av klöver på våren. Ett tätt bestånd krävs även för att du ska kunna använda justeringen för 20 % klöver eller mer. Rekommendationerna i [tabell 23](#) har tagits fram utifrån den justering som redovisas i [tabell 24](#). Tabellen visar hur du kan gödsla blandvallar om du eftersträvar en viss klöverandel i vallfodret. Enligt studier i norra Sverige (Gustavsson, 1989) ledde halv kvävegiva till blandvall jämfört med normal gödsling till gräsvall i ett tvåskördesystem till en klöverandel på 30–40 %. Samtidigt var det möjligt att behålla skördenivån.

**Tabell 24.** Relativ kvävegiva till blandvall jämfört med kvävegiva till gräsvall vid olika målnivåer för klöverhalt.

	Önskad klöverhalt						
	<10%	10%	20%	30%	40%	50%	>50%
Relativ kvävegiva vid 2 skördar	100%	90%	70%	50%	30%	0%	0%
Relativ kvävegiva vid 3 eller 4 skördar	100%	90%	75%	60%	45%	30%	0%

För att räkna ut rekommendationen för en blandvall utgår du från kvävegivan till gräsvall och multiplicerar den med procentsatsen i tabellen för den önskade klöverhalten, se exemplet nedan. Justeringen är uppdelad i gödsling vid två respektive tre eller fyra skördar.

Det är lätt att överskatta klöverandelen i fält eftersom klöverns blad är horisontella och gräsens vertikala. Dessutom har baljväxterna och gräsen lite olika tillväxttakt. Till hjälp för att bestämma rödklöverhalten finns skriften Bestämning av rödklöverhalten i vall (Gustavsson, 2001).

Baljväxterna är olika känsliga för konkurrens. I växande vall är vitklöver känsligast för konkurrens och kvävetillförsel, därefter kommer rödklöver och sist lusern (när den väl är etablerad). Rödklöver drabbas lättast av utvintring på grund av olika svampsjukdomar.

Minskad gödsling påverkar även vallfodrets kvalitet. Innehållet av till exempel råprotein, fiber och smältbarhet förändras med förändrad art-sammansättning.

**Exempel**

Vad blir totala kvävegivan för blandvall med en förväntad bärgad skörd på 8 ton ts per ha, skördad tre gånger och med målet att nå 30 % klöver? Gör så här: Läs i [tabell 23](#), rekommendationen för gräsvall med tre skördar är 200 kg kväve vid 8 ton ts.

Justeringen i [tabell 24](#) är 60 % av totalgivan om klöverhalten ska bli 30 %.

$200 \text{ kg kväve} \times 0,60 = \mathbf{120 \text{ kg kväve}}$



**Bild 41.** Om du har mycket baljväxter i vallen så minskar behovet av kväve.  
**Foto:** Linda af Geijersstam

#### 4.4.1.6 *Markens kvävebidrag varierar med djurtäthet, mullhalt, fukt och temperatur*

Från organiskt material i marken frigörs kväve (mineralisering) och den påverkas bland annat av markens temperatur, mullhalt och fuktighet. Anlägg ogödslade rutor för att se hur vallens höjd och färg påverkas av gödningen. Det ger dig en uppfattning om hur mycket kväve marken och baljväxterna bidrar med. På gårdarna där vallförsöken har anlagts har det ofta funnits cirka en djurenhet per hektar. Ett vuxet nötkreatur räknas som en djurenhet. Om djurtätheten är betydligt högre eller lägre behöver du justera kvävegivan nedåt eller uppåt. Justeringen beror på att det frigörs mer eller mindre kväve från stallgödseln men skillnaderna mellan olika år kan vara mycket stora. Läs mer om årsmånsvariation i [kapitel 1](#).

#### 4.4.2 **Strategier för slåttervall vid två, tre och fyra skördar**

Odlingstekniken har stor betydelse när du odlar slåttervall. Skördetidpunkt och kvävetillförsel är de två viktigaste faktorerna som styr vallens kvalitet. Skörda förstaskörden tidigt så finns goda förutsättningar för att du ska få ett grovfoder med hög kvalitet till högproducerande eller växande djur.

Vallprognoser för förstaskörd hittar du på webbplatsen [vallprognos.se](http://vallprognos.se). Där visas den beräknade tidpunkten för skörd utifrån provklippningar i vallar för ett antal platser i landet. Där visas också temperatursummor för att bestämma timotejens skördetidpunkt.

I [tabell 25](#) finns förslag på fördelning av kväve till de olika delskördarna.

**Fördela kvävegivan till två skördar:** Lägg cirka 60 % av totalgivan till första skörden och 40 % till andra skörden. Det innebär att om totala givan är 150 kg kväve, lägg 90 kg till förstaskörd och 60 kg till andraskörd. Fördela kvävet på samma sätt i blandvall.

**Fördela kvävegivan till tre skördar:** Lägg 40 %, 30 % och 30 % av totalgivan till respektive delskörd i gräsvall. Om det finns mycket baljväxter i vallen ge ca 40–50 % till förstaskörd, 35 % till andraskörd och 15–25 % till tredjaskörd. Om du vill gynna klöveren kan du helt utesluta kväve till sista skörden. Eventuellt kan du omfördela en del av kvävet till de andra skördarna.

**Fördela kvävegivan till fyra skördar:** Lägg ca 35 %, 25 %, 20 % och 20 % av totalgivan till respektive delskörd. Innehåller vallen mycket baljväxter, minska eller uteslut kvävet till sista skörden. Eventuellt kan du omfördela en del av kvävet till de andra skördarna.

**Tabell 25.** Förslag på fördelning av kväve i procent till de olika delskördarna.

Andel av kvävet till respektive delskörd (%)	Valltyp	Första-skörd	Andra-skörd	Tredje-skörd	Fjärde-skörd
Två skördar	Gräs	60	40		
	Blandvall	60	40		
Tre skördar	Gräs	40	30	30	
	Blandvall	40–50	35	15–25	
Fyra skördar	Gräs	35	25	20	20
	Blandvall	30–40	25–30	20–25	10–20

#### 4.4.2.1 Tillför kväve på våren när vallen grönskar

Tillför kväve på våren när vallen börjar grönska och direkt efter skörd. Stallgödsel behöver tillföras senast när vallen börjar grönska och direkt efter skörd för att grödan inte ska smutsas ner. Det bör gå minst tre veckor mellan gödsling och skörd för att du inte ska få problem med sporer i mjölken. Läs mer om näringsinnehåll i stallgödsel i [kapitel 2.2](#) och om spridningsteknik i [kapitel 3.2](#).

Om du har erfarenhet av låga råproteinhalter i vallfodret i förstaskörd kan du prova att lägga kvävet lite senare än du normalt brukar göra. Det kan höja råproteinhalten något. Det pågår forskning om att dela första kvävegivan till vall för att kunna anpassa den bättre efter årsmån utan att man får skörde-förluster (Hallin & Gustavsson, 2019). Observera att alltför sen gödsling kan höja nitralthalterna i fodret. Läs mer om att anpassa kvävegivan efter årsmån i [kapitel 1](#).

Om det är så torrt att skörden blir lägre än det du har gödslat för bör du ta hänsyn till överblivet kväve vid gödslingen till efterföljande skörd. Minska också den totala kvävegivan med motsvarande mängd. Vid torka är det ofta bättre att skörda istället för att vänta på regn eftersom vallens tillväxt avtar när gräsen har gått i ax och baljväxterna i blom.





**Bild 42.** Blandvall med en måttlig klöverandel ger ofta ett gynnsammare förhållande mellan energi och protein i vallfoder till mjölkkor än en ogödslad klöverdominerad vall. **Foto:** Janne Andersson

#### 4.4.2 Planera in stallgödseln först och komplettera med mineralgödsel

Börja med stallgödseln när du planerar gödslingen av vallen. Stallgödsel från nötkreatur passar bra som gödselmedel till vall med hänsyn till dess växt-näringsinnehåll. Kväveutnyttjandet blir högre om du kan sprida gödseln vid fuktigt, vindstilla och svalt väder. Vårspridning av flytgödsel och urin samt höstspridning av fastgödsel brukar kunna ske under bra väderförhållanden. Läs mer om näringsinnehåll i stallgödsel i [kapitel 2.2](#) och om spridningsteknik i [kapitel 3.2](#).

#### 4.4.3 Justera gödslingen beroende på vilket djurslag som ska äta fodret

Rekommendationerna i [tabell 23](#) har vi beräknat för att du ska få fram ett grovfoder med bra näringsmässig kvalitet när vallfoder är enda grovfodret. Det passar främst till högproducerande mjölkkor eller växande ung- eller köttjur. Fodret behöver skördas relativt tidigt. I [tabell 26](#) ser du vilka grovfoderkvaliteter som är lämpliga till olika djurslag.

Blandvall med en måttlig klöverandel ger ofta ett gynnsammare förhållande mellan energi och protein i vallfodret än en ogödslad och klöverdominerad vall. I foderstater med majs eller HP-massa som energikälla kan blandvall med mycket baljväxter passa bra som foder.

För att höja proteinhalten i vallfodret behöver du antingen öka gödslingen eller välja en fröblandning med mera baljväxter och gynna dem redan under insåningsåret. Läs mer om gödsling under insåningsåret i [kapitel 4.4.5](#). Om du vill räkna på hur mycket du behöver gödsla för att nå en viss råproteinhalt kan du använda en räknesnurra som finns på [grovfoderverktyget.se](http://grovfoderverktyget.se) eller i [Råd om kvävegödsling till vallen](#), Praktiska råd från Greppa Näringen.

Råproteinhalten blir högst i förstaskörden vid tidig skörd eller i återväxterna när baljväxterna tar mera plats.

Om ditt mål istället är ett foder med lägre näringsinnehåll kan du skörda vallen något senare och sänka gödningen. Vill du producera vallfoder till hästar bör du kvävegödsla för att minska sockerhalten i fodret. Om du riskerar att få höga råproteinhalter kan du minska den totala kvävegivan jämfört med rekommendationen i [tabell 23](#).

**Tabell 26.** Kvalitetskrav på grovfoder hos olika djurgrupper när vallfoder är enda grovfodret (Frankow-Lindberg, 2017).

Djurslag	Energibehov omsättbar energi, (MJ/kg ts)	Råprotein (g/kg ts)
Mjölkkor, 1:a halva laktationen	11,0–11,5	150
Mjölkkor, 2:a halva laktationen	10,5–11,0	170
Mjölkkor, sintid	9,5–10,0	140
Växande kvigor, 2:a halva laktationen	10,5–11,0	170
Växande köttjur	11,0–11,5	170
Häst, avelsdjur	>9,0	>72
Häst, högpresterande	11,0–11,5	>50
Övriga hästar	6,5–8,0	>50

#### 4.4.4 Betesvall

Du kan gödsla betesvall på åker efter varje avbetning. Om den innehåller vitklöver och gräs är cirka 0–20 kg kväve per hektar och avbetning lagom och är det mest gräs passar 25–35 kg kväve per hektar. Det är bra om givan inte överstiger totalt 150 kg kväve per hektar och år på betesvallen.

#### 4.4.5 Gödning under insåningsåret

Anläggningen av vallen är kanske det viktigaste momentet för att få en hållbar och högavkastande vall. Det är då du kan påverka vallens sammansättning mest. Baljväxterna är särskilt känsliga för konkurrens innan de är etablerade. De gynnas om du sänker kvävegivan, drar ned utsädesmängden för skyddsgrödan och skördar den tidigt under insåningsåret. Vilken skyddsgröda du väljer eller om du sår in i renbestånd påverkar vallens botaniska sammansättning och avkastning. Naturligtvis behöver beslutet också grunda sig på ekonomi för de olika grödorna och gårdens foderbehov.

- **Insådd i skyddsgröda:** Det är viktigt att du sänker kvävegödslingen ordentligt om du sår in vall i en skyddsgröda. Skyddsgrödan kan bestå av enbart stråsäd eller stråsäd i blandning med baljväxter och den kan antingen skördas grön som grönfoder eller helsäd, eller tröskas. Sänk gödningen till skyddsgrödan med minst 20–30 kg kväve jämfört med rekommendationerna i [tabell 16](#) om du sår in vall, se [grovfoderverktyget.se](#). Har du en blandning av stråsäd och baljväxter ska du enbart beräkna gödningen efter stråsädesskörden. Baljväxterna i skyddsgrödan behöver inget extra kväve.



- **Insådd i renbestånd:** Insådd i renbestånd brukar vara ett bra sätt att etablera en tät och baljväxtrik vall, även om också en del ogräs har lättare att breda ut sig. Består insådden enbart av gräs kan en mindre kvävegiva ge en tät och ogräsfri vall. Däremot behöver du inte gödsla insådd av blandvall i renbestånd. Putsa den gärna några gånger för att missgynna ogräs och ta eventuellt en skörd.
- **Insådd i ettåriga gräs:** Insådd i ettåriga gräs som westerwoldiskt eller italienskt rajgräs behöver gödslas och putsas eller skördas upprepade gånger. Det kan vara lämpligt att lägga 60–80 kg kväve till förstaskörden och sedan 40–60 kg till återväxterna ([grovfoderverket.se](http://grovfoderverket.se)). Var försiktig så att insådden inte blir sönderkörd eller utkonkurrerad av de snabbväxande rajgräsen. Utsädesmängden för westerwoldiskt rajgräs bör vara max 10 kg per hektar för att insådden inte ska konkurreras ut.



**Bild 43.** Minska utsädesmängden och sänk gödningen till skyddsgrödan under insåningsåret så gynnar du baljväxterna. **Foto:** Linda af Geijersstam

#### 4.4.6 Kväverekommendationer för gräsfrövall

Odling av gräsfrövall är en viktig näringsproduktion. Kvävegödning under hösten till gräsfrövall styr bland annat hur många skottbärande ax som kan skördas under påföljande år. Det varierar hur många år olika arter och sorter kan skördas. Är vallen tät och väletablerad kan den skördas upp till fyra år vilket kan vara fallet för till exempel timotej, medan engelskt rajgräs oftare bara skördas ett år.

Gödslingsråden i [tabell 27](#) är hämtade från Frö- och Oljeväxtodlarnas odlingsvägledning för respektive art. Rekommendationerna är uppdelade på insåningsåret och fröskördeåren. Fröskördeåren är i sin tur uppdelade på vår- och höstgödning.

För samtliga gräsfröarter är rekommendationen att gödsla med cirka 15 kg fosfor, 50 kg kalium och 15 kg svavel per hektar. Kväverekommendationerna för engelskt rajgräs, hundäxing, rödsvingel, rörsvingel, timotej och ängsvingel förutsätter att gräsen tillväxtregleras. Annars behöver kvävegivan på våren sänkas med 20–30 kg N/ha.

**Tabell 27. Kvävegödslingsrekommendationer till gräsfrövall om den tillväxtregleras. Tillväxtregleringen gäller alla arter utom ängsgröe. Utan tillväxtreglering behöver vårgivan sänkas med 20–30 kg kväve/ha.**Källa: Odlingsvägledning för konventionell odling av gräsfrövall på [webbplatsen för Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare](#)

	Insåningsåret	Fröskördeåren	
		Vår	Höst
<b>Engelskt rajgräs</b>	30 kg/ha direkt efter skörd av insåningsgrödan om insådden är svag.	<b>Grönytesorter<sup>a)</sup></b> : 130–150 kg/ha vid tillväxtstart i mars <sup>c)</sup> . Givan kan delas. <b>Fodersorter<sup>b)</sup></b> : 150–170 kg/ha i början/mitten av april. Givan kan delas. Tetraploida sorter har ofta större kvävebehov än diploida.	
<b>Hundäxing</b>	Vid svaga bestånd gödglas 30 kg/ha direkt efter skörd av insåningsgrödan. 60 kg/ha i slutet av september eller början av oktober efter sista putsning.	120–130 kg/ha vid tillväxtstart <sup>c)</sup> .	60 kg/ha i början av oktober efter sista putsningen.
<b>Rödsvingel</b>	<b>Insådd i vårstråsäd</b> : 30 kg/ha direkt efter skörd av skyddsgrödan och 60 kg/ha kväve efter sista putsning. <b>Insådd i höstvet</b> : 60 kg/ha efter sista putsning. Svaga insådder får 30 kg/ha N direkt efter skörd av insåningsgrödan.	60–80 kg/ha vid tillväxtstart <sup>c)</sup> . Lägsta givan till sorter med långa utlöpare.	Efter sista putsning 50–70 kg/ha. Den lägre givan till sorter med inga eller korta utlöpare.
<b>Rörsvingel</b>	Vid svaga bestånd gödglas 30 kg/ha direkt efter skörd av insåningsgrödan. 60 kg/ha i slutet av september eller början av oktober efter sista putsning.	90–130 kg/ha vid tillväxtstart beroende på sorttyp <sup>c)</sup> .	60 kg/ha i början av oktober efter sista putsningen.
<b>Timotej</b>	Under andra halvan av september tillförs 30–45 kg/ha. Svaga insådder gödglas direkt efter skörd av insåningsgrödan med 30 kg/ha och tillförs ca 40 kg/ha under andra halvan av september.	80–120 kg/ha <sup>c)</sup> . I tidiga sorter ska kvävet ges i mitten av april och i sena sorter 10–14 dagar senare. Vårens kvävegiva kan delas 60 + 60 kg/ha.	Höstgödslingen kan uteslutas om etableringen är bra. Är insådden svag kan den behöva gödglas.
<b>Ängsgröe</b>	<b>Insådd i spannmål</b> : 30 kg/ha direkt efter skörd av skyddsgrödan och 60–80 kg/ha efter sista putsning. <b>Insådd i höstraps</b> : 50–80 kg/ha efter sista putsning.	Startar tillväxten tidigt på våren. Redan i början av mars kan gödsling vara aktuell. Beroende på höstkvävegivans storlek tillförs 70–100 kg/ha.	60 kg/ha i början av oktober efter sista putsningen.
<b>Ängssvingel</b>	Om insådden är svag tillförs 30 kg/ha direkt efter skörd av insåningsgrödan. 60 kg/ha i slutet av september/början oktober.	80–110 kg/ha i slutet av mars/början av april <sup>c)</sup> .	60 kg i slutet av september/ början oktober efter sista putsningen.

a) Grönytesorter används på golfbanor och gräsmattor.

b) Fodersorter används i grovfoderproduktion.

c) Förutsätter tillväxtreglering, minska annars vårgivan med 20–30 kg/ha.

## 4.5 Kväverekommendationer för potatis

### 4.5.1 Riktgivor för potatis – anpassa givan till sort och kvalitetskrav



**Bild 44.** Eftersom kväve till potatis påverkar kvaliteten är det viktigt att anpassa gödningen till sort och användningsområde.  
**Foto:** Hans Jonsson

Anpassa kvävegödningen till potatis efter förväntad skördenivå, sort och användningsområde. Kvävegödningen höjer avkastningen men påverkar också knölen kvalitet, och det är minst lika viktigt att uppnå rätt kvalitet som att få en hög skörd för att få god ekonomi i odlingen. Det är viktigt att ha rätt balans mellan växtnäringsämnen kväve, fosfor och kalium. För mycket kväve kan ge ökad blötkokning och ökad grad mörkfärgning efter kokning. För lite kväve ger låg skörd och ökad risk för blötkokning eller mörkfärgning.

Gödslingsråden är allmänt hållna och du behöver justera gödningen utifrån din egen erfarenhet eller efter samråd med specialrådgivare. Har du odlingskontrakt ska du gödsla enligt det kontrakterande företags anvisningar.

Riktgivorna i [tabell 28](#) sammanfattar rekommendationer från boken ”Odling potatis – en handbok” (Nilsson m.fl., 2012).

Den lägre skörden i intervallen i [tabell 28](#) är främst aktuell i norra delen av landet. Sorten King Edward avkastar inte lika mycket som sorter av Bintjety. Därför bör du hålla nere kvävenivåerna om du odlar King Edward, så att du inte riskerar försämrade kokkvalitet. Sorter med lågt kvävebehov ökar inte i avkastning även om kvävegivan höjs.

**Tabell 28.** Riktgivor för kvävegödning i kg N/ha till potatis. Gäller för mineraljord och med stråsäd som förfrukt (Nilsson m.fl., 2012).

Potatissort eller användningsområde	Skörd (ton/ha)				
	20	30	40	50	60
Färskpotatis	60	80			
Mycket lågt kvävebehov t.ex. Ditta		40–50	60–70	80–90	100–110
Lågt kvävebehov t.ex. Fakse, Inova, Princess		60–70	80–90	100–110	120–130
Måttligt kvävebehov t.ex. King Edward, Asterix, Melody		90–100	120–130	150–160	170–180
Högt kvävebehov t.ex. Bintje, Fontane, Superb		100–110	130–140	160–170	180–190

### 4.5.2 Strategier för potatis – dela givan för bättre kvalitet

Potatisen utnyttjar växtnäringen bäst när det finns jämn tillgång på vatten. Potatisodling med möjlighet till bevattning är därför det mest optimala. Du kan även öka potatisens utnyttjande av tillförd växtnäring genom att radgödsla. Potatisen har lång växtsäsong och behovet av näring är därmed också utdraget. Det är ofta fördelaktigt att dela både kväve och kaliumgivorna.

Genom delad kvävegiva kan du uppnå både ökad skörd och förbättrad kväveeffektivitet, under förutsättning att det finns möjlighet till bevattning. Delad giva ger en gynnsammare fördelning mellan blast och knöltillväxt. Dessutom bidrar kvävetillförsel under växtsäsongen till att förlänga blastens livslängd vilket är fördelaktigt för sena sorter och därmed knöltillväxtperioden.

Tillför cirka 50 % av kvävet i anslutning till sättningen och resterande kväve i två lika stora givor, 3 och 6 veckor efter uppkomst. Använd ett NPK-gödselmedel med lågt klorinnehåll (högt klorinnehåll ger lägre torrsubstans) vid grundgödsling och ett ammoniumnitratbaserat gödselmedel vid eventuell tilläggs-gödsling.

Inför den sista tilläggs-gödslingen bör du göra en uppskattning av förväntad skörd. Gör en provgrävning och bedöm antalet knölar och knölstorlek. Bedöm också fältets blastutveckling och tillväxt samt hur långt det är kvar till mognad.

För potatisens kvalitet är det viktigt att ha balans mellan kväve och kalium. För lite kalium i förhållande till kväve kan ge försämrad kvalitet. Ofta behövs mer kalium än vad som tillförs med NPK-gödselmedel. Då kan du använda ett NK-gödselmedel med låg klorhalt vid det andra gödslingstillfället och eventuellt komplettera med kalimagnesia eller polysulfat.

Potatis har, med undantag av färskpotatis, lång växtperiod och kan därmed utnyttja stallgödselkväve på ett bra sätt. Kvävefrigörelsen från stallgödsel kan dock komma försent vid odling av matpotatis och äventyra kvaliteten. Vid odling av fabrikspotatis finns inte samma risk för kvalitetsnedsättning som vid odling av matpotatis. I första hand bör du använda flytgödsel och du bör begränsa givan till maximalt 50 % av kvävebehovet, räknat som ammoniumkväve.

## 4.6 Kväverekommendationer för sockerbetor

### 4.6.1 Riktgivor för sockerbetor – anpassa efter tidigare års resultat

Ekonomiskt optimal kvävegiva till sockerbetor är cirka 100–120 kg kväve per hektar om du bredsprider gödseln. Om du rad- eller djupmyllar räcker det med cirka 80–100 kg kväve per hektar.

Genom att jämföra kvalitetsparametrarna sockerhalt, blåtal och K+Na-tal med normtalet kan du bilda dig en uppfattning om du ligger rätt i kvävenivå på ett fält. Om du ofta har kvalitetsproblem på samma fält, kan detta bero på att marken levererar mycket kväve. Då bör du överväga att sänka gödslingsnivån nästa gång du återkommer med sockerbetor på just det fältet.

### 4.6.2 Strategier för sockerbetor – radmylla för högre kväveutnyttjande

Traditionellt har kväve till sockerbetor bredspridits och myllats ner före sådd. Ett vanligt alternativ sedan flera år är djupmyllning före sådd. Mest effektivt är dock att radmylla gödseln i samband med sådden. Att placera gödseln i anslutning till fröet ger bättre kväveutnyttjande och lägre kvävebehov. Modern radmyllningsteknik placerar gödseln på ett bestämt avstånd i sidled från betfröet. Djupmyllning sker före sådden och därför varierar avståndet i sidled mellan gödsel och betfrö.

Tänk på att tillföra natrium i samband med kvävegödslingen. Betornas natriumbehov är cirka 60 kg per hektar.

Både äldre och nya försöksresultat visar cirka 3 % ökad sockerskörd vid tillförsel av natrium (Ekelöf, J. 2019).



**Bild 45.** Om du radmyllar gödseln till sockerbetor får du ett bättre kväveutnyttjande. **Foto:** Hans Jonsson



Socketbetor har en lång växtsäsong och kan därför utnyttja markkväve och stallgödsel under en stor del av säsongen. Det är oftast inte lämpligt att sprida stallgödsel på lerjordar före sådd av sockerbeter, eftersom det finns risk för packningsskador och försämrade plantetablering. På jordar där det är möjligt att värplöja kan du däremot plöja ner stallgödsel före sådd. För att undvika kvalitetsproblem är det viktigt att ge en måttlig giva av stallgödsel. Ge maximalt hälften av grödans kvävebehov som stallgödsel, och se till att få en jämn spridning av gödseln.

## 4.7 Kväverekommendationer och strategier för fodermajs

För fodermajs rekommenderar vi cirka 150 kg kväve per hektar vid en skördenivå på 10 ton ts per hektar eller högre, se [tabell 29](#). Du behöver justera givan för varje enskilt skifte eftersom optimum varierar beroende på hur mycket kväve marken levererar. Om du regelbundet tillför stallgödsel kan du förvänta dig en högre leverans av kväve i marken, vilket gör att du kan minska kvävegivan. Om du har en lägre förväntad skörd än 10 ton ts per hektar bör du minska kvävegivan med 15 kg kväve per ton ts minskad skörd.

Rekommendationerna grundar sig på ett 15-tal svenska försök med kväve och fosforgödsling till majs från 2007–2009 (Tell & Axelson, 2010) samt danska försöksresultat och praktisk erfarenhet i Sverige. Försöksresultaten visade att det är en stor variation i optimal kvävegiva mellan olika försöksplatser bland annat beroende på skillnader i markens kväveleverans.

**Tabell 29.** Riktgivor för kvävegödsling i kg N/ha till fodermajs på mineraljord. Underlag Tell och Axelsson, 2010, danska försök och praktisk erfarenhet.

Gröda	Skörd (ton ts/ha)				
	8	9	10	11	12
Majs	120	135	150	150	150

Vid odling av fodermajs är det vanligt att en stor del av näringsbehovet täcks av stallgödsel. Ofta läggs en grundgiva med flytgödsel på våren. Det lättillgängliga kvävet i stallgödseln ska du naturligtvis räkna med i den totala kvävegivan för året. Använd [bilaga 1](#) för att dokumentera det beräknade kvävebehovet. Om du kompletterar med mineralgödselkväve se till så att gödselkorn inte hamnar i bladstruten. Det kan skada majsens tillväxtpunkt.

Majs växer långsamt i början av odlingssäsongen och har då ett relativt lågt växtnäringsbehov. Genom att dela kvävegivan minskar du risken för förluster av näring och ökar kväveeffektiviteten. I försöken svarade majs bra på en startgiva av fosfor utöver det som fanns i stallgödseln, särskilt om den gavs i kombination med en mindre kvävegiva (Tell & Axelson, 2010).

Det är vanligt att majs odlas på samma skifte år efter år och den totala mängden kväve och fosfor som tillförs är ofta större än bortförsele. Det gör att återkommande majsodling på samma skifte år efter år kan öka risken för förluster av kväve och fosfor. Du kan minska risken för förluster och öka växtnäringsutnyttjandet genom att flytta runt majsodlingen mellan olika skiften och anpassa givan efter skiftets växtnäringsstatus.

## 4.8 Kväverekommendationer och strategier för salix

### 4.8.1 Kvävegödsla på våren efter skörd

Det finns kvävegödslingsförsök genomförda i etablerade salixodlingar under 2008–2010 men dessa saknar olika kvävenivåer och har istället varit mer inriktade på olika gödslingsstrategier. Därför kan vi inte beräkna ekonomiskt optimal kvävegiva på samma sätt som för andra grödor.

I de försök som genomförts (Aronsson & Rosenqvist, 2011) jämfördes ett ogödslat led med tre olika gödslingsstrategier och varierande kvävemängder under ett treårigt omlopp. I försöken ingick äldre rekommendationer med 60 kg kväve per hektar år ett, 100 kg kväve per hektar år två och 60 kg kväve per hektar år tre. Det ingick också en strategi med låg intensitet där en engångsgiva på 160 kg kväve per hektar lades första året efter skörd samt en strategi med intensiv odling där 160 kg kväve per hektar lades varje år under ett treårigt omlopp.

Bäst ekonomiskt utbyte i medeltal gav strategin med 160 kg kväve per hektar varje år. Men det var liten skillnad jämfört med att ge en engångsgiva på 160 kg kväve per hektar första året efter skörd. Om du ska gödsla varje år i växande salix behöver du speciell spridarutrustning, vilket du kan undvika genom att enbart gödsla efter skörd. Vår rekommendation är att du tillför cirka 160 kg kväve per hektar som engångsgiva på våren året efter skörd. Har du fått svaga gödslingseffekter tidigare kan du avstå från att gödsla.



**Bild 46.** I moderna salixsorter kan du gödsla en gång per omlopp med 160 kg kväve per hektar, helst på våren året efter skörd.

**Foto:** Urban Wigert

## 4.9 Justera kvävegivan efter förfrukten

**Förfruktsvärdet av en gröda beror på tre olika faktorer:**

- Om det finns kväve kvar i marken från skörderester, rötter och eventuella baljväxtnölar
- Om förfruktens rötter har haft en positiv inverkan på markens struktur
- Om förfrukten har haft en sjukdomssanerande effekt

Alla dessa tre faktorer kan påverka grödans kväveutnyttjande. I tabell 30 finns en uppskattning av olika grödors förfruktswärde uttryckt som kväveefterverkan (Lindén, 2008; Persson & Olsson, 2011). Med kväveefterverkan menas motsvarande mängd gödselkväve som man behöver tillföra för att få samma kväveeffekt som förfrukten ger.

I tabell 31 finns även de skördeökningar som olika förfrukter kan förväntas ge i spannmål. Om du får en skördeökning av en god förfrukt så ska du räkna upp kvävebehovet med 15–20 kg per ton skördeökning innan du gör ett avdrag för kväveefterverkan (se räkneexemplet på nästa sida).



**Tabell 30.** Olika grödors förfruktsvärden uttryckta som kväveefterverkan (Lindén, 2008; Persson & Olsson, 2011 och Jordbruksverkets beräkningsverktyg Vera).

Förfrukt	Kväveefterverkan till efterföljande gröda (kg N/ha)	
	Höstsäd	Vårsäd
Höstsäd, korn	0	0
Havre	0	0
Höstraps	40	
Våroljeväxter	20	20
Foderärter	35	25
Åkerbönor	25	25
Potatis	10	10
Socketbetor	25	20
Blandvall	40	40
Gräsvall	5	5

**Tabell 31.** Olika grödors förfruktsvärden uttryckta som skördeökning (Lindén, 2008; Persson & Olsson, 2011)

Förfrukt	Skördeökning i efterföljande gröda (kg/ha)	
	Höstvete	Vårsäd
Höstsäd, korn	0	0
Havre	700	0
Höstraps	1 200	
Våroljeväxter	800	500
Foderärter	1 000	500
Åkerbönor	700	700
Potatis	800	800
Socketbetor	500	800
Blandvall	800	500
Gräsvall	400	200

### Så här justerar du kvävebehovet efter förfrukt

#### Exempel: Fodervete i Svealand med blandvall som förfrukt

Normalskörd med spannmål som förfrukt: 6 ton/ha

Stallgödsel: Nej

Mullhalt: Mindre än 4 %

Rekommenderad kvävegiva: 135 kg N/ha

Ökad skörd av förfrukt blandvall: 800 kg/ha = 0,8 ton/ha

Ökat kvävebehov av skördeökning: 0,8 ton/ha × 15 kg/ton = 12 kg/ha

Totalbehov: 135 kg N/ha + 12 kg/ha = 147 kg N/ha

Kväveefterverkan av blandvall: 40 kg N/ha

**Nettobehov: 147 - 40 kg N/ha = 107 kg N/ha**

En grüngödslingsvall med baljväxter som utvecklats väl kan ge en god kväveeffekt till efterföljande gröda, se [tabell 32](#). Det finns ett begränsat försöksunderlag, men det är rimligt att räkna med en skördeökning på 1–3 ton spannmål per hektar efter en grüngödslingsvall som mest innehåller klöver.

I rapporten Ekohydrologi 179 (Aronsson, m.fl., 2023) sammanfattas kunskapsläget om kväveefterverkan av mellangrödor. Mellangrödor eller fånggrödor som består av rent gräs ger sällan en förfruktseffekt till den efterföljande huvudgrödan. En kombination av gräs och klöver kan däremot ge en kväveefterverkan.

Om man kombinerar gräs och klöver kan mineralkväve effektivt tas upp och minska risken för kväveläckage och samtidigt ge en kväveeffekt på omkring 15 kg per hektar. I sammanställningar av flera års danska försök har mellangrödor av oljerättika samt oljerättika och honungsört gett en kväveefterverkan på cirka 10 kg och oljerättika i blandning med luddvicker 25 kg per hektar. Såtidpunkten är en viktig faktor för hur stor tillväxten blir och i sin tur hur stor kväveefterverkan kan bli.

Om du regelbundet odlar rajgräs som fånggröda kan du på sikt ändå förvänta dig en något ökad kväveleverans till efterkommande gröda. Den bästa kväveeffekten av rajgräs får du på lätta jordar i områden med mildt klimat. Direkt efter att rajgräset brukas ner är innehållet av växttillgängligt mineralkväve i marken normalt sett lågt och en del kväve kan till och med bindas in i marken och bli otillgängligt. Denna effekt är kortvarig och kompenseras längre fram under växtodlingssäsongen genom något ökad mineralisering. Om du vårplöjer kan den ökade mineraliseringen komma för sent för att årets gröda ska kunna få del av det extra kvävet.

Om du odlar oljerättika som eftersådd fånggröda eller mellangröda är kvävehalten högre och kvävemineraliseringen snabbare än hos gräs. Det innebär att du ofta kan räkna med en högre och snabbare kväveeffekt. Såtidpunkten av oljerättikan är då en viktig faktor.

Sommarsådd oljerättika innebär ofta att plantorna har utvecklats långt under hösten. Då har de en låg kvävehalt (kol/kväve-kvoten är hög) och därför mineraliseras kväve långsamt. Oljerättika som är sådd i andra halvan av augusti eller senare har ofta en hög kvävehalt vilket kan innebära att kväve från plantorna frigörs snabbt efter frost eller avdödning. Hur snabbt beror på temperaturen och vädret under höst och vinter. I halländska försök gav till exempel oljerättika sådd i slutet av augusti efter vårkorn inte minskad utlakning jämfört med vårkorn utan fånggröda (Aronsson, m.fl., 2012).

På [jordbruksverket.se](http://jordbruksverket.se) hittar du de aktuella stödreglerna som rör till exempel fånggrödor och mellangrödor.

**Tabell 32.** Kväveeffekt uttryckt som kväveefterverkan efter fånggrödor, mellangrödor och grön gödslingvallar.

Fånggrödor eller mellangrödor insådda i vår- eller höstsådd	Kväveefterverkan (kg/ha)	
	Höstplöjning	Vårplöjning
Rajgräs	0	0
Röd klöver	35	45
Vit klöver	40	45
Röd klöver och rajgräs i blandning	20	15

Fånggrödor eller mellangrödor eftersådda	Kväveefterverkan (kg/ha)
Oljerättika	10
Oljerättika+honungsört	10
Oljerättika+luddvicker	25

Grön gödslingvall	Kväveefterverkan (kg/ha)	
	Tidig höstplöjning och höstsådd	Sen höstplöjning eller vårplöjning och vårsådd
Röd klöver, alsikeklöver	80	90
Röd klöver+gräs	50	60
Vit klöver	90	100
Vit klöver+gräs	60	80



**Bild 47.** Oljerättika är en fånggröda med djupt rotsystem som förbättrar jordens struktur.

**Foto:** Pernilla Kvarmo

## 4.10 Gödsla mindre på jordar med hög mullhalt

Jordar med hög mullhalt har normalt en hög kväve mineralisering vilket minskar behovet av kvävegödsling. Om du ger för mycket kväve på en jord med hög mullhalt så blir kväveutnyttjandet sämre samtidigt som risken för förluster ökar. Du kan även få problem med liggsäd. I [bilaga 1](#) hittar du ett schema för bestämning av kvävebehov för mineralgödsel.

Det är svårt att ge riktvärden för kvävegödsling på jordar med hög mullhalt eftersom kväveleveransen varierar beroende på det organiska materialets ursprung. Försök och praktisk erfarenhet tyder på att det oftast behövs en startgiva på cirka 30 kg kväve per hektar för att få en bra vårsädesgröda på mulljord med mer än 40% mull (Mattsson, 2006). Detta kan tolkas som att kväveleveransen är 50–70 kg per hektar högre till vårsäd på mulljord (mer än 40 % mull) än på en måttligt mullhaltig mineraljord (cirka 4 % mull). Om vi antar att kväveleveransen har ett linjärt samband med mullhalten inom intervallet 4–40 % mull, så motsvarar varje procentenhet mull en kväveleverans på nära 2 kg per hektar. Det betyder att du kan minska kvävegivan med cirka 2 kg per hektar för varje procentenhet över 4 % mull i jorden (se räkneexempel). Du bör dock alltid utgå från din egen erfarenhet av tidigare odling på fältet.

Om du ger en låg kvävegiva och använder NPK-gödselmedel som är anpassade för mineraljordar kan grödan få för lite fosfor och kalium. Därför kan du behöva komplettera med fosfor och kalium i en separat gödsling.

### Uppskattning av kvävebehov på mulljordar

#### Exempel 1: Mullhalt mellan 4 och 40 %

Foderkorn i södra Götaland

Normalskörd på fältet: 5 ton/ha

Stallgödsel: nej

Mullhalt: 20 %

Rekommenderad kvävegiva: 85 kg N/ha

Mullhalt över 4 %:  $20 - 4 = 16\%$

Minskat kvävebehov på grund av mullhalt:  $2 \text{ kg/ha} \times 16\% = 32 \text{ kg/ha}$

**Nettobehov:**  $85 - 32 \text{ kg N/ha} = 53 \text{ kg N/ha}$

#### Exempel 2: Mullhalt över 40 %

Foderkorn i södra Götaland

Normalskörd på fältet: 5 ton/ha

Stallgödsel: Nej

Mullhalt: 42 %

Rekommenderad kvävegiva: 85 kg N/ha

Mullhalt över 4 %:  $42 - 4 = 38\%$

Minskat kvävebehov på grund av mullhalt:  $2 \text{ kg/ha} \times 38\% = 76 \text{ kg/ha}$

**Nettobehov:**  $85 - 76 \text{ kg N/ha} = 9 \text{ kg N/ha}$

I exempel 2 minskar kvävebehovet med 76 kg kväve per hektar och nettobehovet blir endast 9 kg kväve per hektar. Ofta kan det ändå vara bra att lägga en startgiva på 30 kg kväve per hektar.

# 5 Fosfor

Fosfor är ett viktigt näringsämne men kan också orsaka övergödning om den hamnar i vattendrag, sjöar och hav. Fosfor har en nyckelroll vid växtens energiomsättning och ingår i proteiner och i arvsmassan. Fosfor spelar också en stor roll för rotbildning, bestockning, blomning, fruktsättning och mognad.

Fosforbrist hämmar proteinbildningen och ger nedsatt tillväxt, sämre bestockning, blomning och frösättning samt försenad mognad. Plantor med fosforbrist antar ofta en rödlila färgton, särskilt på äldre blad och delar av plantan, t.ex. de nedre bladslidorna. I senare stadier kan äldre blad vissna från spetsen och falla av. Ax och kärnor blir ofta kraftigt förkrympta och hämmade, (Aasen, 1997; West Larsen, 1998)

Fosforbrist förvärras av sur eller väldigt basisk (kalkrik) jord, låg mullhalt, kalla eller blöta förhållanden och grödor med dåligt utvecklade rotsystem. En väl fungerande dränering och bra markstruktur är viktiga förutsättningar för att grödan ska kunna utveckla ett bra rotsystem som kan ta upp vatten, fosfor och andra näringsämnen ur en stor jordvolym.



**Bild 48.** Till vänster i bilden har grödan fosforbrist. Fosforbrist ger nedsatt tillväxt och sämre bestockning. **Foto:** Ingemar Gruvaeus

## 5.1 Gödsla efter grödans behov och markens fosforinnehåll

I rutan nedan har vi sammanfattat några viktiga råd när det gäller fosforgödsla:

### SAMMANFATTANDE RÅD - FOSFOR

- Se till att ha en aktuell markkarta. Komplettera gärna med en växtnäringsbalans så att du vet hur mycket fosfor som förs bort från fältet i förhållande till gödningen under en hel växtföljd.
- Anpassa fosforgödningen till grödans behov och markens fosforinnehåll. Glöm inte att justera givan efter skördenivå!
- Placera gödseln nära utsädet för bättre effekt och mindre risk för förluster.

- Sträva efter att på sikt nå en lämplig fosforklass i marken för de grödor du odlar.
  - Odlar du bara spannmål och vall kan det räcka att ligga i nedre delen av P-AL-klass III eller övre delen av klass II.
  - Odlar du fosforkrävande grödor som potatis, sockerbetor, majs eller oljevaxter är det lämpligt att ligga i nedre delen av klass IVA eller övre delen av klass III.
- Normalt sett är det inte lönsamt att gödsla upp marken mer än till mitten av klass IVA.
- Prioritera gödsla till de mest fosforkrävande grödorna i växtföljden.
  - Gödsla potatis, sockerbetor och majs i första hand.
  - Prioritera fosfor till höst- och vårraps om du odlar oljevaxter. Fosforgödsla på hösten till höstraps förbättrar också övervintringen.
  - Om du har en spannmålsväxtföljd bör du i första hand fosforgödsla vårsäden. I P-AL-klass II eller lägre bör du även fosforgödsla höstsäden.
  - Lin, ärter, åkerböna och vall kräver inte mycket fosfor. Någon gång under växtföljden bör du dock ersätta den fosfor som förts bort med dessa grödor om jorden ligger i P-AL-klass III eller lägre.
- Bra dränering och markstruktur minskar fosforförlusterna och förbättrar växtnäringsutnyttjandet genom att rötterna kan ta upp fosfor ur en större jordvolym.
- Undvik uppgödsla av redan fosforrika jordar. Det ger dåligt fosforutnyttjande och större risk för förluster.

### 5.1.1 Lär känna din jord genom att markkartera och gör en fosforbalans

Åkermark innehåller ganska mycket fosfor, i genomsnitt ca 2 000 kg per hektar med en variation från 900 till 3 600 kg i matjorden (Bergström m.fl., 2008). Mycket är dock mer eller mindre hårt bundet och bara en ytterst liten del är löst i markvätskan. Braun, (2020) studerade dynamiken i utbytet mellan olika fosforpooler i marken och kunde i en doktorsavhandling bland annat visa att tillförseln av fosfor från den långsamma poolen är viktig för växternas fosforupptag.

För att kunna gödsla rätt behöver du ha en aktuell markkarta som visar markens innehåll av växttillgänglig fosfor och hur det varierar mellan olika fält och delar av fält. Fosforhalten ändras som regel långsamt. Beroende på jordartsförhållanden, odlingsinriktning och om du gör växtnäringsbalanser regelbundet är det lagom att markkartera med 5–15 års mellanrum. Läs mer om markkartering i [avsnitt 1.1](#) och [bilaga 4](#). Klassindelningen när det gäller fosforinnehåll i marken visas i [tabell 33](#).



**Tabell 33. Klassindelning och halter av fosfor (P) i jord.**

Fosforinnehåll			
Lättlöslig fraktion		Förrådsfraktion	
Klass	P-AL (mg/100 g torr jord)	Klass	P-HCl (mg/100 g torr jord)
I	<2	I	<20
II	2,0-4,0	II	20-40
III	4,1-8,0	III	41-60
IVA	8,1-12,0	IV	61-80
IVB	12,1-16,0	V	>80
V	>16		

Ofta är det ganska stora variationer i fosforhalt inom ett skifte. Genom att använda markkartan och precisionsgödsel kan du anpassa givan efter behovet på varje del av fältet. På så sätt får du större nytta av den fosfor du lägger vilket är positivt för både ekonomi och miljö. Med en modern spridare utrustad med GPS kan du göra tilldelningsfiler utifrån markkartan och styra gödslingen automatiskt. Har du en äldre spridare kan du anpassa givan manuellt genom att variera körhastighet och utmatning. Läs mer om styrning av mineral- och stallgödsel i [kapitel 3](#).

Markkartan ger en bild av nuläget, men för att bedöma om markens fosforförråd ökar eller minskar över tid är växtnäringsbalansen ett bra komplement. Komplettera gärna med en växtnäringsbalans så att du vet hur mycket fosfor som förs bort från fältet i förhållande till gödslingen under en hel växtföljd. På så sätt får du grepp om trenderna och kan åtgärda eventuella problem innan effekterna visar sig.

### 5.1.2 Fosfor i alven kan också ha betydelse

På jordar med bra markstruktur och god dränering når rötterna för vårsådda grödor oftast ner till cirka en meters djup. För höstsådda grödor och sockerbeter kan de nå 1–2 meters djup, ibland ännu mer. Framför allt om matjorden innehåller lite fosfor och vid torra förhållanden kan en betydande del av fosforupptaget komma från alven. Om det är högt P-AL-tal i alven kan du eventuellt minska fosforgödslingen något förutsatt att rötterna verkligen når ner och pH-värdet i alven inte är högt. Vid höga pH-värden kan mängden växttillgänglig fosfor vara lägre än vad analysen visar (Börling m.fl., 2004). AL-metoden innebär att fosfor extraheras i en sur lösning, vilket gör att den tenderar att överskatta mängden växttillgänglig fosfor i jordar med högt pH.

Om du ska analysera P-AL i alven är det lämpligt att ta jordprover på ungefär 40–60 cm djup. Det ger en bättre bild av alven som helhet än om du tar prover i direkt anslutning till matjorden, exempelvis på 20–40 cm djup. I försök har det visat sig att tidigare gödsling ofta bara påverkar fosforstatusen ner till cirka 40 cm djup. Djupare ner i markprofilen påverkas fosforinnehållet mer av markens egenskaper (Hahlin & Ericsson, 1981; Börling m.fl., 2004).

## 5.2 Riktgivor för fosfor

I [tabell 34](#) finns rekommendationer för fosforgödsling till de vanligaste grödorna vid olika fosforklasser.

Grödorna svarar ganska olika på fosforgödsling i olika odlingssituationer och det är svårt att veta markens exakta fosforhalt. För att visa att behovet inte kan bestämmas exakt har vi avrundat de rekommenderade givorna till jämna femtal kg. Rekommendationerna i [tabell 34](#) baseras på vad som är ekonomiskt optimalt och långsiktigt hållbart och ska inte ses som bindande för maximal giva på enskilda fält.

**Tabell 34.** Riktgivor för fosforgödsling till olika grödor. Rekommendationerna i tabellen är anpassade efter bredspridning.

Gröda	Skördenivå (ton/ha)	Bortförsel av P (kg/ha)	Rekommenderad fosforgiva (kg/ha) vid olika P-AL-klass					
			I	II	III	IVA	IV B	V
Vårsäd	5	17	25	20	15	5	0	0
Höstsäd	7	22	30	25	20	10	0	0
Våroljeväxter	2	14	30	25	15	10	0	0
Höstoljeväxter	3,5	25	40	35	25	15	0	0
Slåttervall, ts	6	13–20	25	15	10	0	0	0
Fodermajs, ts	10	25 <sup>b)</sup>	35	30	25	20	15	15
Potatis <sup>a)</sup>	40	21	75	55	45	35	20	15
Socketbetor	65	21 <sup>c)</sup>	60	45	35	25	10	0
Ärter/åkerböna	3,5	14–21 <sup>d)</sup>	20	15	10	0	0	0
Lin	2	10	15	10	5	0	0	0
Betesvall på åker			15	5	0	0	0	0

a) Rekommenderad giva räcker till en efterföljande gröda förutsatt att den totala fosfortillförseln i växtföljden är tillräcklig stor.

b) Avser majsensilage.

c) Endast betor, ej blast.

d) Den lägre siffran gäller ärter, den högre åkerböna.

När du etablerar salix bör du tillföra 20–30 kg fosfor per hektar om markens P-AL ligger i klass III eller lägre. Vid högre P-AL-klasser kan du eventuellt utsluta grundgödsling. Om du använder avloppsslam vid salixodling täcker det grödans behov av både fosfor och kalium.

Riktgivorna i [tabell 34](#) är framtagna utifrån fältförsök i olika grödor och praktisk erfarenhet. Bland annat har vi utgått från två rapporter (Bertilsson m.fl., 2005; Börjesson m.fl., 2015) där författarna beräknade underhålls-P-AL (UPAL) för olika grödor, det vill säga det P-AL där det är ekonomiskt lönsamt att tillföra lika mycket fosfor som grödan för bort. Kostnaden för ersättningsgödsling är då lika stor som värdet av den skördeökning gödslingen ger. Eftersom olika grödor har olika stort fosforbehov och varierande förmåga att ta upp fosfor har grödorna olika UPAL. UPAL påverkas även av priset på skördeprodukterna och priset på fosfor (Bertilsson m.fl., 2005; Börjesson m.fl., 2015).

Börjesson m.fl. (2015) har även räknat på vad som händer vid olika gödslingstrategier om man utgår från att marken har ett P-AL-tal på 3 respektive 10 mg P/100 g jord. Dessa beräkningar har vi använt för att ta fram rekommendationer vid låga respektive höga P-AL-klasser.

När fosforpriset är högt (35 kr/kg i skrivande stund) kan det vara frestande att minska på givan eller kanske helt avstå från att fosforgödsla, men i och med att spannmålspriset ofta tenderar att följa med när produktionskostnaderna stiger brukar priskvoten inte ändras så mycket som man kan tro. Underhålls-P-AL är heller inte så priskänsligt och påverkas därmed bara marginellt.

Med de priser vi har antagit är ersättningsgödsling lönsam vid de P-AL-tal och klasser som visas i [tabell 35](#).

**Tabell 35.** Underhålls-P-AL (UPAL) för olika grödor.

Gröda	Underhålls-P-AL <sup>a)</sup> (mg/100 g jord)	P-AL-klass
Korn	4–8	III
Höstvete	2–4	II
Oljeväxter	5–6	III
Potatis, sockerbetor	10	IVA

a) Det P-AL-tal där det är ekonomiskt lönsamt att tillföra lika mycket fosfor som grödan för bort.

### 5.2.1 Justera givan efter skördenivå

Om skördenivån är högre eller lägre än vad som anges i [tabell 34](#) bör du öka eller minska fosforgivan enligt [tabell 36](#). Om rekommendationen enligt [tabell 34](#) är noll behöver du inte fosforgödsla alls även om förväntad skörd är högre än den angivna.

**Tabell 36.** Justering av fosforgivan beroende på skördenivå.

Gröda	Justering per ton avvikelse i skörd (kg P/ha)
Stråsäd, ärter	3
Oljeväxter	7
Slättervall (ts), majs (ts)	3
Potatis	0,5
Sockerbetor	0,33

### 5.2.2 Håll balansen och sikta rätt

Gödslingsråden i [tabell 34](#) baseras på en avvägning mellan vad som är ekonomiskt lönsamt på kort sikt och hållbart med tanke på miljön och markens framtida produktionsförmåga. På längre sikt lönar det sig ofta att tillföra mer fosfor. Läs mer om det i [avsnitt 5.3](#) Strategier för fosforgödsling. Tidsperspektivet kan variera beroende på om marken är egen eller arrenderad, planer på framtida generationsskifte med mera.

För att nå eller bibehålla ett lämpligt underhålls-P-AL i marken med hänsyn till de grödor du odlar är det också viktigt att räkna på den totala till- och bortförslan av fosfor sett över hela växtföljden. Om du strikt följer gödslingsråden i tabellen ger det ofta ett litet underskott som gör att P-AL på sikt riskerar att halka ned till väl låga nivåer. Vad som är lämpligt underhålls-P-AL avgörs av den mest krävande grödan i växtföljden.

### 5.2.3 Placera gödseln nära utsädet för bättre effekt och mindre risk för förluster

Rekommendationerna i [tabell 34](#) är anpassade efter bredspridning av fosfor. I många grödor blir gödslingseffekten bättre om du radmyllar eller kombisår fosforgödseln än om du bredsprider och brukar ner den i såbädden (Mattsson, 1974; Mattsson, 1993; Gruvaeus, 1997; Ekelöf, 2016a). Det gäller särskilt i vårsådda grödor med litet rotsystem som behöver tillgång till fosfor tidigt på våren, exempelvis potatis, majs och sockerbetor, men även vårsäd gynnas av radmyllning. Om du radmyllar eller kombisår gödseln ökar fosforkoncentrationen närmast rötterna i marken och växten kommer åt fosfor tidigare när den ännu inte har så stort rotsystem.

Radmyllningen ger också en miljömässig fördel genom att risken för fosforförluster via ytavrinning och makroportransport minskar. Makroporer är stora porer eller torksprickor i jorden där jordpartiklar och fosfor snabbt kan transporteras ned till dräneringsrören och vidare ut i diken och vattendrag om det kommer mycket nederbörd.

### 5.2.4 Fosforrekommendationer vid höga pH-värden och efter kalkning

P-AL-metoden fungerar bäst på jordar med pH-värden under 7. Den extraktionslösning som används vid analysen (ammoniumlaktat-acetat) har ett pH på 3,75. Om jordprovet har ett högt pH löses även kalciumbunden fosfor som egentligen är svårtillgänglig för växterna ut. Metoden överskattar alltså mängden växttillgänglig fosfor i jordar med höga pH-värden. Om pH-värdet i jorden är högre än 7 kan det därför vara motiverat att gödsla som om värdet vore en P-AL-klass lägre än vad analysen anger.



**Bild 49.** Cirka 38 % av fosfor som sprids på åkermark tillförs via mineralgödsel och 62 % via organiska gödselmedel, främst stallgödsel (SCB, 2020). **Foto:** Mårten Svensson

Ett annat alternativ för jordar med pH över 7 är att analysera fosforinnehållet med någon annan metod, exempelvis Olsenmetoden (Olsen-P) där extraktionslösningen har ett pH-värde på 8,5. Denna metod används bland annat i Danmark. Det finns dock få resultat från svenska fältförsök på jordar med höga pH där man också har analyserat fosforinnehållet med Olsenmetoden. Därför saknar vi i Sverige gödslingsrekommendationer kopplade till Olsen-P. Flera försök har gjorts för att "översätta" analysvärden mellan P-AL och Olsen-P, men det har visat sig vara svårt eftersom sambanden ser olika ut för olika jordar.

Då intresset för att strukturkalka har ökat på senare år har det även funnits en oro för att fosfor skulle bli mindre tillgänglig i samband med kalkning. I en studie av Simonsson m.fl. (Simonsson m.fl., 2016) vid SLU kunde man dock inte se några negativa effekter på fosfors tillgänglighet eller växternas fosforupptag på grund av kalkning vare sig man kalkat med strukturkalk eller vanligt kalkstensmjöl. Även Börjesson & Kirchmann (Börjesson & Kirchmann, 2022) drog slutsatsen att kalkning inte påverkar fosfors tillgänglighet negativt. Därför behöver du inte öka fosforgödslingen om du har kalkat din jord (Simonsson m.fl., 2016).

### 5.2.5 God effekt av fosfor i stallgödsel

Enligt SCB (2020) kom 55 % av all fosfor som tillfördes svensk åkermark 2018/2019 från stallgödsel. På kort sikt är effekten av fosfor som tillförs via stallgödsel cirka 60–70 % jämfört med motsvarande mängd fosfor i mineralgödsel. På lång sikt är fosfor i stallgödsel lika tillgänglig som i mineralgödsel (Delin m.fl., 2014).

Om du använder stallgödsel kan det av praktiska skäl vara aktuellt att gödsla för mer än ett år. Anpassa stallgödseltillförseln efter markkartan och gör en fosforbalans så att du får rätt mängd fosfor totalt sett över växtföljden.

### 5.2.6 Fosfor i avloppsslam – lägre tillgänglighet på kort sikt

Effekten av fosfor i avloppsslam har enligt Delin & Engström, (Delin & Engström, 2021), visat stor variation beroende på mängden fällningskemikalier som tillsatts i reningsverket. I en svensk studie gav fosfor i slam enligt samma källa knappt hälften så stor effekt som mineralgödsel fosfor första året. På kort sikt är alltså fosfors tillgänglighet i avloppsslam lägre än i både stallgödsel och mineralgödsel (Delin m.fl., 2014; Linderholm, 1997). Det beror på att fosfor binds hårt av de fällningskemikalier som används i reningsverken. På jordar där fosfor från slammet frigörs långsamt, exempelvis på grund av lågt pH-värde, kan du behöva komplettera med mineralgödsel fosfor under det första året efter slamgödslingen.

I skånska försök har man fått både en positiv skördeeffekt och ökad fosforhalt i marken efter många års slamgödsling (Andersson, 2015). Vid slamgödsling är det tillåtet att ge en maximal giva på 22 kg fosfor per hektar och år för upp till sju år framåt, även om det numera är vanligare att man gödslar för högst fem år åt gången. Även med en femårgiva kan mängden fosfor som tillförs vid ett och samma tillfälle vara över 100 kg per hektar, vilket är mycket mer än fosforbehovet i de flesta odlingsituationer. Slammet kan då förväntas täcka hela fosforbehovet för grödorna under dessa år.

Med tanke på risken för läckage av både fosfor och kväve är det en fördel om slamspridningen kan delas upp så att du inte tillför alltför stora mängder vid ett och samma tillfälle. Vid spridning inför höstsådd i känsliga områden kan också mängden lättillgängligt kväve vara begränsande, särskilt sedan högsta tillåtna tillförsel till andra grödor än höstoljeväxter sänktes från 40 till 30 kg per hektar 2021 (Jordbruksverket, 2004).

## 5.3 Strategier för fosforgödsling

### 5.3.1 Sträva efter lämpligt fosforinnehåll i marken på sikt

På sikt bör du sträva efter att marken ska få ett lämpligt fosforinnehåll för den odlingsinriktning du har på gården. Om du bara odlar spannmål och vall



kan det räcka att ligga i nedre delen av P-AL-klass III eller övre delen av klass II. Odlar du fosforkrävande grödor som potatis, sockerbetor, majs eller oljevaxter är det lämpligt att ligga i nedre delen av klass IVA eller övre delen av klass III. Normalt sett är det inte lönsamt att gödsla upp marken mer än till mitten av klass IVA.

Vid låga P-AL-tal är det oftast lönsamt att gödsla upp marken på lång sikt genom att tillföra mer fosfor än vad grödorna för bort under ett växtföljdsomlopp, särskilt om du har fosforkrävande grödor i växtföljden. Vid höga P-AL är det både ekonomiskt och miljömässigt bättre att i stället utnyttja markens förråd och tillföra mindre fosfor än vad grödan för bort (Bertilsson m.fl., 2005).

Kirchmann m.fl. (2020) studerade sambandet mellan olika markparametrar och normskördar i 90 olika skördeområden med bland annat data från 12 554 matjordsprover som ingick i Jordbruksverkets stora jordartskartering 2013 som grund. Författarna kunde bland annat konstatera att det fanns en positiv korrelation mellan P-AL och skörd upp till P-AL-klass IVA för höstvetete. Dock går det inte att utifrån denna studie dra slutsatsen att det är fråga om orsak och verkan – det kan också vara en samvariation där andra faktorer som påverkar skörden spelar in. Exempelvis vet vi inget om hur lantbrukarna har gödlat sina fält. På vissa håll bedrivs jordbruket extensivt medan det är mer intensivt i slättbygderna där förutsättningarna för höga skördar är goda. I en annan artikel baserad på resultat från de långliggande kalk-/fosforförsöken som startade 1936 och 1941 på Lanna (Börjesson & Kirchmann, 2022) kunde författarna konstatera att de behandlingar som fått både kalk och fosfor gett högre skördar än de som fått enbart fosfor.

Förändringar av P-AL i marken går långsamt både uppåt och nedåt eftersom marken buffrar och det sker ett utbyte mellan olika fosforpooler i marken. Det är svårt att säga hur snabbt gödslingen ger utslag på olika jordar. Därför bör du följa utvecklingen i marken genom att markkartera regelbundet och göra fosforbalanser, helst på fältnivå. I fältförsök har det visat sig att P-AL-talet sjunker något på lång sikt om man tillför lika mycket fosfor som grödan för bort. Förändringen är dock mycket långsam. Det rör sig om en minskning på mindre än 0,5 mg/100 g jord under 20 år. Snabbast sker minskningen om man redan har lågt P-AL i marken, men P-AL sjunker som regel inte lägre än till 2 mg/100 g jord (Börjesson m.fl., 2015).

### **Mer lönsamt att fosforgödsla på lång sikt**

Hur mycket fosfor det lönar sig att tillföra varierar beroende på utgångsläget när det gäller P-AL i marken, vilka grödor som ingår i växtföljden och hur lång sikt man räknar på. Här följer några exempel på ekonomiskt lönsamma strategier för fosforgödsla i en växtföljd med spannmål och oljevaxter i Mellansverige. Strategierna är framtagna utifrån resultat i långliggande fältförsök (Nätterlund, 2016).

Det finns inga grödor där det lönar sig att sträva efter ett P-AL-tal över 10 mg/100 g jord (Bertilsson m.fl., 2005).

#### **Om P-AL i marken är 5 mg/100 g jord (nedre delen av klass III)**

- På 10 års sikt är det mest lönsamt att tillföra lika mycket fosfor som grödan för bort

- På 15–20 års sikt är det mest lönsamt att gödsla mer än vad grödan för bort (fältbalans på +5 kg fosfor per hektar och år) för att bibehålla markens fosforstatus.

#### Om P-AL i marken är 10 mg/100 g jord (mitten av klass IVA)

- På 10 års sikt är det mest lönsamt att inte gödsla med fosfor alls.
- På 20–25 års sikt är det mest lönsamt att tillföra lika mycket eller lite mindre fosfor än vad grödan för bort (fältbalans på cirka -5 kg fosfor per hektar och år). Lagg fosfor till de mest fosforkrävande grödorna i växtföljden, i detta fall oljeväxterna.

### 5.3.2 Gödsla potatis, sockerbetor och majs i första hand

Om du odlar potatis, sockerbetor eller majs bör du i första hand fosforgödsla dessa grödor eftersom de är fosforkrävande och svarar bra på fosforgödsling.

**Potatis** har ett begränsat rotsystem och därmed svårt att utnyttja fosfor i markprofilen. Fosfor är viktigt för potatis eftersom den ökar och påskyndar knölbildningen och minskar risken för blötkokning och missfärgning. Det gör också att torrsubstanshalten ökar och ger en snabbare mognad och bättre lagringsegenskaper (Åsa Rölin, personligt meddelande, 2017).

Rekommendationen till potatis i [tabell 34](#) är betydligt högre än bortförseln i nästan alla P-AL-klasser, men då ingår även fosforbehovet till en efterföljande gröda förutsatt att den totala fosfortillförseln i växtföljden är tillräckligt stor. Även vid höga fosforklasser rekommenderas en mindre giva för att säkra att det finns nyligen tillförd fosfor som är tillgänglig för potatisen. Om du radmyllar gödseln i samband med sättnings eller kupning kan du minska givan med 10–20 % eftersom potatisen kan utnyttja fosfor bättre då (Nilsson m.fl., 2012). Det är bra att göra bladanalys under säsongen och anpassa gödslingen efter vad analysen visar. På jordar med högt P-AL och bra fosforleverans från marken kan dock potatisen klara sig helt utan fosforgödsling.

**Sockerbetor** har ett begränsat rotsystem i början av säsongen och kräver god tillgång på fosfor för att ge full skörd. I en artikel som bygger på resultat från de skånska bördighetsförsöken och ett stort antal andra försök med sockerbetor visar Ekelöf (2020) att det lönar sig att tillföra ganska stora mängder fosfor till sockerbetor vid låga P-AL-tal i marken (klass I och II).

Det är viktigt att sockerbetorna får tillgång till fosfor tidigt då marktemperaturen fortfarande är låg och rotutvecklingen inte har kommit så långt. Därför är det bra att radmylla eller kombiså gödsel som innehåller fosfor. Om du radmyllar gödseln kan du minska fosforgivan något (Ekelöf, 2016a; Olsson, 2016).

**Majs** är en annan gröda som svarar bra på fosforgödsling. I en försöksserie med ensilagemajs gav en startgiva med fosfor positiva effekter på skörden oavsett markens fosforstatus (Tell & Axelson, 2010). Bäst effekt fick man vid en startgiva med både fosfor och kväve. Majs odlas ofta på samma fält år efter år och på fält med högt fosforinnehåll. Om du gödslar en jord som redan har högt P-AL är det extra viktigt att tänka på risken för fosforförluster och inte tillföra mer fosfor än vad grödan behöver. Med tanke på fosforutnyttjandet och risken för läckage är det bäst om majsen kan ingå i växtföljden och rotera mellan olika fält.



**Bild 50.** Majs är en fosforkrävande gröda, precis som potatis och sockerbetor. **Foto:** Urban Wigert



**Bild 51.** Raps gynnas av god fosfortillgång. Prioritera fosforgödsling till oljeväxter i växtföljden. **Foto:** Janne Andersson

### 5.3.3 Prioritera fosfor till höst- och vårraps om du odlar oljeväxter

**Oljeväxter** (med undantag för lin) gynnas av att marken har en god fosforstatus. Om höst- eller våroljeväxter (förutom lin) ingår i växtföljden bör P-AL i marken inte ligga lägre än i mitten av klass III. Odlar du oljeväxter bör du även prioritera fosforgödsling till höst- och vårraps i växtföljden. Det är bra att fosforgödsla dessa grödor tidigt, helst i samband med sådd.

**Höstraps** bör helst fosforgödslas på hösten i samband med sådd. Förutom att det har en skördehöjande effekt är det också viktigt för övervintringen. I försök övervintrade höstrapsen betydligt bättre om kväve, svavel, fosfor, kalium, bor och magnesium tillfördes på hösten jämfört med om man tillförde enbart kväve och svavel (Gunnarson, 2014). Kombiså, mylla eller bruka ner fosfor om du sprider på hösten och se till att sprida gödseln vid lämpliga förhållanden för att minska risken för förluster. Vid större givor kan du dela fosforgivan och tillföra en del på hösten vid sådd och resten tidigt på våren.

### 5.3.4 Prioritera vårsäd och höstkorn före annan höstsäd

I en spannmålsväxtföljd bör du i första hand fosforgödsla **vårsäd**, men även **höstkorn** gynnas av god tillgång på fosfor. Vårsädens rotsystem är mindre än höstsädens och når därför en mindre jordvolym där det kan ta upp fosfor. Odlar du både havre och korn bör du prioritera kornet före havren. I försök har både **korn** och **havre** svarat bra på fosforgödsling på jordar med P-AL-klass II och III (Gruvaeus, 2007; Krijger, 2009). Havre verkar dock inte vara lika känslig för låga fosforhalter i marken som korn enligt en utvärdering av de långliggande bördighetsförsöken (Börjesson m.fl., 2015). Vid fosforgödsling till korn sjönk proteinhalten medan stärkelsehalten ökade (Gruvaeus, 2007). Detta kan ha berott på att skördeökningen som NPK gav i dessa försök ledde till att kväve blev begränsande.

Om jorden ligger i P-AL-klass II eller lägre bör du även fosforgödsla **höstsäd**. Gödsla i så fall redan i samband med sådd så att grödan har tillgång till fosfor på hösten och vid den tidiga tillväxten på våren (Gruvaeus, 2005b). Gruvaeus (2018) kunde bland annat konstatera att svag fosfortillgång på hösten försämrade bestockningen i höstvet och höstkorn. Genom att kombiså, mylla eller bruka ned gödseln minskar du risken för förluster och förbättrar effekten av tillförd fosfor. Höstsädens kvävebehov på hösten är litet och täcks normalt av markens mineralisering. Därför bör du använda gödselmedel som

innehåller lite eller inget lättillgängligt kväve vid höstgödsling, till exempel MAP (NP 12–23), PK 11–21, NPK med lågt kväveinnehåll eller P 20.

### 5.3.5 Lin, ärter, åkerböna och vall kräver inte mycket fosfor

**Lin, ärter och åkerböna** kräver inte mycket fosfor. I försök med fosforgödsling till lin gav gödslingen ingen skördeökning alls (Krijger & Gunnarson, 2011a). Fosforgödsling gav heller ingen tydlig skördeökning på jordar i P-AL-klass II–IV i två olika försökserier med ärter (Gruvaeus, 2005a) respektive åkerböna (Krijger, 2015). Någon gång under växtföljden bör du dock ersätta den fosfor som förts bort med dessa grödor också om jorden ligger i P-AL-klass III eller lägre.

**Vall** är ytterligare en gröda som inte gett någon tydlig skördeökning vid fosforgödsling i försök (Börjesson m fl., 2015). Därför ligger rekommendationen till vall på en fosforgödsling som motsvarar bortförslut i P-AL-klass II.

Även om vår- och sommarspridning numera är betydligt vanligare förekommer det att stallgödsel sprids på vall under hösten. Enligt Statistikmyndigheten (SCB, 2020) spreds stallgödsel under hösten på 15 % av slättevallsarealen. Fördelen är att gödsellagret kan tömmas inför vintern och att risken för markpackning är relativt liten om marken är torr. Nackdelen är att risken för ammoniak- och fosforförluster ökar om du sprider stallgödsel utan att mylla eller bruka ner den. Vallstubben ger dock ett visst skydd mot erosion och fosforförluster. Om du tillför måttliga givor och undviker att sprida på skiften där det finns risk för ytavrinning går det oftast bra. Glöm inte att följa de regler och begränsningar för höstspridning som finns i Jordbruksverkets föreskrifter (Jordbruksverket, 2004). Läs mer om spridningsreglerna i [kapitel 2.2.4](#).



**Bild 52.** Ärtor är inte så fosforkrävande.  
Foto: Urban Wigert

## 5.4 Minska risken för fosforförluster

### 5.4.1 Bra dränering och markstruktur minskar fosforförlusterna och förbättrar växtnäringsutnyttjandet

En väl fungerande dränering, bra markstruktur och god infiltrationskapacitet ger grödan förutsättningar att utveckla ett bra rotsystem som kan ta upp vatten, fosfor och andra näringsämnen ur en stor jordvolym. Samtidigt minskar risken för att jordpartiklar ska följa med avrinnande vatten och föra med sig fosfor från fältet.

Om du har lerjordar kan du strukturkalka. Strukturkalkning förbättrar markstrukturen och minskar risken för fosforförluster (Blomquist & Berglund, 2019). Strukturkalk är dock inte tillåtet att använda inom ekologisk produktion. Naturligt förekommande gips får användas i ekologisk produktion, men gips har betydligt kortvarigare struktureffekt. Läs mer om strukturkalkning i [kapitel 8.7](#) och i Greppa Näringsens praktiska råd nr 23 [Strukturkalkning – bra för både mark och miljö](#) (Berglund & Blomquist, 2015).

Om du planerar att göra om dräneringen på fält med lerjord bör du överväga att anlägga kalkfilterdiken genom att blanda in strukturkalk i återfyllnadsmassorna. Därigenom ökar markens infiltrationskapacitet 10–30 gånger samtidigt som fosforförlusterna minskar. Mätningar i Greppa Fosfors pilotområde i Östergötland, där ena halvan av ett fält kalkfilterdikades medan den andra täckdikades på konventionellt sätt visar att fosforförlusterna kan minska med upp till 80 %.

### 5.4.2 Undvik uppgödsling av redan fosforrika jordar

I genomsnitt för hela Sverige gödslar vi med ungefär lika mycket fosfor som grödan för bort, men gödseln är ojämnt fördelad mellan olika områden. I djurtäta områden där det finns ett överskott av stallgödsel kan fosfortillförseln vara betydligt större än bortförseln. På sikt ökar fosforinnehållet i marken i dessa områden medan många växtodlingsgårdar i andra delar av landet har underskott i fosforbalansen.

Undvik att sprida stallgödsel på fält där marken redan har högt fosforinnehåll, eftersom fosfor då inte utnyttjas på bästa sätt och risken för förluster kan öka. Försök i stället att sprida stallgödseln på andra fält eller samarbeta med växtodlingsgårdar som har mer nytta av gödseln. Går inte det bör du i varje fall tillföra mindre fosfor än grödan för bort så att markens fosforinnehåll inte ökar ytterligare. Undvik också i möjligaste mån att sprida stora givor som täcker flera års fosforbehov. Det ökar också risken för förluster. Oavsett vilken gröda du odlar är det inte motiverat att gödsla upp marken mer än till mitten av P-AL-klass IVA, vare sig ekonomiskt, miljömässigt eller med tanke på att fosfor är en ändlig resurs.

Om jorden har högt P-AL och/eller liten förmåga att binda fosfor kan jordens fosformättnadsgrad bli hög. Då ökar risken för fosforförluster. Alvens egenskaper har dock stor betydelse. Även om fosforinnehållet i matjorden är högt kan alven bidra till att fånga upp den fosfor som läcker från matjorden om vattnet infiltrerar genom markprofilen. Jordens förmåga att binda fosfor är högre ju mer järn och aluminium den innehåller. Genom att även analysera järn (Fe-AL) och aluminium (Al-AL) när du markkarterar och ändå analyserar P-AL kan du få ett mått på jordens kapacitet att binda fosfor och fosformättnadsgrad.

### 5.4.3 Undvik att sprida gödsel där det finns risk för ytavrinning, erosion eller stående vatten

För att minska risken för fosforförluster är det viktigt att undvika att sprida gödsel vid tidpunkter och på platser där det finns risk för ytavrinning, erosion eller stående vatten. Det gäller särskilt om du inte kan mylla eller bruka ner gödseln, exempelvis på vall. På lerjordar kan det under sommaren bildas torksprickor där fosfor och jordpartiklar snabbt kan transporteras ut via dräneringssystemet i samband med häftiga regn genom så kallat makroporflöde eller inre erosion. Sådan erosion ser man oftast inte med blotta ögat.

I Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring (Jordbruksverket, 2004) finns regler för höst och vinterspridning som bland annat syftar till att minska risken för fosforförluster. Läs mer om det i [avsnitt 2.2.4](#).





**Bild 53.** Vid snösmältning och häftiga regn som leder till ytavrinning och erosion sker ofta stora fosforförluster på kort tid. Med en väl fungerande dränering och god markstruktur kan du förebygga sådana problem. **Foto:** Hans Jonsson

#### 5.4.4 Håll marken bevuxen och anlägg skyddszoner

På sluttande fält kan du minska risken för fosforförluster via ytavrinning genom att jordbearbeta på tvären mot marklutningen och i så stor utsträckning som möjligt hålla marken bevuxen under höst och vinter. Undvik att höstharva plöjd mark som ska vårsås. På de mest utsatta ställena, till exempel runt dräneringsbrunnar och på andra ställen där det förekommer ytavrinning och erosion, kan det vara bra att anlägga gräsbevuxna skyddszoner. Om gården ligger inom känsligt område (se [avsnitt 2.2.4.3](#)) kan du söka miljöersättning både för skyddszoner längs vattenområden och anpassade skyddszoner inne i fält, exempelvis runt dräneringsbrunnar. Ersättningsnivån för anpassade skyddszoner har i den nuvarande programperioden höjts från 3 000 till 10 000 kr/ha.



**Bild 54.** En gräsbevuxen skyddszon kan fånga upp jordpartiklar med fosfor så att inte fosfor hamnar i vattendraget. **Foto:** Katarina Börling

#### 5.4.5 Fånga fosfor med en fosfordamm

I områden med stora fosforförluster kan det även vara effektivt att anlägga en fosfordamm för att fånga upp partikelbunden fosfor som lämnat fältet och är på väg ut i sjöar och vattendrag. Läs mer om fosfordammar i Greppa Näringens praktiska råd nr 25 [Fånga fosfor med en fosfordamm](#) (Börling, 2017).

# 6 Kalium



**Bild 55.** Kaliumbrist i spannmål.  
**Foto:** Peter Waern

Kalium har ett flertal viktiga funktioner i växten. Bland annat hjälper kalium växterna att hålla upp saftspänningen i cellerna, det som även kallas turgor. Näringsämnet används också för fotosyntes samt för protein och stärkelsesyntes. Brist på kalium gör grödan mer torkkänslig. För höstsådda grödor kan alltför låg tillgång medföra sämre vinterhärdighet.

Symtom på kaliumbrist på spannmål ser du på äldre blad som gulnar och får döda fläckar (nekros) i främst bladkanter och bladspetsar. Tillväxten blir dessutom nedsatt. Klöver får små, gråvita fläckar strax innanför bladkanten. Fläckarna flyter så småningom samman och det blir en brun sammanhängande kant runt bladet. Potatis får tjocka, rynkiga blad med inböjda kanter och en blågrön färg. Bladen utvecklar bruna fläckar kring bladnerven och bladkanterna vissnar så småningom. Raps får buckliga och blågröna blad. De äldre bladens kanter vissnar och döda fläckar bildas mellan bladnerverna (Aasen, 1997; West Larsen, 1998).

## 6.1 Kalium i marken

I marken finns kalium löst i markvätskan, utbytbart eller hårt bundet i lermineralen. Det kalium som finns bundet i lermineralen utgör det största förrådet, men det är mycket svårt för växterna att komma åt. Genom vittring frigörs kalium och blir utbytbart. Växterna tar främst upp kalium som finns i markvätskan och det som är utbytbart. Kalium som är löst i markvätskan är relativt lätttröligt och kan också lakas ut, framför allt ur sandiga och mullrika jordar (Hahlin & Ericsson, 1984).

Hur mycket kalium som frigörs genom vittring varierar mycket och beror på hur mineralerna är sammansatta, men också på kaliumbalansen i fältet. I en undersökning av kaliumvittringen i 8 svenska försök (bördighetsförsök och odlingssystemförsök) varierade vittringen av kalium mellan 35 och 65 kg per hektar och år för lerjordar. För sandjordar var vittringen betydligt lägre, endast 8 kg per hektar och år. Nivån av förrådskalium, (K-HCl) ger en bild av hur stabil vittringen är över tid. Undersökningen visade också att förrådet av kalium är uttömt efter 30–300 år (Andrist Rangel, 2008).



**Bild 56.** På lerjordar kan vittring bidra med kalium till grödornas behov, medan lätta jordar kräver kaliumtillförsel via gödsling. **Foto:** Jens Blomquist

## 6.2 Riktgivor och strategier för kaliumgödsling

### 6.2.1 Gödsla efter grödans behov och markens kaliuminnehåll

Grundregeln är att planera kaliumgödslingen efter bortförsel med grödan och markens egen leverans av kalium. Gödslingsbehovet är störst på jordar med låg lerhalt. K-AL-talet visar mängden lättillgängligt kalium, medan förrådet av kalium (K-HCl) ger en fingervisning om hur stabilt K-AL-talet är. Är förrådet av kalium lågt, som till exempel i K-HCl-klass I eller II, finns det goda skäl att kaliumgödsla även om K-AL-klassen är III. Då är vittringen av kalium från markförrådet begränsad och K-AL-talet påverkas snabbare. Om K-HCl-klassen är III eller högre kan du däremot räkna med att vittringen ofta balanserar bortförseln av kalium i en växtföljd med spannmåls och oljeväxtgrödor under lång tid. Du behöver alltså inte prioritera kaliumgödsling till grödor med litet kaliumbehov på jordar med K-AL-klass III om K-HCl-klassen är III eller högre och om K/Mg-kvoten inte är för låg (se [kapitel 7.2.4](#)). De flesta grödor behöver ta upp mycket kalium, men för stråsäd och oljeväxter återförs också stor mängd kalium till fältet med skörderesterna.

Klassindelningen när det gäller kaliuminnehåll i marken visas i [tabell 37](#).

**Tabell 37.** Klassindelning och halter av kalium (K) i jord.

Klass	Kaliuminnehåll	
	Lättilöslig fraktion	Förrådsfraktion
	K-AL (mg/100 g torr jord)	K-HCl (mg/100 g torr jord)
I	<4	<50
II	4,0-8,0	50-100
III	8,1-16,0	101-200
IV	16,1-32,0	201-400
V	>32	>400

### 6.2.2 Bäst kaliumeffekt vid vårgödsling

Du får i regel bättre kaliumeffekt vid vårgödsling till vårsådda grödor jämfört med höstgödsling. Inför höstsådd är höstgödsling ett alternativ på jordar med låg kaliumklass. En anledning till att tillföra kalium på hösten är att näringsämnet kan bidra till förbättrad vinterhärdighet. Ytterligare skäl för höstgödsling med kalium till höstsäd kan vara om grödan samtidigt har ett behov av fosfor under hösten. Då kan NPK vara ett lämpligt val av gödselmedel. Kalium i stallgödsel anses ha samma effekt som kalium i mineralgödsel. Av praktiska skäl kan höstspredning av fasta stallgödselslag vara aktuellt trots eventuella kaliumförluster. Gödsling med kalium till höstsäd på våren fungerar väl på jordar som inte har låga kaliumklasser.

Vid stora engångsgivor av kalium kan balansen med andra näringsämnen, speciellt magnesium, bli störd. Läs mer i [kapitel 7.2.4](#).

### 6.2.3 Bortförsel av halm eller blast ökar kaliumbehovet

I [tabell 38](#) hittar du riktgivor för kalium till olika grödor (Hahlin & Ericsson, 1984; Mattson, 2005). Riktgivorna förutsätter att halm eller blast brukas ner. Om du för bort halm eller blast påverkas kaliumtillståndet i ett längre tidsperspektiv. Det är framför allt lätta jordar som påverkas eftersom den kaliumlevererande förmågan är lägre på dessa jordar. I sådana fall bör du justera givan enligt kommentar under [tabell 38](#). Denna ”extragödsling” till följd av extra bortförsel behöver du inte göra på lerjordar i K-AL-klass IV och V.

**Tabell 38.** Riktgivor för kaliumgödsling till olika grödor.

Gröda	Skördenivå (ton/ha)	Bortförsel av K (kg/ha)	Rekommenderad kaliumgiva (kg/ha) K-AL-klass				
			I	II	III	IV	V
Stråsäd <sup>a)</sup>	5	22	40	30	10	0	0
Våroljeväxter	2	16	40	30	10	0	0
Höstoljeväxter	3,5	28	55	45	25	10	0
Slättervall vall I, ts	6	150	120	80	40	0	0
Slättervall, vall II o äldre, ts	6	150	160	120	80	40	0
Fodermajs, ts <sup>b)</sup>	10	95	150	120	80	50	0
Potatis <sup>c)</sup>	40	200	300	250	200	150	0
Socketbetor <sup>d)</sup>	65	80–100	120	90	50	30	0
Ärter/ åkerböna	3,5	35	50	40	20	0	0
Betesvall på åker			40	20	0	0	0

a) Vid bortförsel av halm ökas givan med 20 kg K/ha (inte på lerjordar i K-AL-klass IV–V).

b) Avser majsensilage.

c) Vid odling av stärkelsepotatis minskas givan med 50–100 kg K/ha då för mycket kalium sänker stärkelsehalten.

d) Vid bortförsel av blast ökas givan med 75 kg K/ha i K-AL klass I och II samt med 40 kg K/ha i K-AL-klass III.

Om skördenivån är högre eller lägre än vad som anges i [tabell 38](#), bör du öka eller minska kaliumgivan enligt [tabell 39](#).

**Tabell 39.** Justering av kaliumgivan beroende på skördenivå.

Gröda	Justering per ton avvikelse i skörd (kg K/ha)
Stråsäd	5
Oljeväxter, ärter	10
Majs (ts)	10 <sup>a)</sup>
Slättervall (ts)	20
Potatis	4
Socketbetor	1,5-2 <sup>b)</sup>

a) Justera upp till max 150 kg K/ha.

b) Justera med den högre nivån i K-AL klass I och den lägre nivån i K-AL-klass II–IV.



## 6.2.4 Kaliumgödsling till olika grödor

### 6.2.4.1 Stråsäden tar upp nästan lika mycket kalium som kväve

Upptaget av kalium är stort i stråsäd, men bortförelsen är däremot relativt låg om du lämnar halmen kvar på fältet. En höstvetegröda som avkastar 10 ton behöver ta upp cirka 250 kg kalium, men för bara bort cirka 45 kg med kärnskorde. För stråsäd som odlas på jordar med K-AL klass I eller II rekommenderar vi att du tillför något mer kalium jämfört med det som förs bort. Vid odling av stråsäd på jordar i K-AL-klass III-V bör du däremot tillföra en något lägre mängd jämfört med bortförelsen.

**Stråsäd efter vallbrott kräver ofta mer kalium.** En flerårig vall tömmer profilen effektivt på kalium. Därför är det viktigt att tillgodose stråsädens behov efter vallbrottet, särskilt om lerhalten inte är så hög.

### 6.2.4.2 Höstrapsen tar upp mycket kalium på kort tid

Oljeväxter för bort lite kalium med fröet, så enligt ersättningsprincipen är behovet lågt. Men rapsen tar upp mycket kalium under kort tid på våren, när stjälk och blast utvecklas. Det stora behovet under begränsad tid gör att vittningen kan ha svårt att hinna tillfredsställa rapsens behov. Speciellt om du odlar höstraps på lite lättare jordar, bör du se till att grödan är försedd med tillräckligt mycket kalium.

### 6.2.4.3 Kaliumgödsling till slåttervall – en balansgång

I en normal slåttervall bortförs mellan 200 och 250 kg kalium med skörden varje år, samtidigt som mycket kalium ofta återförs med stallgödsel. Vallens kaliumförsörjning är en balansgång och kaliumanalysen en färskvara. Det är viktigt att anpassa gödslingen till varje delskörd, eftersom vallen kan ”lyxkonsumera” kalium. Om du tillför mycket kalium till första skörden kan det medföra höga halter i grovfodret, vilket i sin tur medför risk för kornas hälsa. Får vallen däremot för lite kalium kan det å andra sidan medföra skörde-förluster.

Försök styra stallgödseltillförelsen till andra och tredjeårsvallarna för att minska risken för alltför hög kaliumtillgång till första årets vallskörd. Är kaliumbehovet litet, det vill säga mindre än 60 kg kalium per hektar, kan du med fördel ge hela kaliumgivan till återväxten.

En färsk jordanalys är ett bra verktyg inför gödsling till första årets vall. Om du gör en jordanalys i liggande vall bör du alltid gödsla enligt rekommendationerna för första vallåret, året efter att jordanalysen är gjord. Anledningen är att du på grund av vallens höga upptag av kalium förmodligen kommer att få ett lägre värde på jordens lösliga innehåll av kalium jämfört med om du hade gjort analysen i en annan gröda i växtföljden. Till den gröda som kommer efter en flerårig vall bör du öka givan med cirka 20 kg kalium per hektar jämfört med rekommendationerna i [tabell 38](#) under förutsättning att vallen inte gödslats i balans med bortförelsen av kalium.

Vi rekommenderar att du tillför mindre kalium än du för bort, förutom till vallar som odlas på marker i K-AL-klass I. Lika stor tillförelse som bortförelse med skörd kan leda till för hög kaliumhalt i vallfodret. Eftersom vallen tar



upp mycket av det kalium som finns tillgängligt i marken under det första året behöver du prioritera högre kaliumgödsling till äldre vallar.

Grovfoderanalysen är ett bra facit på hur du lyckats med kaliumgödslingen. Kaliumhalten bör ligga mellan 20 och 30 gram kalium per kg ts. Om analysen visar lägre värde har du förmodligen förlorat i skörd, men om analysen visar högre värde ökar risken för att djurhälsan påverkas.

#### 6.2.4.4 Sockerbetor är känsliga för kaliumbrist – se upp på lätta jordar

Till sockerbetor på lerjordar rekommenderar vi att tillförseln av kalium generellt bör ligga lägre än bortförseln, eftersom vittringen i många fall kan bidra under betornas långa tillväxtperiod. Men på lättare jordar är det mycket viktigt att försäkra sig om att kalium inte är begränsande för betornas tillväxt. I sockerbetor samverkar natrium med kalium och om du gödslar med både natrium och kalium kan du öka utväxlingen av tillfört kalium (Ekelöf, 2016b).

#### 6.2.4.5 Kalium påverkar potatisens kvalitet

Potatis odlas ofta på lätta jordar och många moderna potatissorter har ett högt kaliumbehov. Kalium minskar risken för mörkfärgning och därför bör tillförsel av kalium vara högre än bortförsel på jordar med K-AL-klass I–III.

Framförallt i matpotatisodling bör du vara noga med att balansera kaliumtillförseln väl. Alltför mycket kalium sänker ts-halten och kan öka risken för blötkokning.

Rekommendationen för stärkelsepotatis ligger cirka 50–100 kg under vad som behövs till matpotatis. Givorna bör inte överstiga 300 kg K per ha på grund av risken för sänkt stärkelsehalt.

Potatis odlas på lätta jordar och eftersom kalium är lätttrörligt i dessa jordar kan det vara en fördel att dela kaliumgivorna. Vanligen gödslar man potatis med produkter baserade på kaliumsulfat eller kalimagnesia eftersom grödan anses vara klorkänslig.

#### 6.2.4.6 Gödsla salix med kalium vid etableringen

Vid etablering av salix bör du gödsla med 50–80 kg kalium per hektar om K-AL-klassen är III eller lägre. Vid högre K-AL-klass kan du eventuellt utesluta grundgödsling. Om du använder avloppsslam vid salixodling täcker det grödans behov av både fosfor och kalium.



**Bild 57.** Om halmen förs bort försvinner även mycket kalium från fältet. Då behöver det ersättas med extra kaliumgödsling, särskilt på lätta jordar. **Foto:** Hans Jonsson

### 6.2.5 Förhållande mellan kalium och magnesium (K/Mg-kvot)

När växten tar upp näring konkurrerar kalium och magnesium med varandra om utrymmet vid transporten in genom rotytan. Du kan läsa mer om detta i [kapitel 7.2.4](#).

# 7 Magnesium, svavel och mikronäringsämnen

Förutom kväve, fosfor och kalium kan du behöva tillföra ett antal andra näringsämnen för att undvika brister och därmed skördesänkningar eller kvalitetsproblem. Vi brukar dela upp näringsämnen i mikro- och makronäringsämnen. Mikronäringsämnen är ämnen som växterna behöver i små mängder till skillnad från makronäringsämnen som behövs i större mängder. Till makronäringsämnena räknas förutom kväve, fosfor, kalium bland annat svavel och magnesium. Av mikronäringsämnena skriver vi främst om bor, mangan och koppar eftersom det är störst risk för brist av dessa ämnen i våra jordbruksgrödor.

## Vad påverkar tillgängligheten och vilka åtgärder kan du göra för att undvika brist?

- Markens pH-värde är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar tillgängligheten av mikronäringsämnen.
- Högt pH-värde ger sämre tillgänglighet jämfört med lågt pH för alla ämnen utom molybden. I praktiken märks detta framför allt för mangan och zink.
- I mullrika jordar kan koppar bindas hårt till det organiska materialet. Tillgängligheten för mangan och järn kan också vara låg om jorden har en lucker struktur.
- Förrådet av mikronäringsämnen är mindre i lätta jordar jämfört med i lerigare jordar.
- Torka och kyla kan minska upptaget i växterna på grund av minskad rottillväxt och långsammare näringstransport i marken.
- Svavel behöver du tillföra regelbundet till alla grödor i proportion till kvävetillförseln.
- För magnesium och mikronäringsämnen bedömer du behovet av gödning efter markens egenskaper eller näringsinnehåll, vilken gröda du odlar samt väder.

## 7.1 Tillgängligheten är mer avgörande än mängden

Den totala mängden mikronäringsämnen i marken är ofta stor i förhållande till grödans behov. Ofta är det istället tillgängligheten för växterna som avgör hur stort upptaget i grödan blir och som också påverkar risken för att brist ska uppstå. Markens pH-värde är den enskilt viktigaste faktorn som i olika grad påverkar hur tillgängliga mikronäringsämnen är. Alla ämnen utom molybden är mindre tillgängliga vid högt pH-värde än vid lågt. Det är framför allt för mangan och zink som anses ge en gradvis försämrad tillgänglighet på

jordar med pH-värde över 6,5. Även i mullrika jordar kan det bli brister. Dels eftersom vissa ämnen som framför allt koppar, binds hårt till det organiska materialet. Dels för att dessa jordar ofta har en mycket lucker struktur och det minskar tillgången på mangan och järn. En jord med låg lerhalt har dessutom ofta ett mindre förråd av många mikronäringsämnen jämfört med lerjordar, vilket också kan leda till en ökad risk för brist.

Väderleken spelar också in. Kyla och torka medför minskad rottillväxt samt långsammare upplösning och transport av olika näringsämnen och det ökar risken för brist. Eftersom många mikronäringsämnen rör sig långsamt i marken kan grödans rotsystem påverka förmågan att ta upp de mängder som grödan behöver. Med ett begränsat rotsystem kan inte grödan utnyttja lika stora jordvolymmer och därmed kan näringsupptaget påverkas negativt.

I kommande avsnitt går vi igenom hur du kan göra en riskvärdering och bedöma om dina fält ligger i riskzonen för att drabbas av brist på magnesium, svavel, bor, mangan eller koppar samt hur du på bästa sätt åtgärdar en eventuell brist. I [tabell 40](#) finns en sammanfattning av risken för brist samt hur och när du bör gödsla.

**Tabell 40.** Gränsvärden för brister, känsliga grödor samt gödslingsråd för magnesium, svavel, bor, mangan och koppar.

	Magnesium, Mg	Svavel, S	Bor, B	Mangan, Mn	Koppar, Cu
<b>Risk för brist</b>	Om jordanalys visar 4-10 mg/100 g jord. Det högre värdet vid hög lerhalt och krävande grödor.	Om växtanalys visar på en N/S kvot >16-20 <sup>a)</sup>	Oklart vilka värden som visar på brist.	I känsliga grödor om pH > 6,5 och/eller jorden är lucker.	Om jordanalys visar <6-7 mg Cu/kg jord <sup>b)</sup>
<b>Jordar där brist i första hand uppträder</b>	Lätta jordar och jordar med lågt pH, <5,5	Mullfattiga jordar, hög kvävegödsling	Torka och på jordar med pH-värde under 6,0 eller över 7,5. Kalkning kan minska upptaget.	Lätta och/eller mullrika jordar med högt pH och lucker struktur	Lätta jordar och/eller mulljordar, framför allt mulljordar i sydvästra Sverige
<b>Tillför i första hand</b>	Vid kalkbehov tillför kalk som innehåller magnesium. Annars gödsla med mineralgödsel.	Mineralgödsel med svavel, tillför i proportion till kväve	Gödsla årets gröda med mineralgödsel alternativt bladgödsla	Bladgödsla, välta efter sådd	Förrådsgödsla sandiga jordar. Bladgödsla mullrika jordar.
<b>Förrådsgödsling</b>	50–100 kg Mg/ha <sup>c)</sup>	-	-	-	5–7 kg Cu/ha
<b>Gödsling till årets gröda</b>	10–20 kg Mg/ha	10–30 kg S/ha. Tillför svavel i proportion till kväve.	Borkrävande grödor: 0,5–1,5 kg B/ha	Inte aktuellt	0,5–1,0 kg Cu/ha
<b>Bladgödsling i växande gröda</b>	1–2 kg Mg/ha	5–8 kg S/ha	0,2–0,5 kg B/ha	0,1–2 kg Mn/ha <sup>d)</sup>	0,15–0,5 kg Cu/ha

a) Reuter & Robnsson, 1997.

b) Upp till det dubbla värdet på mulljordar på grund av lägre volymvikt.

c) Rekommenderade magnesiumgivor kan överskridas om man tillför dolomit.

d) Manganbehandling kan behöva upprepas.

## 7.2 Magnesium – risk för brist på lätta jordar

### 7.2.1 Förekomst i marken och växtupptag

Magnesium förekommer i olika typer av mineral i jorden och mängden magnesium i marken påverkas i hög grad av jordarten. Jordar med hög lerhalt har generellt ett större förråd än sandjordar. Magnesium lakas också ut i högre utsträckning på lätta jordar. Grödans upptag av magnesium påverkas både av förrådets storlek och av tillgängligheten i marken.

### 7.2.2 Riskvärdering för brist och bristsymtom

Om du har lätta jordar ökar risken för magnesiumbrist. Även pH-värdet kan ha betydelse där mycket låga pH-värden, lägre än 5,5, minskar tillgängligheten. Stallgödsel ger ett betydande tillskott av magnesium och om du regelbundet tillför stallgödsel minskar risken för brist. För att bedöma markens status kan du göra en jordanalys. Analysen görs normalt med extraktion av ammoniumlaktat-acetat (Mg-AL) och ingår oftast när du gör en markkartering. Halterna bör ligga på minst 4–10 mg per 100 g jord för att du ska undvika problem med magnesiumbrist (Lagerquist, 1970; Nilsson, 1975). Odlar du magnesiumkrävande grödor bör halten i jorden ligga i den övre delen av intervallet. Lerjordar kräver också ett högre magnesiumtal än sandjordar. När du bedömer risken för magnesiumbrist bör du även titta på förhållandet mellan magnesium och kalium (se [kapitel 7.2.4](#)).

Symtom på magnesiumbrist kan du se först på äldre blad eftersom magnesium är lätt rörligt i växten. I stråsåd kan du se magnesiumbrist i form av gröna fläckar eller ”klorofyllklumpar” som visar sig i band längs bladen. Hos sockerbeter och potatis visar sig magnesiumbrist istället i form av blad som gulnar mellan bladnerverna. I potatis förblir bladkanterna ofta gröna.



**Bild 58.** Magnesiumbrist i korn.  
**Foto:** Karl-Arne Hedene

### 7.2.3 Behov och gödsling

Sockerbeter och potatis har störst magnesiumbehov, cirka 35 kg per hektar, medan oljeväxter, vall och ärter behöver cirka 15–20 kg och spannmål cirka 10 kg per hektar.

Vid behov kan du gödsla med mineralgödsel som innehåller magnesium. Du kan också förrådsgödsla med magnesium. Det billigaste sättet att tillföra magnesium om fältet också behöver kalkas är att välja kalk som innehåller magnesium. Annars kan du förrådsgödsla med kieserit (magnesiumsulfat) eller kalimagnesia.

### 7.2.4 Konkurrens mellan kalium och magnesium (K/Mg-kvot)

Kalium och magnesium konkurrerar med varandra vid upptaget i växten och därför är det viktigt att du ser till att balansen mellan dessa båda ämnen ligger på en bra nivå. Det är främst upptaget av magnesium som kan påverkas negativt vid höga kaliumtal i marken. För att bedöma risken för magnesiumbrist behöver du både titta på magnesiumtalet i marken och på kvoten mellan kalium och magnesium (K/Mg-kvoten). Är kvoten för hög så riskerar grödan att drabbas av magnesiumbrist trots att markens innehåll av magnesium

egentligen är tillräcklig. Hög kvot kan också leda till att skörden inte ökar eller att den till och med sjunker efter en eventuell kaliumgödsling eftersom magnesiumbristen då förvärras.

Exakt vad kvoten bör ligga på är inte kartlagt och varierar också med jordart, pH-värde samt vilken gröda som odlas. Äldre studier tyder på att kvoten bör ligga mellan 1 och 3 för magnesiumkrävande grödor som potatis och sockerbeter, medan kvoten troligen kan vara något högre för andra jordbruksgrödor (Nilsson, 1975; Havlin m.fl., 2005). Värden i den övre delen av intervallet (2–3) kan accepteras i låga K-AL-klasser (I–II) och när du odlar grödor med relativt litet magnesiumbehov som till exempel spannmål. Vid lågt K-AL-tal där kvoten samtidigt är låg (< 1) kan istället kaliumupptaget påverkas negativt. Detta har rapporterats i tidigare studier, men det är osäkert hur stor påverkan detta har på skörden (Hahlin m.fl., 1980; Hahlin, 1991).

## 7.3 Svavel – gödsla i proportion till kväve

### 7.3.1 Förekomst i marken och växtupptag

En stor del av svavlet i marken finns bundet i organisk form och frigörs på samma sätt som kväve vid mineralisering av organiskt material. Svavel tas upp i växten i form av sulfatjoner, som liksom nitrat lätt kan lakas ut. Organiska gödselmedel kan ha en långsiktig svaveffekt när det organiska materialet successivt mineraliseras. Svavel hör tätt samman med kväve i växtens uppbyggnad, där båda dessa behövs för att bland annat bygga aminosyror och proteiner. När mineralkväve tillförs behöver man därför även tillföra svavel i rätt proportion för att undvika svavelbrist. Förhållandet mellan kväve och svavel bör vara 10 till 1–1,5 för stråsåd och 10 till 2–2,5 för oljeväxter.



**Bild 59.** Svavelbrist i oljeväxter.  
**Foto:** Peder Waern

### 7.3.2 Riskvärdering för brist och bristsymtom

Tillför du svavel regelbundet och till alla grödor så undviker du brister. Störst risk för brist är det på jordar med låg mullhalt och där organiska gödselmedel inte tillförs. Symtom på svavelbrist syns som gulnande blad, precis som vid kvävebrist. Skillnaden är att svavelbrist främst syns på yngre blad och kvävebrist på äldre blad. Vid brist i spannmål får bladen ofta ett gulrandigt utseende och oljeväxter kan få lilafärgade bladkanter. Svavelbrist leder till försämrad tillväxt och bestockning samt försenad och minskad blomning och kärn- eller frösättning. En obalans mellan kväve och svavel gör att det tillförda kvävet inte kan utnyttjas fullt ut.

### 7.3.3 Behov och gödsling

Oljeväxter samt potatis och sockerbeter har störst behov av svavel, cirka 30–40 kg per hektar. Därefter kommer baljväxter och vall, cirka 15–20 kg per hektar. Spannmål har lägst behov, cirka 10–15 kg per hektar.

Det går inte att förrådsgödsla med mineraliskt svavel utan det behöver tillföras varje år, helst som mineralgödsel med svavel. Tillförsel av organiska gödselmedel ger en långsiktig svaveffekt och kvoten mellan kväve och svavel i stallgödsel stämmer ofta väl överens med grödans behov. Till svavelkrävande grödor kan du behöva tillföra extra svavel om du använder organiska gödselmedel. Många kvävegödselmedel är anpassade för att ge en bra balans mellan kväve och svavel. Om du använder ett gödselmedel som



täcker hela grödans svavelbehov vid huvudgivan kan du gödsla med ett kvävegödselmedel utan svavel vid kompletteringsgivorna. Till vallar kan du också ge hela svavelbehovet till förstaskörden.

Om det uppstår svavelbrist akut kan du bladgödsla med svavel, men då måste du komplettera med svavel i fast form för att täcka hela behovet.

## 7.4 Bor – upptaget påverkas av torka

### 7.4.1 Förekomst i marken och växtupptag

Bor är relativt lättroligt i marken och lakas lätt ut med nederbörd, särskilt på sandiga jordar. Bor frigörs från organiskt material i marken vilket gör att halterna ofta är lägre på mullfattiga jordar. Jordar nära västkusten har ofta förhöjda borhalter eftersom bor tillförs från havet med västliga vindar (Eriksson m.fl., 1997).

Mängden växttillgängligt bor påverkas i högre grad än andra ämnen av markfukt. Torka leder till en försämrad transport av bor till rotzonen. Det leder också till en minskad mineralisering av organiskt material vilket ger mindre frigjort och löst bor i markvätskan. Eftersom rottillväxten också kan hämmas vid lågt borupptag kan det göra att situationen blir ännu värre. Tillgängligheten av bor påverkas också av pH-värdet där både jordar med högt och lågt pH-värde kan ge försämrad tillgänglighet för grödan. Optimalt pH-intervall är 6,0–7,5 (Wong m.fl., 2005; Bell, 1997). Över pH 7,5 minskar tillgängligheten snabbt om pH-värdet stiger ännu mer. Också kalkning kan leda till försämrat borupptag eftersom bor kan reagera med kalken och bli otillgängligt för grödan.

### 7.4.2 Riskvärdering för brist och bristsymtom

Det går att analysera mängden bor i jorden genom en jordanalys med extraktion med varmvatten. Men eftersom det i försök har varit svårt att koppla tidigare riktvärden till respons på skörd är det oklart vilka värden som visar på brist. Därför anses analysen ha ett begränsat värde. Det finns inte heller något gränsvärde som indikerar risk för brist. Trots det vet vi att risken för borbrist påverkas av jordart, pH och vattenhalt. Högre halter krävs på lerjordar jämfört med lätta jordar men även vid torra förhållanden. På alkaliska jordar (pH > 7,5–8) krävs också ett högre bortal för att inte känsliga grödor ska få borbrist (Keren, 1996).

Borbrist orsakar skador på grödans tillväxtzoner. Det gör att bristsymtom ofta uppträder i bladkanter och i toppen på skott. Bladen hos oljeväxter och sockerbeter gulnar ofta i kanterna och kan bli deformerade med inrullade bladkanter eller skålformiga blad. Hos sockerbeter svartnar tillväxtpunkten och vid allvarlig brist sprider sig det ner till rotknölen som blir svartfärgad, så kallad hjärtröta. Borbrist påverkar också blomningen negativt vilket kan ge dålig eller ojämn frösättning i oljeväxter och klöverfrö. Eftersom blommorna är extra känsliga kan frösättningen påverkas negativt även om bristen inte syns på övriga delar av plantan.

### 7.4.3 Behov och gödsling

Till borkrävande grödor som sockerbetor, klöverfrö och oljeväxter kan du med fördel gödsla med mineralgödsel som innehåller bor vid behov. Du kan även tillföra bor genom bladgödsling. Bladgödsling ger snabb effekt men kan behöva upprepas vid flera tillfällen för att ge tillräckligt med bor till nytillväxt och till blommor. Du bör inte förrådsgödsla med bor eftersom det rör sig lätt i marken och lätt lakas ut.



**Bild 60.** Manganbrist i havre.  
**Foto:** Peder Waern

## 7.5 Mangan – tillgänglighet styrs av markens pH och syrehalt

### 7.5.1 Förekomst i marken och växtupptag

Förrådet av mangan i marken är alltid mycket stort. Det är istället den växttillgängliga fraktionen som avgör hur stort växtupptaget blir och därmed också risken för brist. Markens pH-värde och syrehalt är de två viktigaste faktorerna som reglerar mängden växttillgängligt mangan i marken. Risken för brist ökar med stigande pH och tillgängligheten minskar redan vid ett pH-värde över 6,5. Vid syrerika förhållanden i marken omvandlas mangan till svårtillgängliga former som inte kan tas upp av växten.

### 7.5.2 Riskvärdering för brist och bristsymtom

Det finns inga tillförlitliga jordanalyser för att bestämma den växttillgängliga fraktionen av mangan i marken. Istället får du bedöma situationen utifrån markens egenskaper, tidigare erfarenheter och väderförhållanden. Förhöjd risk för manganbrist uppkommer på lätta och mullrika jordar som ofta är luckra och syrerika, samt vid torka. Om du är osäker kan du ta en växtanalys för att bedöma grödans status, men eftersom förhållandena i marken ofta ändras snabbt kan det vara svårt att på detta sätt bedöma den långsiktiga effekten på grödan.

Manganbrist visar sig på olika sätt i olika grödor, men uppträder alltid på de yngre bladen. Hos spannmål syns gråaktiga fläckar på bladen, ofta med en brun kant och i rader mellan bladnerverna. Vete får ofta ljusare fläckar än havre och korn. Hos sockerbetor och oljeväxter uppträder manganbrist i form av gulnande prickar eller fläckar som ofta bildar ett mosaikliknande mönster. Området intill bladnerverna förblir ofta grönt. Symtomen kan likna de vid magnesiumbrist, men dessa symtom uppträder först på de äldsta bladen. På potatisplantor ses manganbrist som mörka prickar (nekroser) på bladen.

Ett tydligt kännetecken på manganbrist är också att grödan är grönare och friskare i körspåren på grund av mer syrefattiga förhållanden på dessa delar av fältet.

### 7.5.3 Behov och gödsling

Alla grödor kan drabbas av manganbrist men spannmål, sockerbetor och oljeväxter är känsligast.

Det effektivaste sättet att tillföra mangan är i form av bladgödsling. Markgödsling har sällan någon effekt eftersom det oftast är tillgängligheten som är problemet och det som tillförs marken snabbt blir otillgängligt för väx-

terna. Eftersom manganbrist på hösten kan leda till ökad risk för utvintring kan gödsling på hösten vara motiverat. Positiva effekter av detta har visats främst i höstkorn (Stoltz & Wallenhammar, 2012), men höstgödsling har också gett skördeökningar i höstraps (Gunnarson, 2015). I höstvetete är underlaget mycket begränsat och resultaten otydliga. De försök som har genomförts har inte visat på några signifikanta skördeökningar utom på enskilda platser (Finnfors, 2019). Det behövs fler försök på jordar där risken för manganbrist är stor för att kunna veta om och när mangantillförsel till höstvetete är motiverad.

Du kan även använda surgörande gödselmedel, till exempel ammoniumkväve som sänker pH-värdet i rotzonen eller välta efter sådd för att öka tillgängligheten av mangan och därmed minska risken för brist.

Tillfälliga, övergående manganbrister uppkommer relativt ofta på våren på många jordar. Då kan tillgången på mangan variera snabbt och ofta försvinner bristen av sig själv efter nederbörd. Försök har visat att mangangödsling i dessa fall har svag eller ingen effekt på skörden och det är därför inte motiverat att gödsla. Om du har svårt att avgöra hur långvarig bristen blir så får du använda dig av tidigare erfarenheter för din jord.

Tänk på att du kan behöva upprepa mangangödslingen flera gånger vid kraftig eller långvarig brist. Detta för att säkerställa att mängderna blir tillräckligt stora och att nytillväxten får sitt behov tillgodosett. På jordar där du vet att brist kan uppstå kan du också prova att beta fröet med mangan och kombinera med bladgödsling.

## 7.6 Koppar – förrådet i jorden ökar med stigande lerhalt

### 7.6.1 Förekomst i marken och växtupptag

Liksom för övriga mikronäringsämnen är förrådet av koppar ofta relativt stort i förhållande till grödans årliga behov, men här kan ändå mängden koppar i marken påverka upptaget. Mängden koppar stiger generellt med ökad lerhalt. Kopparbrist uppstår på jordar där förrådet av koppar i marken är litet. Tillgängligheten minskar till viss del vid höga pH-värden, men effekten är inte alls lika tydlig som för exempelvis mangan. Låga koppartal i mark och gröda är vanligare i södra och västra Sverige än i Mälardalen och i östra Götaland. Kopparbrist har under lång tid uppmärksammats på framför allt mulljordar i sydvästra Sverige (Carlgren, 2003).

### 7.6.2 Riskvärdering för brist och bristsymtom

Traditionellt analyseras koppar i marken genom en stark extraktion med saltsyra (Cu-HCl) vilket ger en bedömning av markförrådets storlek. Halter under 6–7 mg koppar per kg jord anses ge förhöjd risk för kopparbrist enligt äldre studier (Stenberg m.fl., 1949; Lundblad & Johansson, 1956). Även om det finns en viss koppling mellan förrådet av koppar i marken och grödans upptag så ger denna analys endast en indikation på risken för brist. Att enbart titta på jordarten ger också relativt mycket information. Lätta, sandiga jordar samt jordar med hög mullhalt ökar risken för brist. Koppar binds lätt till det organiska materialet och blir därmed svårtillgängligt för grödan.



**Bild 61.** Kopparbrist i havre.  
**Foto:** Karl-Arne Hedene

Om du är osäker på om du har problem med kopparbrist kan du också ta en växtanalys under säsongen för att bedöma hur mycket koppar grödan innehåller. Det tydligaste tecknet på kopparbrist i spannmål är att bladspetsarna på grödans unga blad gulnar, så kallad gulspetsjuka. Plantorna kan också få onormalt många sidoskott vilket ger ett ”buskigt” intryck.

### 7.6.3 Behov och gödsling

Spannmål är bland de grödor som är känsligast för kopparbrist, där vete och havre och till viss del även korn är känsligare än råg. Ofta drabbas den vårsådda spannmålen värre eftersom rotsystemet inte är lika välutvecklat som hos höstgrödorna. Med ett mindre rotsystem minskar också förmågan att ta upp koppar ur marken.

På jordar med ett litet förråd av koppar, ofta sandiga jordar, kan du förråds-gödsla marken med koppar. På mullrika jordar är en markgödsling däremot ineffektiv eftersom tillgängligheten ofta är problemet och koppar som tillförs binds fast i marken. Därför är det bättre att bladgödsla på dessa jordar. Även vid akut brist är det bättre att bladgödsla eftersom det verkar snabbare än markgödsling.

## 7.7 Övriga mikronäringsämnen och samspel mellan ämnen

Låga halter av zink har uppmärksammats i en del försök på flera platser i landet, men anses inte vara ett utbrett problem. Järnbrist kan uppträda på alkaliska jordar med pH-värden över 7,5 och under torra förhållanden, men brister anses vara ovanliga.

Ibland uppstår obalanser i grödan vilket kan leda till indirekta brister även om halten i marken egentligen är tillräcklig. Det finns många olika positiva och negativa samspel mellan ämnen. Som exempel kan vi nämna att hög fosforgödsling kan öka risken för zinkbrist.

Ibland blir obalansen ett problem först i nästa steg när grödan till exempel används som foder. Här kan balansen mellan molybden och koppar nämnas där höga molybdenhalter kan leda till kopparbrist hos idisslare. Detta problem har uppmärksammats bland annat i delar av Västergötland och västra Östergötland till följd av naturligt höga molybdenhalter i jordarnas modermaterial. I en artikel av Axelson m.fl. (2018) finns en karta med riskområden utritade. Ligger din gård i ett område med risk för höga molybdenhalter rekommenderar vi att du gör en analys av molybden och koppar i ditt foder.

# 8 Kalkning

## 8.1 Kalka för att bibehålla eller höja pH-värdet

Kalktillståndet i marken uttrycks oftast som pH-värde och ger ett mått på koncentrationen vätejoner i marken. Kalkning av åkermark hjälper till att bibehålla eller höja markens pH-värde. Ett lämpligt pH-värde i marken gör flera växtnäringsämnen mer tillgängliga för växterna. Kalkningen tillför också kalciumjoner, vilket är positivt för vissa grödor vid låga kalciumtal i marken (Ca-AL) (Mattsson, 2010b). Vilket pH-värde som är optimalt beror på jordarten och på vilka grödor du odlar. Du kan också strukturkalka lerjordar för att förbättra markstrukturen och minska fosforförlusterna, men då är det viktigt att använda särskild strukturkalk (se [kapitel 8.7](#)).

## 8.2 Flera processer påverkar markens pH-värde

Åkermark som inte kalkas regelbundet försuras på sikt. Det beror på grödornas upptag och bortförsl av växtnäringsämnen, markandning (rotandning och nedbrytning av organiskt material), utlakning, nedfall av kväve- och svaveloxider och användning av surgörande kvävegödselmedel (Ericsson & Bertilsson, 1982).

De grödor du odlar och gödselmedel du använder påverkar markens pH-värde. Baljväxtvallar har en starkt försurande effekt på grund av att de tar upp och för bort mer baskatjoner såsom kalium, kalcium och magnesium än övriga grödor. Används grödan som foder och resterna förs tillbaka till jorden i form av stallgödsel blir den försurande effekten mindre. Odling av spannmål har endast en svagt försurande effekt om halmen återförs. Det är främst bortförsl av halm som försurar marken (Persson, 2003).

Kvävegödsling med gödselmedel som innehåller nitratkväve ( $\text{NO}_3^-$ ) har en kalkverkan medan ammoniumkväve ( $\text{NH}_4^+$ ) har en försurande verkan i marken. Det går att räkna ut en teoretisk kalkverkan. Kalksalpeter som nästan enbart innehåller nitratkväve har en kalkverkan. Ren ammoniumnitrat ( $\text{N}_{32}$ ,  $\text{N}_{34}$ ), olika NPK-gödselmedel, ammoniumsulfat (NS 21–24) och urea har en försurande effekt, se [tabell 41](#) (KTBL, 2005).

Organiska gödselmedel påverkar pH i marken genom flera olika processer. Stallgödsels överskott av positiva joner ger en viss kalkverkan i marken. Om stallgödselspridningen leder till kväveutlakning har den processen däremot en försurande verkan (Persson, 2003; Ericsson & Bertilsson, 1982).





**Bild 62.** Kalkning motverkar försurning och höjer jordens pH. **Foto:** Jens Blomquist

**Tabell 41.** Försurande verkan eller kalkverkan av olika kväveformer (KTBL, 2005; \*\*Gruvæus, personligt meddelande, 2022).

	Försurande verkan (kg CaO/kg N)	Kalkverkan (kg CaO/kg N)
Ammoniumnitrat (N32, N34)	1	
Ammoniumsulfat (NS 21-24)	3	
CAN (N27)	0,5	
Kalksalpeter (N15,5)		0,85
Urea (N46)	1	
MAP* (NP12-23)	3,4	
NS 27-4 (Axan, Yara)**	0,9	

\* Inklusive kalkbehov för fosfor

### 8.3 Kalka för bättre odlingsegenskaper

Kalkning förbättrar oftast en jords odlingsegenskaper. Ett optimalt kalktillstånd underlättar jordbearbetning och rottillväxt på aggregatbildande jordar (lerjordar) samtidigt som bland annat fosfors tillgänglighet ökar. Grödans upptag av giftiga tungmetaller, till exempel kadmium, minskar (Kleja, m.fl., 2006). Kalkning minskar normalt också mängden utbytbar aluminium i marken, se vidare i [avsnitt 8.4](#).

Kirchmann m.fl. (Kirchmann m.fl., 2020) studerade sambandet mellan olika markparametrar och normskördar i 90 olika skördeområden med bland annat data från över 12 000 matjordsprover i Jordbruksverkets stora jordartskartering 2013 som grund. Författarna kunde bland annat se ett positivt samband mellan skördenivå och pH-värden upp till pH 6,9–7,2 som medeltal för spannmål respektive höstraps. För potatis såg man ett negativt samband om pH var högre än 6,7. Potatis kan till exempel drabbas av skorv vid brist på mangan som kan uppstå vid höga pH-värden. Resultaten visar inte ett orsakssamband, det vill säga att man säkert får högre skördar med högre pH-värden, utan andra odlingsfaktorer spelar också in.

I en annan artikel baserad på resultat från de långliggande kalk-/fosforförsöken som startade 1936 och 1941 på Lanna (Börjesson & Kirchmann, 2022) kunde författarna konstatera att de behandlingar som fått både kalk och fosfor gett högre skördar än de som fått enbart fosfor. Försöken visar ett positivt samband mellan kalkning och skörd upp till pH 7,5. Försöksplatserna har lerhalter kring 40 procent. På 1970-talet hade de kalkade försöksrutorna pH-värden kring 6,5 och de okalkade rutorna pH kring 6. Information om pH-värden då försöken startade har tyvärr gått förlorade.

Kalkningen påverkar också markens mikroflora så att jordbakterier gynnas på svamparnas bekostnad (Haak & Simàn, 1992). Många rotbrands-svampar, exempelvis algsvamparna dit bland annat *Aphanomyces* och *pythium* hör, missgynnas av ett högt pH och ett högt kalciuminnehåll. Dessa svampar angriper grödor såsom sockerbeter, rödbeter och ärter. För sockerbeter kan ett pH på minst 7 och ett kalciumtal (Ca-AL) på minst 250 mg per 100 gram jord minska uppförökningen och angreppen av de svamparna (Olsson m.fl., 2010).

Ibland konstateras svag eller till och med negativ skördeeffekt av kalkning. En orsak kan vara att ett högre pH-värde minskar tillgängligheten för vissa näringsämnen. Det gäller framför allt mangan och zink vars tillgänglighet gradvis försämras vid pH-värden över 6,5. För koppar minskar tillgängligheten till viss del vid höga pH-värden och för bor minskar tillgängligheten för pH över 7. Efter kalkning på jordar med låg halt av något av dessa näringsämnen kan det vara bra att göra en växtanalys och eventuellt gödsla om växtanalysen visar på brist. Läs mer om mikronäringsämnenas tillgänglighet i [kapitel 7](#).

## 8.4 Olika mål för pH-värdet för olika jordar och grödor

Med en grundkalkning kan du höja markens pH-värde till önskvärd nivå. Eftersom försurande processer ständigt pågår måste kalk även tillföras regelbundet. Det kallas underhållskalkning.

I [tabell 42](#) anger vi mål-pH för olika jordar. Riktvärdet för ett gott kalktillstånd på mineraljordar med mullhalt under 6 % är pH 6,5 på lerjordar och 6,0 på lätta jordar. Normalt bör du kalka om pH-värdet understiger mål-pH med 0,3–0,5 enheter.

Vid sockerbetsodling bör riktvärdet generellt ligga ungefär 0,5 pH-enheter högre än vid annan odling. I studier där svampsjukdomar studerats har man sett att för sockerbeter kan ett pH på minst 7 minska risken för rotbrands-svampar (läs mer i [kapitel 8.3](#)) (Olsson m.fl., 2010). Sockerbeter, oljevaxter

och lusern är särskilt beroende av att kalktillståndet är tillfredsställande. I äldre svenska kalkförsök (1983–1990) undersöktes kalkningens effekt på vanliga lantbruksgrödor (stråsäd, vall, raps, potatis, ärter, sockerbeter) på fastmarksjordar. När försöken startade låg pH mellan 5,0 och 6,1 och försöksleden kalkades som mest upp till pH mellan 6,1 och 6,8. Kalkens positiva skördeeffekt var högre hos vårsäd än hos höstsäd. Hos vårsäden var mer-skörden lägst för havre (Haak & Simån, 1992).

Mål-pH minskar med ökande mullhalt. På mulljordar riskerar kalkning att gynna mineralisering vilket leder till ökad bortodling (Eriksson m.fl., 2011). På mulljordar är tillgängligheten för de flesta näringsämnen optimal kring pH 5,5. pH-värdet kan behöva följas upp oftare än på mineraljordar eftersom effekten av kalkning varierar (Eastern Canada Soil and Water Conservation Centre, 1997). Även äldre försök på mulljordar indikerar att pH bör ligga kring 5,5 för bästa fosfortillgänglighet (Davis & Lucas, 1959).

På jordar med mullhalt över 12 % kan du analysera halten av utbytbart aluminium (Al-AS) för att få ytterligare vägledning om kalkningsbehovet. Fria aluminiumjoner är giftiga för växtrötterna. Halten utbytbart aluminium är dock inte alltid för hög trots ett lågt pH-värde. Om mängden utbytbart aluminium är mindre än 1,0 mg per 100 ml jord, vilket motsvarar cirka 20 kg Al-AS per hektar i matjordsskiktet, kan uppmätt pH vara lite lägre än riktvärdet innan du behöver kalka (Ståhlberg, 1982). Praktiska erfarenheter av Al-AS-metoden finns framför allt i Mellansverige.

Tabell 42. Mål-pH utifrån jordart och mullhalt.

Mullhalt (%)	Förkortning <sup>a)</sup>	Mål-pH utifrån jordart och lerhalt i %					
		Sand- & mojordar <5 %	Leriga jordar 5–15 %	Lättlera 15–25 %	Mellanlera 25–40 %	Styv lera 40–60 %	Mycket styv lera >60 %
<6	mf/ nmh/ mmh	6,0	6,2	6,3	6,4	6,5	6,5
6–12	mr	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2	6,2
12–20	mkt mr	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	5,9
20–40	minbl mullj	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,6

a) mf = mullfattig, nmh = något mullhaltig, mmh = måttligt mullhaltig, mr = mullrik, mkt mr = mycket mullrik, minbl mullj = mineralblandad mulljord

#### 8.4.1 Ta jordprover vid samma tid på året

Vid markkartering rekommenderar vi att du gör återkommande provtagning på samma plats i växtföljden och vid samma årstid under liknande fuktförhållanden i marken och ungefär lika lång tid efter senaste stora gödselgivan. Tänk på att ta återkommande jordprov för pH-bestämning vid samma tidpunkt på året då värdet kan variera under året. Under odlingsäsongen minskar pH något på grund av bland annat kvävegödsling och rötternas aktivitet medan pH ökar något under vintern. Är odlingsäsongen torr kan skillnaden i pH mellan höst och vår vara extra tydlig då uppblötningen av jorden ger en kalkeffekt (Murdock & Call, 2006). Se vidare om vikten av likvärdiga förhållanden vid återkommande markkartering i [kapitel 1.1.3](#).

### Mätmetoden skiljer mellan länder

Tänk på att pH-värden inte är direkt jämförbara mellan länder. I Sverige används destillerat vatten när pH bestäms medan mätning i en lösning av kalciumklorid ( $\text{CaCl}_2$ ) är vanligt i många andra länder, exempelvis Danmark. Genom att addera 0,5 enheter till ett pH-värde mätt i kalciumklorid kan man ungefärligen uppskatta vilket pH det motsvarar enligt den svenska metoden. Observera dock att skillnaden är lägre än 0,5 enheter vid pH över 7.

En genomgång av kalkningsrekommendationer i några närliggande länder visar att alla länder använder sig av mullhalt och lerhalt i sina kalkningsrekommendationer. De flesta länder har också kalkningsråd kopplade till växtföljden eller grödan (Wigfeldt, 2022).

## 8.5 Effekten beror på kalkens ursprung och egenskaper

För att kunna karaktärisera en kalkprodukt måste man ta hänsyn till dess geologiska ursprung, hårdhet och finfördelningsgrad. Generellt gäller att det krävs en högre kalkgiva för att uppnå samma effekt om du använder grövre och hårdare produkter jämfört med mjölformiga produkter (Mattsson, 2010a).

Om du använder kalkstensmjöl kan du räkna med full effekt året efter kalkning. För krossad kalksten kan förstaårseffekten vara ungefär hälften så stor. På sikt kommer du att få ungefär lika stor effekt av de båda produkttyperna, men vanligen har du inte nått full effekt av den krossade produkten ens efter fem år.

### 8.5.1 CaO-värdet anger syraneutraliserande förmåga

Olika kalkningsmedels syraneutraliserande förmåga uttrycks som CaO-värde, i procent. Kalkstensmjöl har ett CaO-värde på cirka 50 %. Den syraneutraliserande förmågan beror också på produktens löslighet i vatten. Kalkstensmjöl har låg löslighet medan bränd och släckt kalk har hög löslighet.

CaO-värdet ska inte förväxlas med kalkens kemiska sammansättning där kalkstensmjöl består av kalciumkarbonat ( $\text{CaCO}_3$ ), släckt kalk består av kalciumhydroxid ( $\text{Ca(OH)}_2$ ), dolomit av kalciummagnesiumkarbonat  $\text{CaMg(CO}_3)_2$  och bränd kalk av kalciumoxid ( $\text{CaO}$ ).

Finns ett magnesiumbehov samtidigt som fältet också behöver kalkas är kalkning med dolomitkalk det billigaste alternativet. Läs mer om magnesiumgödsling i [kapitel 7.2](#).

På marknaden finns ett stort antal kalkningsmedel. Produkterna kan delas in i olika grupper enligt EUstandard EN 14069:2017. De viktigaste redovisas nedan.

<b>Produkter med naturligt ursprung</b>	<b>Syraneutraliserande förmåga (CaO-värde)</b>
Kalksten (CaCO <sub>3</sub> )	minimum 45 %
Dolomit (CaMg(CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> )	minimum 48 %
Bränd kalk (CaO)	minimum 85 %
Släckt kalk (Ca(OH) <sub>2</sub> )	minimum 65 %
<b>Biprodukter från industriella processer</b>	
Silikatkalker – masugnsslagg	minimum 42 %
Sockerbrukskalk	minimum 37 %
Mesakalk från pappersmassaframställning	cirka 51 %
Angivna CaO-värden avser torr vara.	

## 8.5.2 Kalkvärde enligt Erstad anger tillgängligheten

För att lättare kunna värdera och jämföra olika kalkprodukter och beräkna hur mycket du behöver av respektive produkt har kalkvärden enligt Erstad tagits fram för olika kalkprodukter (Erstad & Linke, 1999). Kalkvärdet tar hänsyn till produktens CaO-innehåll, geologiska ursprung och kornstorleksfördelning och anges för både ett och fem år. Kalkvärdet för ett år avser den kalkverkan i procent CaO som förväntas ha snabb tillgänglighet. Kalkvärdet för fem år är den kalkverkan som är tillgänglig under lång tid. Om du inte har behov av en snabb pH-höjning bör du i första hand jämföra femårsvärdena. Arbetet har gjorts i samarbete mellan SLU och Svenska Kalkföreningen.

Företag som säljer kalk anger vanligen kalkvärdet för sina produkter. Kalkvärden på kort sikt (ett år) ligger inom intervallet 26–54 % och på längre sikt (fem år) mellan 36 % och 54 % för de flesta kommersiella produkter.

## 8.6 Olika kalkmängd krävs på olika jordar

### 8.6.1 Anpassa kalkmängden efter lerhalt och mullhalt

Hur mycket kalk som behöver tillföras en jord för att åstadkomma en viss pH-höjning kan uppskattas utifrån lerhalt och mullhalt. I [tabell 43](#) anges den mängd CaO per hektar i form av kalkstensmjöl som behöver tillföras en jord för att höja pH-värdet 0,5 enheter utifrån dess innehåll av ler och mull. Eftersom kalkstensmjöl har en kalkverkan om cirka 50 % CaO innebär 2 ton CaO per hektar i tabellen att man ska tillföra 4 ton kalkstensmjöl per hektar.

Trots att tabellen är grundad på ett stort antal kalkningsförsök (Haak & Simán, 1992) kan det vara svårt att exakt förutsäga hur mycket pH kommer att höjas av en viss kalkgiva i det enskilda fallet. Vid odling av grödor som har en stor försurande verkan kan mer kalk behöva tillföras för att nå önskat pH. I [tabell 43](#) finns bara uppgifter för jordar med upp till 20 % mull eftersom försöksunderlaget för mineralblandade mulljordar och mulljordar är begränsat.



Vid mullhalter över 20 % kan du uppskatta kalkbehovet med hjälp av uppgifterna för jordar med 12–20 % mullhalt.

Om kalkbehovet är stort är det bättre att kalka stegvis och göra upprepade jordanalyser. Efter att du kalkat första gången bör du upprepa jordprovtagningen och vid behov kalka ytterligare en gång. Om den första kalkningen inte ger märkbar förbättring av kalktillståndet bör du fundera på att anpassa odlingen.

**Tabell 43.** Kalkbehov för att höja pH-värdet med cirka 0,5 enheter inom pH-intervallet 5,0–6,5 (Gustafsson, 1999 & Gustavsson, 1999). Eftersom kalkstensmjöl har en kalkverkan motsvarande cirka 50 % CaO innebär till exempel 2 ton CaO per hektar i tabellen att man ska tillföra 4 ton kalkstensmjöl per hektar.

Mullhalt (%)	Förkortning <sup>a)</sup>	Kalkbehov (ton CaO/ha) utifrån jordart och mullhalt i %					
		Sand- & mojordar <5 %	Leriga jordar 5–15 %	Lättlera 15–25 %	Mellanlera 25–40 %	Styv lera 40–60 %	Mycket styv lera >60 %
<2	mf	0,5	1	2	3	4	5
2–3	nmh	1	1,5	2,5	3,5	4,5	5
3–6	mmh	1,5	2	3	4	5	5,5
6–12	mr	2,5	3	4	5	6	7
12–20	mkt mr	4	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5

a) mf = mullfattig, nmh = något mullhaltig, mmh = måttligt mullhaltig, mr = mullrik, mkt mr = mycket mullrik

## Flera sätt att bestämma lerhalt

Det finns flera sätt att bestämma lerhalten. Bestämning av lerhalt tar inte hänsyn till vilka mineraler som ingår. Vätsiktning och sedimentationsanalys är en relativt dyr metod, men den ger ett säkert värde. Har du en gång gjort en lerhaltsanalys eller komplett jordartsbestämning behöver du inte göra om den.

Det finns även indirekta metoder. På [markdata.se](http://markdata.se) finns det en digital lerhaltskarta där du kan se lerhalter för svensk åkermark upp till norra Hälsingland med en upplösning på 50×50 meter. Det finns även möjlighet att bestämma jordens lerhalt med hjälp av olika sensorer, till exempel EM38 och den så kallade "Mullvaden". Du kan även bestämma lerhalten indirekt genom att utgå från K-HCl, dvs. markens förråd av kalium. Sambandet mellan lerhalt och K-HCl varierar dock mellan olika jordar. Enligt Fredriksson & Haak (1995) är kvoten mellan K-HCl-talet och lerhalten cirka 10 i norra och östra Sverige, 8 i Västsverige samt 6 i södra delen av landet. Att beräkna kalkbehovet utifrån K-HCl-analysen innebär alltså en viss osäkerhet.

### 8.6.2 Variera kalkgivan inom fältet

Du kan också variera kalkmängden efter behov inom fältet. Om du har markkarterat med GPS-bestämda provplatser går det att ta fram en styrfil utifrån uppgifter om lerhalt, mullhalt, pH, kalcium- och magnesiuminnehåll. Dessutom går det att ta hänsyn till gårdens odlingsinriktning och växtföljd. Om du kalkar efter en sådan styrfil kommer kalken att spridas där den bäst behövs. Det ger ett bättre ekonomiskt utbyte samtidigt som fältet blir jämnare och därmed lättare att odla.

På den interaktiva åkermarkskartan på [markdata.se](http://markdata.se) kan du även göra styrfiler för kalkning av dina fält efter lerhalt och pH. Däremot finns inte möjlighet att ta hänsyn till exempelvis gytjtjeleror eller magnesiumbehov i denna tjänst.

## 8.7 Strukturalk förbättrar lerjordens struktur

Att strukturalka är ett sätt att bland annat förbättra och stabilisera jordens aggregat på lerjordar. En ökad aggregatstabilitet innebär att leraggregaten håller ihop bättre om de utsätts för blöta förhållanden. På det sättet kan fosforförlusterna från fältet minska. En god markstruktur förbättrar också jordens närings- och vattenhållande förmåga och gör att den blir mer lättbearbetad och torkar upp snabbare. Strukturalk höjer som andra kalkslag också pH-värdet i jorden. I fältförsök har skördenivån ökat eller minskat med upp till 10 % efter strukturalkning.

### 8.7.1 Strukturalka bara lerjordar



**Bild 63.** Bruka ner strukturalken snabbt och noggrant i samband med spridningen. Ett fint bruk ger stor kontaktyta mellan kalk och leraggregat vilket skapar förutsättningar för bästa möjliga effekt.

**Foto:** Jens Blomquist

Strukturalkning fungerar bara på lerjordar. För att få bra effekt bör du endast strukturalka mark med god bärighet och köra under perioder när det är möjligt att bruka ner kalken på ett tillfredställande sätt. Ett fint bruk vid tidig nedbrukning i augusti har i fältförsök gett stabilare aggregat jämfört med nedbrukning i september när bruket var grövre (Blomquist & Berglund, 2021). Om fältet är dåligt dränerat eller huvudavvattningen inte fungerar tillfredsställande är det därför viktigt att åtgärda dessa problem först innan du sätter i gång att strukturalka.

Strukturalkning ska alltså göras vid bra väderlek, låg markfuktighet och hög marktemperatur för att få önskad effekt. Strukturalka vid ett tillfälle i växtföljden då jorden redan har en så god struktur som möjligt, till exempel i augusti efter en tidigt skördad gröda, exempelvis höstraps eller vid vallbrott. Snabb och noggrann inblandning i jorden är också viktigt för att få en bra effekt. Du bör köra minst två gånger, vid behov fler, med kultivator i olika riktningar så att kalken blandas in i jorden på ett bra sätt. Det finns däremot inget skäl att bruka in strukturalken fler gånger än nödvändigt om statusen på jorden redan är bra efter de första överfarterna. Bearbeta till samma djup som du normalt bearbetar jorden. En regnig höst med dåliga förhållanden är det bättre att skjuta på strukturalkningen till nästa år. Erfarenheter från fältförsök visar att de positiva effekter som kan förväntas av strukturalkning kan överskuggas av en nedbrukning som sker under felaktiga omständigheter. Nedbrukning av strukturalk kräver samma goda omdöme och hantverksskicklighet som all annan jordbearbetning.

I försök med stigande givor av strukturalk (blandprodukt av 80–85 % kalksten och 15–20 % släckt kalk) gav strukturalkningen även en betydande pH-effekt, när pH undersöktes cirka ett år efter spridningen. En giva på 7–8 ton strukturalk per hektar gav upphov till en ökning med cirka 0,4 pH-enheter i fält med lågt pH vid start (<6,4) och även i fält med pH 6,5–7,7. Däremot gick det inte att visa någon statistisk säkerställd höjning på försöksplatser med högt pH (>7,7) redan vid start. Resultaten kommer från 48 fältförsök i Skåne, Östergötland och Mälar- och Hjälmregionen (Blomquist, 2021).

Du kan strukturalka även om det inte finns behov att höja pH, men effekten på aggregatstabiliteten blir lägre vid stigande pH. Det finns vid redan höga pH-värden också en risk att vissa växtnäringsämnen, till exempel mangan, kan bli mindre tillgängliga direkt efter strukturalkning på grund av att pH i marken höjs (Blomquist m.fl., 2022a).

### 8.7.2 Anpassa givan efter förhållandena på fältet

Det saknas tillräckligt med försöksunderlag för att bestämma exakt vilken kalkgiva som är optimal med hänsyn till lerhalt, pH och strukturkalkningens samtliga effekter.

En första svensk utvärdering av hur några av markens egenskaper påverkar effekten av strukturkalk visade att effekten på aggregatstabilitet varierade stort mellan olika jordar, och att effekten ökade med stigande lerhalt och minskande pH-värde (Blomquist m.fl., 2022b). En mätning av aggregatstabilitet som gjordes 2020 visade att i bara ett av åtta fältförsök fanns en statistiskt säker effekt kvar sex år efter strukturkalkning. Jorden i detta fältförsök karaktäriserades av relativt hög lerhalt och lågt pH-värde. En preliminär rekommendation är tills vidare därför att prioritera jordar med lerhalter över ca 25 % och pH-värden under 7 (Blomquist m.fl., 2022c).

Ur praktisk och ekonomisk synvinkel bedöms en rimlig giva vara cirka 5–9 ton produkt per hektar. Den lägre givan gäller lerjordar med lite lägre lerhalt medan den högre givan passar på styvare jordar med högre lerhalt och sämre struktur. Vid riktigt höga lerhalter och på delar av fältet där markstrukturen är särskilt dålig kan du behöva öka mängden ytterligare.

Precis som vid gödsling finns det möjlighet att variera kalkmängden inom fältet vid strukturkalkning. När man gör en styrfil för strukturkalkning används uppgifter från markkartering och digital lerhaltskarta, men även information från brukaren. Du kan göra en styrfil för strukturkalkning utifrån lerhalt på [markdata.se](https://markdata.se), men observera att kartorna inte visar vilka lerjordar som har ett gyttjeinslag. Dessa jordar har i allmänhet redan en god markstruktur och behöver inte strukturkalkas. Om man vill höja pH kan det billigare kalkstensmjölet väljas. Även pH-värdet i jorden avgör vilken effekt på aggregatstabiliteten som man kan uppnå med en strukturkalkning. Att variera givan efter både pH-värde och lerhalt, där låg lerhalt och högt pH minskar givan, är därför en möjlighet att öka kostnadseffektiviteten i strukturkalkning.

### 8.7.3 Använd rätt sorts kalk

Den gängse uppfattningen är att du, för att få önskad effekt av strukturkalkningen, måste använda kalk som innehåller så kallad fri kalk (kallas ibland aktiv CaO av branschen). Bränd och släckt kalk (CaO respektive Ca(OH)<sub>2</sub>) innehåller stor andel fri kalk. Vanlig jordbrukskalk består till största delen av kalciumkarbonat (CaCO<sub>3</sub>) och har normalt svagare struktureffekt. De senaste resultaten från fältförsök i Skåne visade dock att kalkstensmjöl kan ha samma aggregatstabiliserande effekt som strukturkalk (Gunnarsson m.fl., 2022). Mer kunskap behövs i frågan och resultaten behöver verifieras. Därför etablerades nya fältförsök hösten 2022. De produkter som i dag marknadsförs som strukturkalk är blandprodukter som innehåller en viss andel bränd eller släckt kalk och resten kalkstensmjöl. Ren bränd eller släckt kalk används inte eftersom sådana produkter är dyra samtidigt som de medför stora risker när det gäller arbetsmiljö och hantering.

## 9 Referenser

- Aasen, I. 1997. Mangelsjukdomar og andre ernæringsforstyrrelser hos kulturplanter (andre utgåva) Landbruksforlaget, Norge.
- Andersson, P.G. 2015. Slamspridning på åkermark. Hushållningssällskapens rapportserie nr 17.
- Andrist Rangel, Y. 2008. Quantifying mineral sources of potassium in agricultural soils. Doctoral Thesis Swedish University of Agricultural Sciences Uppsala. Acta Universitatis Agriculturae Sueciae 2008:53.
- Aronsson, H., Ernfors, M., Kätterer, T., Bolinder, M., Svensson, SE., Hansson, D., Prade, T., Bergkvist, G. 2023. Mellangrödor i växtföljden – för kolinlagring och effektivt kväveutnyttjande. Uppsala: Sveriges lantbruksuniversitet. (Ekohydrologi, 179).
- Aronsson, H., Bergkvist G., Stenberg, M. & Wallenhammar, AC. 2012. Gröda mellan grödorna – samlad kunskap om fånggrödor. Jordbruksverket Rapport 2012:21.
- Aronsson, P. & Rosenkvist, H. 2011. Gödslingsrekommendationer för Salix 2011. Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet.
- Axelsson, U., Jonsson, A. & Söderström, M. 2018. Risk assessment of high concentrations of molybdenum (Mo) in forage. Environmental Geochemistry and Health 40: 2685–2694.
- Bell, R.W. 1997. Diagnosis and prediction of boron deficiency for plant production. Plant Soil 193:149–168.
- Berglund, K. & Blomquist, J. 2015. Strukturkalkning – bra för både mark och miljö. Praktiska råd Nr 23, Greppa Näringen.
- Bergström, L., Linder J. & Andersson R. 2008. Fosfor förluster från jordbruksmark – vad kan vi göra för att minska problemet? Jordbruksinformation 27 – 2008, Jordbruksverket.
- Bertilsson, G., Rosenqvist, H. & Mattsson, L. 2005. Fosforgödsling och odlingsekonomi med perspektiv på miljömål. Naturvårdsverkets rapport nr 5518.
- Blomquist, J. 2021. Effects of structure liming on clay soil. Swedish University of Agricultural Sciences. Department of Soil and Environment. Doctoral thesis 86. Uppsala.
- Blomquist, J. & Berglund, K. 2019. Högre utväxling av strukturkalk vid lägre pH. Arvensis, nr 8.
- Blomquist, J. & Berglund, K. 2021. Timing and conditions modify the effect of structure liming on clay soil. Agricultural and Food Science 30:96–107.
- Blomquist, J., Berglund, K. & Olsson Nyström, Å. 2022a. Sockerbetor gynnas av kalkning – men lagom är bäst. Betodlaren nr 3.
- Blomquist, J., Englund, J-E. & Berglund, K. 2022b. Soil characteristics and tillage can predict the effect of structure liming on soil aggregate stability. Soil Research 60:373–384.
- Blomquist, J., Englund, J-E. & Berglund, K. 2022c. Site characteristics determine the duration of structure liming effects on clay soil. Agricultural and Food Science 31:136–148.
- Braun, S. 2020. Long-term phosphorus supply in agricultural soils. Size and dynamics of fast- and slow-desorbing phosphorus pools. Doctoral Thesis No 2020:57, Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala.
- Börjesson, G. & Kirchmann, H. 2022. Interactive long-term effects of liming and P application on clay soil: crop yield increases up to pH 7.5(aq). Plant Soil 473:407–421.
- Börjesson, G., Nätterlund, H., Kätterer, T. & Kirchmann, H. 2015. Interaktioner mellan P- och N-gödsling. SLF projekt H1233102, slutrapport 29 oktober 2015. Stiftelsen Lantbruksforskning, Stockholm.
- Börling, K. 2017. Fånga fosfor med en fosfordamm. Praktiska råd nr 25, 2017, Greppa Näringen.
- Börling, K., Barberis, E. & Otabbong, E. 2004. Impact of long-term inorganic phosphorus fertilization on accumulation, sorption and release of phosphorus in five Swedish soil profiles. Nutrient Cycling in Agroecosystems 69:11–21.
- Carlgrén, K. 2003. Fältförsök med koppargödsling. Institutionen för markvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för växtnärlära. Rapport nr 203.
- Davis, J.F. & Lucas, R.E. 1959. Organic Soils, their formation, distribution, utilization and management. Michigan State University, East Lansing, Michigan. Department of Soil Sciences, Agricultural Experiment Station, Special Bulletin 425.

- Delin, S. & Engström, L. 2021. Att sprida organiska gödselmedel. Jordbruksinformation 2 – 2021. Jordbruksverket, Jönköping.  
<https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/jo212.html>.
- Delin, S., Nyberg, A. & Sarajodin, J. 2014. Fosfor-gödslingsseffekt av olika restprodukter. Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 13.
- Delin, S., Stenberg, B., Nyberg, A. & Brohede, L. 2010. Potentiella mätmetoder för att uppskatta kvävegödslingsvärdet hos organiska gödselmedel. Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 6.
- Delin, S. & Stenberg, M. 2012. Nitratutlakning beroende på kvävegödslingsnivå och skörderespons i havre på en lätt jord. Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 10.
- DLG. 2006a. Stallungstreuer. Samson SP 12. 2016 S. Prüfbericht 4963.
- DLG. 2006b. Universal- und Industriestrewagen. BergMann Tsw 2016 S. Prüfbericht 4968.
- Durling, M (red.), Sandberg C., Danielsson D-A., Bölenius E., Frostgård G., Lindgren H., Malgeryd J., Bollmark L., Bång M., & Kvarmo, P. 2023. Ta vara på kvävet! – God jordbrukarsed för att begränsa ammoniakförluster. Jordbruksinformation 16 – 2023. Jordbruksverket.
- Ekelöf, J. 2016a. Tema växtnäring till sockerbetor. Del 1 – Fosfor. Betodlaren, nr 2.
- Ekelöf, J. 2016b. Tema växtnäring till sockerbetor. Del 2 – Kalium. Betodlaren, nr 3
- Ekelöf, J. 2019. Kalium og natrium giver mere sukker. Nordic Beet research. Annual Report nr 340, 2019.
- Ekelöf, J. 2020. Høj din sockerhalt med intensivare PK-gödsling. Betodlaren, nr 2.
- Engström, L. 2015. Uppdatering av rekommendationer för kvävegödsling till höstraps. Jordbruksverket, Intern rapport.
- Engström, L. 2017. Bättre utnyttjande av skördepotentialen i vårraps. Slutrapport SLF H1333148.
- Ericsson, J. & Bertilsson, G. 1982. Regionala behov av underhållskalkning. Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 144.
- Eriksson, J., Andersson, A. & Andersson, R. 1997. Tillståndet i svensk åkermark. Naturvårdsverket, Rapport nr 4778.
- Eriksson, J., Dahlin, S., Nilsson, I. & Simonsson, M. 2011. Marklära. Sveriges lantbruksuniversitet.
- Erstad, K.J. & Linke, J. 1999. Reactivity by soil incubation and ENV 1 year of new dolomitic and calcitic products from northern Europe. Rådgivande Agonomar Rapport 4/99. Korssund, Norge.
- Finnfors, D. 2019. Winterfitness i höstvetete L3–1034. Försöksrapport Sverigeförsöken.
- Fogelfors, H. 2001. Växtproduktion i jordbruket. Natur och Kultur/LTs förlag.
- Frankow-Lindberg, B. 2017. Uppdatering av kvävegödslingsrekommendationer för vall. Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 24.
- Frankow-Lindberg, B. & Jansson J. 2014. Avkastning, kvalitet, uthållighet och ekonomi hos intensivt skördade vallar (R6-5010). Slutrapport för projekt V1060007 (SLF). Institutionen för växtproduktionsekologi, Sveriges lantbruksuniversitet, Hushållningssällskapet Sjuhärad.
- Fredriksson, L. & Haak, E. 1995. Svenska åkermarksprofiler. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens Tidskrift nr 13.
- Gruvaeus, I. 1989. Kalium till slåttervall. SJFD Meddelande nr 34
- Gruvaeus, I. 1997. Placement of P. Results from Swedish trials in spring barley. Kungliga Skogs- & Lantbruksakademiens Tidskrift 137:89–91.
- Gruvaeus, I. 2005a. Gödsling med S, P, K och N till ärtor. Mellansvenska försöksrapporten.
- Gruvaeus, I. 2005b. Kväve och fosfor på hösten till höstvetete. Mellansvenska försöksrapporten.
- Gruvaeus, I. 2007. NPKS till vårkorn med stigande fosforgiva. Mellansvenska försöksrapporten.
- Gruvaeus I., 2018. Utnyttja skördepotentialen med YaraMila. Växtpressen nr 1, 2018:6–8.
- Gunnarson, A. 2014. Gödslingsförsöki höst och vårraps. Mellansvenska försöksrapporten.
- Gunnarson, A. 2015. Mikronäring till höstraps. Mellansvenska försöksrapporten.



- Gunnarsson, A., Blomquist, J., Persson, L., Olsson, Å., Hamnér, K. & Berglund, K. 2022. Liming alkaline clay soils: effects on soil structure, nutrients, barley growth and yield. *Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil & Plant Science*, 72:803–817. <https://doi.org/10.1080/09064710.2022.2089590>.
- Gunnarsson, A. & Nilsson, B. 2010. Kvävestrategier till höstraps. Mellansvenska försöksrapporten.
- Gustafsson, K. 1999. Models for precision application of lime. 2nd European Conference on Precision Agriculture, Odense, Danmark.
- Gustavsson, A-M. 1989. Kvävegödslings och klöverns betydelse i vallen. Grovfoder nr 1. Sveriges lantbruksuniversitet, 1989.
- Gustavsson, A-M. 2001. Bestämning av rödklöverhalten i vall, Nytt från institutionen för Norrländsk jordbruksvetenskap. *Ekologisk odling. Sveriges lantbruksuniversitet*, nr. 3.
- Gustavsson, K. 1999. Precisionsodling - för miljö och ekonomi. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Akademisammankomst 1999.
- Haak, E. & Simán, G. 1992. Fältförsök med kalkning av fastmarksjordar till olika basmättnadsgrad. Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 188.
- Hahlin, M. 1991. Kaliumgödslingseffektens beroende av balansen mellan kalium och magnesium II. Fältförsök, serie R3–8024. Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 183.
- Hahlin, M. & Ericsson, J. 1981. Fosfor och fosforgödsling. Aktuellt från Lantbruksuniversitetet 294.
- Hahlin, M. & Ericsson, J. 1984. Kalium och kaliumgödsling. Aktuellt från Lantbruksuniversitetet 333.
- Hahlin, M., Johansson, L. & Nilsson, L-G. 1980. Kaliumgödslings-effektens beroende av balansen mellan kalium och magnesium I. Kärlförsök. Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 131.
- Hahlin, O. & Gustavsson, A-M. 2019. Kvävegödsling och kvävestrategi till blandvall. Försöksrapport Sverigeförsöken.
- Havlin, J.L., Beaton, J.D., Tisdale, S.L. & Nelson, W.L. 2005. Soil fertility and fertilizers – An introduction to nutrient management (7:e upplagan). Pearson Education Inc., New Jersey, USA.
- Hammarstedt, M. 2013. Organiska gödselmedel till höstvetete. Mellansvenska försöksrapporten.
- Hammarstedt, M. & Nilsson, M. 2019. Kvävebehov hos olika höstvetesorter. Sverigeförsöken.
- Hammarstedt, M. & Nilsson, M. 2020. Kvävebehov hos olika höstvetesorter. Sverigeförsöken.
- Hjelm, E., Linge, C., Nilsson, H., Olofsson, S. 2021. Växtnäringsflöden på gårdar inom Greppa Näringen. Jordbruksverket. Rapport 2020:15.
- Holmgren G., Larsson F., Johansson M. & Lindblad Hammar I. 2020. Hållbar slamhantering. Betänkande av Utredningen om en giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. SOU 2020:3.
- Johansson, A. 2017. Odlar vårmete till foder. Arvensis, nr 8.
- Jordbruksverket. 1995. Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet vid nötkreaturshållning. Rapport 1995:10.
- Jordbruksverket. 2001. Gödselproduktion, lagringsbehov och djurtäthet i olika djurhållningssystem med grisar. Rapport 2001:13.
- Jordbruksverket. 2004. Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Jordbruksverket, Jönköping.
- Jordbruksverket. 2020a. Försäljning av mineralgödsel 2018/19. Statistikrapport 2020:4, Jordbruksverket, Jönköping.
- Jordbruksverket. 2020b. Statens Jordbruksverks föreskrifter om hänsyn till natur- och kulturvärden i jordbruket (SJVFS 2020:2). Jordbruksverket, Jönköping.
- Jönsson, E. & Hansson, G. 2018. Kväveform och strategi i höstvetete. Sverigeförsöken.
- Keren, R. 1996. Boron. Ur: Methods of soil analysis. Part 3 Chemical methods (Red. Sparks, DL). Soil Science Society of America, book series nr 5.
- Kirchmann H., Börjesson G., Bolinder M., Kätterer T. & Djodjic F. 2020. Soil properties currently limiting crop yields in 90 yield survey districts and 10 long-term field experiments. *European Journal of Agronomy* 120.
- Kleja, D.B., Elert, M., Gustafsson, J.P., Jarvis, N. & Norrström, A-C. 2006. Metallers mobilitet i mark. Naturvårdsverket. Rapport nr 5536.
- Krijger, A-K. 2009. NPKS till havre med stigande fosforgiva. Mellansvenska försöksrapporten.

- Krijger, A-K. 2015. Gödsling med S, P, K, N och B till åkerböna. Mellansvenska försöksrapporten.
- Krijger, A-K. & Gunnarson, A. 2011a. NPK-behov i oljelin, M3-8036. Mellansvenska försöksrapporten.
- Krijger, A-K. & Gunnarson, A. 2011b. Kvävebehov i oljelin, M3-2288. Mellansvenska försöksrapporten.
- KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft). 2005. Faustzahlen für die Landwirtschaft. Landwirtschaftsverlag, Münster, Germany.
- Lagerquist, R. 1970. Rapport från försöksserie med stigande mängder magnesium till sockerbeter och potatis i södra jordbruksförsöksdistriktet. Försöksserie R3(L3)-5600. Rapporter från avdelningen för växtnäringslära, Lantbrukshögskolan, Uppsala. Rapport nr 20.
- Lindgren, H. 2022. Gödsel och miljö 2022. Övrigt 206. Jordbruksverket, Jönköping. <https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr206.html>.
- Linderholm, K. 1997. Fosfors tillgänglighet i olika typer av slam, handelsgödsel samt aska. VA-forsk Rapport 1997:6.
- Lindén, B. 2008. Olika förfrukters efterverkan – effekter på kvävegödslingsbehovet till stråsådd. Avdelningen för precisionsodling, Sveriges lantbruksuniversitet, Skara. Rapport nr 14.
- Lundblad, K. & Johansson, O. 1956. Resultat av de senaste årens svenska mikroelementförsök. I. Försök med koppar. Statens jordbruksförsök, meddelande nr 61. Stockholm.
- Mattsson, L. 1974. Rapport från försök med radmyllning av gödsel. Rapporter från avdelningen för växtnäringslära, nr 83.
- Mattsson, L. 1993. Kombisådd och radmyllning. Meddelande från Södra jordbruksförsöksdistriktet. Sveriges lantbruksuniversitet.
- Mattsson, L. 2005. Växtnäringshalter i sockerbeter och i blasten. Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet.
- Mattsson, L. 2006. Kväveintensitet i korn – avkastning och kväveupptag. Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 212.
- Mattsson, L. 2010a. Geologiskt ursprung och kornstorlek avgör kalkeffekten. Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 5.
- Mattsson, L. 2010b. Långsiktig skördenivå, N- och Ca-inverkan. Rapport från växtodlings- och växtskydds-dagar i Växjö den 7 och 8 december 2010.
- Miljödepartementet. 2018. Giftfri och cirkulär återföring av fosfor från avloppsslam. Kommittédirektiv Dir 2018:67.
- Murdock, L. & Call, D. 2006. Managing seasonal fluctuations of soil tests. Lloyd Murdock and Dottie Call. University of Kentucky.
- Naturvårdsverket. 2013. Hållbar återföring av fosfor. Rapport nr 6580.
- Nilsson, A. 2016. Kvävestrategiers effekt på skörd och skördekomponenter i höstvetete 2013–2015. Examensarbete. Institutionen för mark och miljö. Sveriges lantbruksuniversitet.
- Nilsson, L-G. 1975. Magnesiumgödsling - intensitet och gödselmedelslag. Försöksserier 3-5600 och 3-5001. Rapporter från avdelningen för växtnäringslära, Lantbrukshögskolan, Uppsala. Rapport nr 99.
- Nilsson, I., Rölin, Å. & van Schie, A. 2012. Odlad potatis - en handbok. Hushållningssällskapet Skaraborg.
- Nätterlund, H. 2016. Högre skördar kräver mer fosfor. Arvensis, nr 8.
- Olsson, R. 2016. P på 5T. Tema växtnärning till sockerbeter. Del 1 – Fosfor. Betodlaren, nr 2.
- Olsson, Å., Persson, L. & Olsson, S. 2010. Variations in soil characteristics affecting the occurrence of *Aphanomyces* root rot of sugar beet – risk evaluation and disease control. *Soil biology & biochemistry* 43:316–323.
- Persson, J. 2003. Kväveförluster och kvävehushållning. Förbättringsmöjligheter i praktiskt jordbruk. Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för växtnäringslära, Sveriges lantbruksuniversitet. Rapport nr 207.
- Persson, L. & Olsson, Å. 2011. Sockerbeter som förfrukt till höstvetete. Effekt på skörd. *Betodlaren* 4:38–41.
- Reuter, D.J. & Robinson, J.B. (ed) 1997. *Plant analysis – an interpretation manual*. SBS Publishers & distributors Pvt. Ltd., New Delhi, India.
- Ringdahl, F. 2018. Hur bra är dagens rekommendationer för markkartering? Förändringar av fosforhalter i svensk åkermark över tid. Examensarbeten, Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. 2018:01.

- Rodhe, L. 2003. Ytmyllning av flytgödsel till vall – sparar kväve men kräver kraftigare traktor. JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, nr 103.
- Rodhe, L. 2014. Minska utsläpp av växthusgaser från stallgödsel. Praktiska råd Nr 22, Greppa Näringen.
- Salomon, E., Malgeryd, J., Rogstrand, G., Bergström, J. & Tersmeden, M. 2006. Halter av växtnäring och spår-element i lagrad gödsel från värphöns. JTI-rapport Lantbruk & industri 349, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala.
- SCB. 2020. Gödselmedel i jordbruket. 2018/19. Mineral- och stallgödsel till olika grödor samt hantering av stallgödsel. Statistiska meddelanden MI 30 SM 2002, Statistiska centralbyrån, Örebro.
- Simonsson, M., Kätterer, T. & Börjesson, G. 2016. Upp-tag och fastläggning av fosfor i långliggande kalk- och fosforförsök: kalkning som produktions- och miljö-åtgärd: Slutrapport, projekt nr H1133140.
- Statens Naturvårdsverks författningssamling. Kun-görelse med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket (SNFS 1994:2).
- Stenberg, M., Ekman, P., Lundblad, K. & Svanberg, O. 1949. Om kopparhalt i jord och vegetation och resul-tat av fleråriga gödslingsförsök i koppar. Meddelande från Kungliga lantbruksakademiens vetenskaps-avdelning, nr 4. Uppsala.
- Steineck, S., Gustafson, G., Andersson, A., Tersmeden, M. & Bergström, J. 1999. Stallgödselns innehåll av växtnäring och spår-element. Naturvårdsverkets rap-port nr 4974.
- Stoltz, E. & Wallenhammar, A-C. 2012. Mangantillför-sel i höstkorn ökar övervintring och skörd på jordar med manganbrist. Slutrapport till SLF-projekt H102-0003-SVX.
- Ståhlberg, S. 1982. Estimation of requirement of liming by determination of exchangeable soil aluminium. *Acta Agriculturae Scandinavica* 32:4: 357–367.
- Söderström, M. 2008. Traditionell markkartering i pre-cisionsodling. Sammanställning av markkarterings-statistik 1998–2002. Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri, Precisionsodling Sverige. Teknisk Rapport nr 15.
- Söderström, M. 2010. Interpolerade markkartor – några riktlinjer. Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri, Precisionsodling Sverige. Teknisk Rapport nr 21.
- Tell, J. & Axelson, U. 2010. Kväve- och fosforgödsling till majs. Försöksrapport 2010 för Mellansvenska för-sökssamarbetet och Svensk Raps.
- West Larsen, E. 1998 Mangelsygdomme i landbrugsaf-grøder. Hydro Agri, Danmark.
- Wetterlind, J., Stenberg, B. & Söderström, M. 2018. Ny markkarteringsstrategi anpassad för modellering och precisionsodling. Institutionen för mark och miljö, Precisionsodling och pedometri, Precisionsodling Sverige. Teknisk rapport nr 42.
- Wigfeldt, K. 2022. Optimalt pH-värde i åkermark för en effektiv växtproduktion – Vilka rekommendationer finns i andra länder? Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet. Självständigt arbete biologi, agronom mark/växt.
- Wong, M.T.F., Bell, R.W. & Frost, K. 2005. Mapping boron deficiency risk in soils of southwest Western Australia using a weight of evidence model. *Australian Journal of Soil Research* 43:811–818.

#### Personliga meddelanden

Gustavsson, Anne-Maj. SLU. 2016, 2017.

Rölin, Åsa. Hushållningssällskapet, 2017.

Gruvaeus, Ingemar. Yara AB, 2022.

## Bilaga 1

### Schema för bestämning av kvävebehov via mineralgödsel

	kg kväve per hektar
Riktgiva utifrån förväntad skörd enligt rekommendation i tabell 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 eller 29	
<i>Gör justering genom avdrag för följande:</i>	
Nettomineralisering av markens förråd av organiskt kväve genom stallgödsels långtidseffekt, se <a href="#">tabell 7*</a>	-
Förfruktseffekt från föregående gröda, se <a href="#">tabell 30</a>	-
Mulljord, se nedan	-
Planerad tillförsel av stallgödsel eller andra organiska gödselmedel till årets gröda, se <a href="#">tabell 5</a>	-
<b>Årets beräknade behov av mineralgödselkväve eller annan kompletteringsgödsling med kväve</b>	<b>=</b>

\* Riktgivorna för vall är anpassade utifrån att gården har en djurenhet per hektar. Därför behöver du inte justera gödslingen till vallen för långsiktig stallgödsleffekt om inte djurhållningen är betydligt större eller mindre än en djurenhet per hektar.

Enligt 20§ i Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2004-62 (Jordbruksverket, 2004), ska du som har din mark i känsligt område räkna ut grödans kvävebehov genom att ta hänsyn till ett antal faktorer. Du kan använda uppställningen ovan för att göra beräkningen. För vall behöver du inte ta hänsyn till stallgödsels långtidseffekt. Det kan du läsa mer om i punkt 1 nedan. Du ska dokumentera beräkningen i en växtodlingsplan eller liknande.

#### Så här gör du:

Börja med att titta på rekommenderad kvävegiva för respektive gröda och vid den skördenivå som du tror att du får. Du hämtar dessa uppgifter från tabell 16, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28 eller 29.

Sedan justerar du den beräknade givan med följande:

- Om du har använt stallgödsel regelbundet under en längre tid så kommer det att öka mineraliseringen från marken. Därför ska du göra ett avdrag för långtidseffekt från stallgödsel. Du kan hämta uppgifter från [tabell 7](#). För vall förutsätter den långsiktiga kväveeffekten att du har tillfört stallgödsel motsvarande ca en djurenhet per hektar. Om stallgödseltillförseln eller mineraliseringen är högre eller lägre så kan du justera värdet även för vallen, men det är inte något krav.
- Om du har haft en förfrukt som ger högre kväveefterverkan än stråsäd så ska du justera för det. Justera även för kväveefterverkan från gröngödslings- eller fånggrödor. Du kan hämta uppgifter från [tabell 30](#).
- Definitionen på mulljord är minst 40 % mull, men du kan alltså räkna med en extra kväveleverans från mull redan vid betydligt lägre mullhalt. Mineraliseringen från mulljordar kan variera mycket. Läs mer om hur du kan justera för mulljord i [kapitel 4.10](#).
- Om du tillför stallgödsel eller andra organiska gödselmedel ska du justera för hur mycket kväve som kommer grödan till godo. Ta hänsyn till gödselslag, mängd och hur och när gödseln sprids. För stallgödsel hittar du kväveeffekten i [tabell 5](#). Du kan göra en mer detaljerad beräkning av kväveeffektiviteten i beräkningsverktyget "Gödselkalkylen" på Greppa Näringsens webbplats [greppa.nu](http://greppa.nu). Gödselkalkylen finns även som en del i beräkningsverktyget Vera. För övriga organiska gödselmedel kan du uppskatta kväveeffekten utifrån halten ammoniumkväve i gödselmedlet.

## Bilaga 2

## Att tänka på för att få bästa växtnäringsutnyttjande och minimera förlusterna när du sprider stallgödsel på sand- och mojordar

		Sprid i första hand...	Alternativt...	Undvik att sprida...
Flytgödsel	Nöt <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV tidig vår när marken bär, max 25 ton/ha.</li> <li>till vårsäd med vallinsädd, vårplöjning eller snabb nedbrukning.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på hösten inför 1:a skörd i vall II–IV. Alternativ vid sporproblem, men risk för kväve- och fosforförluster.</li> <li>före sädd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> - tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> <li>omedelbart efter 1:a skörd i vall II–IV. Bra alternativ vid sporproblem men risk för stor ammoniakavgång. Myllning och spridning vid svalt, mulet och vindstilla väder eller före regn minskar ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på våren till 1:a skörd i vall I.</li> <li>till vall där närmaste skörden ska betas.</li> <li>på hösten utom till vall och höstraps p.g.a. stor utlakningsrisk.</li> <li>före eller i samband med vallbrott, särskilt på sommaren eller tidig höst inför sädd av höstsäd.</li> </ul>
	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsädda grödor med lång vegetationsperiod, t.ex. sockerbeter eller potatis, vårplöjning, max 50–70 % av N-givan.</li> <li>i växande stråsådd eller oljevaxter med bandspridningsteknik eller släpfoot när grödan är 10–15 cm hög.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till övriga vårsädda grödor, t.ex. stråsådd.</li> <li>före sädd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> - tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på hösten före sädd av höstsäd p.g.a. stor utlakningsrisk.</li> </ul>
Fastgödsel	Nöt <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsäd med vallinsädd, vårplöjning eller snabb nedbrukning.</li> <li>till 1:a skörd i vall II–IV, höst max 25 ton/ha. Viktigt att gödseln finfördelas väl.</li> <li>till vårsädda grödor, helst grödor med lång vegetationsperiod, vårplöjning eller snabb nedbrukning. Så gärna in en fånggröda i vårsäd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV tidig vår, max 25 ton/ha. Viktigt att gödseln finfördelas väl.</li> <li>före sädd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> - tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på våren till 1:a skörd i vall I.</li> <li>till vall om gödseln inte kan finfördelas och spridas jämnt.</li> <li>på hösten före sädd av höstsäd p.g.a. dåligt kväve- och kaliumutnyttjande och utlakningsrisk.</li> </ul>
	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>till grödor med lång vegetationsperiod, t.ex. sockerbeter eller potatis, vårplöjning. Så gärna in en fånggröda i vårsäd.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>före sädd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> - tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på hösten till andra grödor än höstraps, p.g.a. utlakningsrisk.</li> </ul>
Urin	Nöt <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV på våren, max 15–20 ton/ha. Se upp med för hög kaliumhalt i vallfodret och brännskador vid spridning i klöverrik vall.</li> <li>till 2:a skörd i vall, max 15–20 ton/ha. Bandspridning och spridning vid svalt, mulet och vindstilla väder eller före regn minskar ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsäd med vallinsädd, dock stor risk för överskott och utlakning av kalium.</li> <li>till övriga vårsädda grödor. Snabb nedbrukning minskar ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till betesvall såvida den inte också skördas. Betesvall har mycket lågt behov av fosfor och kalium.</li> </ul>
	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsädda grödor på våren</li> <li>i växande gröda med bandspridningsteknik eller släpfoot, max 20 ton/ha. Sprid om möjligt vid svalt, mulet och vindstilla väder eller före regn för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>före sädd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup>. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången, särskilt vid höga marktemperaturer i augusti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på hösten p.g.a. stor utlakningsrisk.</li> <li>till betesvall p.g.a. parasitrisk.</li> </ul>

1) För att minska risken för sporer i ensilaget bör du låta så lång tid som möjligt passera mellan gödselspridning och skörd i vall. Undvik stora gödselgivor och se till att fast- och kletgödsel sprids jämnt och finfördelas väl. Myllning av flytgödsel minskar risken för sporer i ensilaget. God hygien vid mjölkningen är avgörande för att undvika att sporer hamnar i mjölken, liksom rätt skördeteknik och stubbhöjd. Ensilage bör förtorkas och hö torkas så snabbt som möjligt. Undvik direktskörd. Använd tillsatsmedel vid ensilering. Hacka, packa och täck noggrant och plasta in ensilagebalar väl. Hö innebär generellt mindre risk för sporproblem än ensilage.

2) Ensilagesaft i urinen kan ge sporproblem vid spridning till vall. Det motverkas genom förtorkning och användning av tillsatsmedel vid skörd av ensilage, snabb torkning av hö och god hygien vid mjölkning.

3) I känsligt område råder spridningsförbud under perioden 1 nov–28 feb enligt SJVFS 2004-62 (Jordbruksverket, 2004).



## Bilaga 3

## Att tänka på för att få bästa växtnäringsutnyttjande och minimera förlusterna när du sprider stallgödsel på lerjordar

		Sprid i första hand...	Alternativt...	Undvik att sprida...
Flytgödsel	Nöt <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV tidig vår när marken bär, max 25 ton/ha.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på hösten inför 1:a skörd i vall II–IV. Max 25 ton/ha. Alternativ vid sporproblem men risk för kväve- och fosforförluster.</li> <li>till vårsäd med vallinsädd, snabb nedbrukning.</li> <li>före sådd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> – tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> <li>omedelbart efter 1:a skörd i vall II–IV. Bra alternativ vid sporproblem, men risk för stor ammoniakavgång. Myllning och spridning vid svalt, mulet och vindstilla väder eller före regn minskar ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på våren till 1:a skörd i vall I.</li> <li>till vall där närmaste skörden ska betas.</li> <li>på hösten utom till vall och höstraps p.g.a. risk för utlakning och denitrifikation.</li> </ul>
	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>i växande stråsäd eller oljeväxter på våren med bandspridningsteknik eller släpfoot när grödan är i 10–15 cm hög.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsådda grödor efter 28 feb<sup>3</sup> följt av snabb nedbrukning</li> <li>före sådd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> – tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>i vårbruk om detta ger packningsskador eller nedbrukningen försenas.</li> <li>före sådd av höstsäd p.g.a. risk för utlakning och denitrifikation.</li> </ul>
Fastgödsel	Nöt <sup>1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV, höst, max 25 ton/ha. Viktigt att gödseln finfördelas väl.</li> <li>före sådd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> – tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV, tidig vår, max 25 ton/ha. Viktigt att gödseln finfördelas väl.</li> <li>inför vårsådda grödor under oktober<sup>3</sup></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>på våren till 1:a skörd i vall I, max 25 ton/ha. Viktigt att gödseln finfördelas väl.</li> <li>till vall om gödseln inte kan finfördelas och spridas jämnt.</li> <li>på hösten före sådd av höstsäd p.g.a. risk för denitrifikation och dåligt kväveutnyttjande.</li> <li>till vårsådda grödor på våren om det ger packningsskador, problem med såbädden eller försenad sådd</li> </ul>
	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>före sådd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> – tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsådda grödor på våren om gödseln kan finfördelas och spridning ske utan packningsskador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsådda grödor på våren om det ger packningsskador, problem med såbädden eller försenad sådd.</li> <li>på hösten före sådd av höstsäd.</li> </ul>
Urin	Nöt <sup>2)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till 1:a skörd i vall II–IV på våren, max 15–20 ton/ha. Se upp med för hög kaliumhalt i vallfodret och brännskador vid spridning i klöverrik vall.</li> <li>till 2:a skörd i vall, max 15–20 ton/ha Bandspridning och spridning vid svalt, mulet och vindstilla väder eller före regn minskar ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till vårsäd med vallinsädd, men stor risk för överskott av kalium.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>till betesvall såvida denna inte också skördas. Betesvall har mycket lågt behov av fosfor och kalium.</li> </ul>
	Gris	<ul style="list-style-type: none"> <li>i växande gröda med bandspridningsteknik eller släpfoot när grödan är 10–15 cm hög, max 20 ton/ha. Sprid om möjligt vid svalt, mulet och vindstilla väder eller före regn för att minska ammoniakavgången.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>före sådd av höstraps, max 60 kg lättillgängligt N/ha<sup>3</sup> – tänk på svavelbehovet. Bruka ned gödseln snabbt för att minska ammoniakavgången, särskilt vid höga marktemperaturer i augusti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>före sådd av höstsäd p.g.a. risk för utlakning och denitrifikation samt dåligt kväveutnyttjande.</li> <li>i vårbruk om det ger packningsskador, problem med såbädden eller försenad sådd.</li> <li>till betesvall p.g.a. parasitrisk.</li> </ul>

1) För att minska risken för sporer i ensilaget bör du låta så lång tid som möjligt passera mellan gödselspridning och skörd. Undvik stora gödselgivor och se till att fast- och kletgödsel sprids jämnt och finfördelas väl. Myllning av flytgödsel minskar risken för sporer i ensilaget. God hygien vid mjölkningen är avgörande för att undvika att sporer hamnar i mjölken, liksom rätt skördeteknik och stubbhöjd. Ensilage bör förtorkas och hö torkas så snabbt som möjligt. Undvik direktskörd. Använd tillsatsmedel vid ensilering, hacka, packa och täck noggrant och plasta in ensilagebalar väl. Hö innebär generellt mindre risk för sporproblem än ensilage.

2) Ensilagesaft i urinen kan ge sporproblem vid spridning till vall. Det motverkas genom förtorkning och användning av tillsatsmedel vid skörd av ensilage, snabb torkning av hö och god hygien vid mjölkning.

3) I känsligt område råder spridningsförbud under perioden 1 nov–28 feb enligt SJVFS 2004-62 (Jordbruksverket 2004).

## Bilaga 4

### God markkarteringssed (GMS) enligt Markkarteringsrådet

Syftet med markkartering är att ge lantbrukaren ett verktyg för att behovsanpassa gödsling och kalkning. God markkarteringssed (GMS) är ett dokument som ett antal organisationer och företag gemensamt har utarbetat. Dokumentet fastställer vad som anses vara bästa möjliga tillämpning av markkarteringen efter en avvägning mellan vetenskaplig noggrannhet, lantbrukarnytta och miljöhänsyn. GMS förutsätter att jordprov tas vid samma tid på året vid återkommande provtagning. Dessutom förutsätter GMS att proven inte tas förrän tidigast en månad efter tillförsel av stall eller mineralgödsel och tidigast ett år efter kalkning.

Markkarteringsrådet är en frivillig sammanslutning av företrädare för företag och organisationer som arbetar med frågor kring markkartering och gödslingsrådgivning. De rekommendationer i dokumentet som inte åtföljs av en källhänvisning utgör en samlad bedömning av Markkarteringsrådets medlemmar.

#### Följande organisationer, myndigheter, universitet och företag var representerade i Markkarteringsrådet i september 2023:

Agrilab AB	Lantmännen	Research Nordkalk	SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Dataväxt	LMI	OMYA	Yara
Eurofins Food & Agro	Lovanggruppen	SOYL	
Hushållningssällskapen	MEWAB	Svenska Kalkföreningen	
Jordbruksverket	Nordic Beet		

#### Kontaktpersoner Markkarteringsrådet:

Johanna Wetterlind, SLU, ordförande, [johanna.wetterlind@slu.se](mailto:johanna.wetterlind@slu.se)

Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet Östergötland, sekreterare, [hans.augustinsson@hushallningssallskapet.se](mailto:hans.augustinsson@hushallningssallskapet.se)

## Markkartering

### Provpunktspacering

- Provpunkterna fördelas systematiskt i ett rutnät över fältet eller anpassat efter skillnader i jordart och mullhalt.
- Genom att använda bakgrundsinformation kopplat till variationer i jordart och mullhalt kan provpunkterna flyttas lite så att variationen blir så bra representerad som möjligt (läs mer i [kapitel 1.1](#)). Det finns flera alternativa metoder för att hitta variationer inom fältet, till exempel
  - mätning med marksensor, t.ex. konduktivitetmätning eller gammamätning.
  - digitala jordartskartan eller gamla markkarteringsresultat.
  - satellitbilder, skördekartor eller grödsensormätningar.
- Punkterna GPS-positioneras. Detta gör det möjligt att återkomma till exakt samma punkt vid uppföljande kartering och möjlighet att återanvända jordarts- och förrådsanalyser.

### Provtäthet

- Standard är att ta 1 prov per hektar.

- Glesare provtagning (0,5–1 prov per ha) kan tillämpas
  - på fält med jämna jordarts- och mullhaltsförhållanden
  - när översiktlig jordartskartering genomförts
- Tätare provtagning (1–2 prov per ha) kan tillämpas
  - vid första karteringen om det saknas annan information om variationen
  - på fält med varierande jordart och mullhalt
  - vid precisionsodling

#### **Provtagningsteknik**

- Ett jordprov ska innehålla minst 10 borrstick till 20 cm djup, tagna inom en cirkel med 3–5 m radie<sup>1</sup>. Centrum för cirkeln mäts med GPS.
- Det är viktigt att borrsticken fördelas väl inom provtagningsytan så att ojämnheter utjämnas.
- På små fält, < 3 ha, med enhetlig jordart och samma brukningshistoria där man planerar att ta bara ett prov ska borrsticken fördelas över hela fältet.
- All jord som provtas ska läggas i provkartongen. En kartong på knappt 4 dl bör vara full vid provtagningen.
- Det finns jordborrar med olika diameter, men en förutsättning för korrekt provtagning är att kartonger avsedda för respektive borrtyp används. Normal kartongstorlek är 8,5 x 8,5 x 5 cm. För att få plats med 10 borrstick i denna kartong ska borret vara max 15 mm i diameter.

#### **Provtagningstidpunkt**

- Provtagning utförs under perioden augusti till vårbruk, men i första hand på hösten. Det är viktigt att uppföljande kartering sker vid samma tidpunkt på året som den föregående karteringen.
- Provtagning bör göras tidigast en månad efter tillförsel av mineralgödsel, och tidigast ett år efter kalkning. Detta för att säkerställa att gödselkorn och kalk har hunnit lösas upp.
- Höga givor av framför allt organiska gödselmedel påverkar markkarteringsanalyserna. Vill man titta på trender mellan olika karteringsomgångar är det viktigt att proverna tas vid samma årstid, på samma plats i växtföljden och lika lång tid efter att fältet gödslats med större givor organisk gödsel. Om detta inte är möjligt är det mycket viktigt att ta hänsyn till de olika förutsättningarna vid tolkning av karteringen.

#### **Provtagningsintervall**

- Normalt provtagningsintervall är 5–15 år.
- Kort intervall kan vara lämpligt på fält med
  - specialgrödor
  - ojämna jordartsförhållanden
  - stort behov av kalkning
  - tillförsel av organiska gödselmedel utan regelbunden uppföljning med växtnäringsbalanser
  - lättare jordar, kopplat till pH och K
- Långt intervall kan vara aktuellt på fält med
  - jämna jordartsförhållanden
  - regelbundna uppföljningar med växtnäringsbalanser
  - användning av mineralgödsel eller en måttlig tillförsel av organiska gödselmedel

## Analyser

Analys och analysfrekvens	Användningsområde	Gränsvärden/ Klassgränser	Provtagningsintervall	Noggrannhet vid provtagning och vid analys
<b>pH</b> Samtliga prov	<p>Upplyser tillsammans med jordart och mullhalt om kalkbehov.</p> <p>För bedömning av flera näringsämnen tillgänglighet (P, Mn m.fl.). Sockerbetor är en gröda känslig för lågt pH. Korn är känsligast av spannmåls-slagen, men stora sortskillnader finns<sup>3)</sup>.</p> <p>Näringsämnen tillgänglighet vid olika pH-värden framgår av bild i t.ex. Brady<sup>4)</sup>.</p>	<p>Optimalt växtnäringsjord med &lt; 6 % mull vid pH 6,0–6,5, beroende på lerhalt; högre pH-värde vid högre lerhalt.</p> <p>Med ökande mullhalt är pH-kravet för att uppnå optimalt växtnäringsutnyttjande 0,2–1,0 pH-enheter lägre.</p> <p>Vid sockerbetsodling bör pH-värdet vara 0,5 pH-enhet högre än vid annan odling på samtliga jordar.</p>	<p>Vid varje omkartering. Tätare vid lågt pH eller frekvent användning av surgörande gödselmedel. Även aktuellt vid uppföljningskartering.</p> <p>Det är viktigt att utföra omkartering vid samma tidpunkt på året som grundkarteringen. Särskilt viktigt är detta för pH-analysen.</p>	
<b>Fosfor – lättlöslig (P-AL)</b> Samtliga prov	För bedömning av behov av fosforgödsling. Känsligaste jordbruksgrödorna är sockerbetor och potatis.	<p>Fosforhalt, mg P/100 g:</p> <p>klass I: &lt; 2,0 klass II: 2,1–4,0 klass III: 4,1–8,0 klass IV A: 8,1–12,0 klass IV B: 12,1–16 klass V: &gt;16</p> <p>Vid höga pH-värden kan fosforinnehållet överskattas med denna metod.</p>	Vid varje omkartering. Även aktuellt vid uppföljningskartering.	
<b>Kalium – lättlösligt (K-AL)</b> Samtliga prov	För bedömning av behov av kaliumgödsling. Störst risk för brist på lätta jordar och mulljordar samt vid intensiv vallodling.	<p>Kaliumhalt, mg K/100 g:</p> <p>klass I: &lt; 4,0 klass II: 4,1–8,0 klass III: 8,1–16,0 klass IV: 16,1–32,0 klass V: &gt; 32</p>	Vid varje omkartering. Även aktuellt vid uppföljningskartering.	
<b>Magnesium – lättlösligt (Mg-AL)</b> Om analysresultatet erhålls från laboratorium utan extra kostnad, rekommenderas analys på samtliga prov. Annars på vart 3:e och 5:e prov	För bedömning av behov av Mg-gödsling. Jordar med risk för brist är mullfattiga sandjordar med lågt pH, organogena jordar och jordar med höga K-AL-tal. Sockerbetor och potatis är känsliga för brist.	4–10 mg/100 g beroende på jordart. Den lägre siffran är nedre gräns för jordar med låga och den högre är nedre gräns för jordar med höga lerhalter.	Vid varje omkartering.	
<b>Kalium/Magnesium-kvot</b> Beräknas på basis av K-AL och Mg-AL	<p>För bedömning av Mg-gödslingsbehov och under vissa förhållanden K-gödslingsbehov. För stor mängd K i förhållande till Mg kan leda till Mg-brist och tvärtom.</p> <p>Vallfoder till idisslare med för lågt Mg-innehåll kan leda till stall- och beteskramp m.m.</p>		Vid varje omkartering.	
<b>Kalcium – lättlösligt (Ca-AL)</b> Om analysresultatet erhålls från laboratorium utan extra kostnad, rekommenderas analys på samtliga prov. Annars efter rådgivares bedömning.	<p>Framför allt för bestämning av basmättnadsgraden. Se kalkbehovsberäkning.</p> <p>För sockerbetor finns ett samband mellan Ca-AL och risken för angrepp av <i>Aphanomyces cochliformis</i>.</p>	<p>På jord med gott kalktillstånd är brist ovanlig. Störst risk för brist på mulljord och lätta jordar<sup>3)</sup>.</p> <p>Känsliga grödor är vallbaljväxter och potatis (rostfläckighet: minst 70 mg per 100 g jord för måttligt känsliga sorter, 100 mg per 100 g för känsliga sorter).</p> <p>För sockerbetor bör Ca-AL vara högre än 250 mg/100g jord för att minska risken för angrepp av <i>A. cochliformis</i>.</p>	Vid varje omkartering.	

Analys och analysfrekvens	Användningsområde	Gränsvärden/ Klassgränser	Provtagningsintervall	Noggrannhet vid provtagning och vid analys
<b>Kalium – förråd (K-HCl)</b> Användningsområdet avgör analysbehov och -frekvens.	Ger en uppfattning om markens kaliumförråd, vilket även speglar lerhalten. Stabiliteten i K-AL kan bedömas med hjälp av värdet på K-HCl.	Kaliumhalt, mg K/100 g: Klass 1: < 50 Klass 2: 51–100 Klass 3: 101–200 Klass 4: 201–400 Klass 5: > 400	I huvudsak endast aktuellt vid nykartering.	
<b>Koppar – förråd (Cu-HCl)</b> Vart 5:e prov på mullfattiga lätta jordar samt mulljordar. Cu-HCl erhålls ur samma extrakt som K-HCl.	För bedömning av Cu-gödslingsbehov. Koppar är lättast tillgängligt vid pH 5–6. Brist uppstår främst på mull- och sandjordar. Känsliga grödor är korn, havre och vete <sup>3</sup> .	6–7 mg/kg jord	Främst aktuellt vid nykartering. Vid låga värden bör ny analys göras vid omkartering.	
<b>Al-AS-metoden</b> Modifierad enligt Ståhlberg <sup>6</sup> , komplement för att bedöma behovet av kalkning.	Används på mycket mullrika jordar och mulljordar om pH-värdet är minst 5,1.	Gränsvärdet är 1 mg Al-AS/100 ml jord vilket motsvarar 11–19 mg/kg jord beroende på volymvikt.		
<b>Mullhalt</b> Mullhalten beräknas på basis av glödningsförlust och lerhalt.  Användningsområdet avgör analysbehov och -frekvens. Se t.ex. kalkbehovsberäkning.	Ger uppfattning om jordens basutbyteskapacitet, potential för kväve mineralisering, brukningsegenskaper och dosering av jordherbicid. Mullhalt används för kalkbehovsberäkning.	Mullfattig (mf) mindre än 2 % Något mullhaltig (nmh) 2–3 % Måttligt mullhaltig (mmh) 3–6% Mullrik (mr) 6–12 % Mycket mullrik (mkt mr) 12–20 % Mineralblandad mulljord (t.ex. sa M el. I M) 20–40 % Mulljord (M) mer än 40 %		
<b>Volymvikt</b> Vart 5:e prov på mulljordar och mycket mullrika mineraljordar. Volymvikt kan mätas direkt, eller beräknas approximativt med hjälp av mullhalt.	För att kunna ge gödslingsråd för mulljordar och mycket mullrika mineraljordar (mer än 12 % mull).	Normal volymvikt i mineraljord är 1,25 kg/l. Om värdet är lägre kan det vara aktuellt att justera rekommendationen för gödsling.		
<b>Lerhalt</b> Användningsområdet avgör analysbehov, -frekvens och -metod.  Lerhalt kan mätas med t.ex. sedimentationsmetoden.	Ger information om jordens brukningsegenskaper, behov av kalium- och magnesiumgödsling och risk för utlakning av växtnäringsämnen.	< 5 %: lerfria och svagt leriga jordar 5–15 %: leriga jordar 15–25 %: lättleror 25–40 %: mellanleror 40–60 %: styva leror > 60 %: mycket styva leror	Lerhalten förändras ej.	
<b>Jordart – mekanisk analys</b> Användningsområdet avgör analysbehov, -frekvens och -metod.  Analyseras på utvalda punkter som antas representera olika jordartsområden.	Jordens sammansättning med avseende på mineraldelens partikelfraktioner (ler, mjåla, mo och sand) och mullhalt.		Denna analys behöver inte upprepas.  Jordarten förändras ej.	
<b>Kalkbehovsberäkning</b> En standardmetod är beräkning med utgångspunkt från pH, mullhalt och lerhalt.	Metoder för att bestämma mängden kalk (ton CaO per ha) som behöver tillföras för att uppnå lämpligt pH eller lämplig basmättnadsgrad.	Målnivå: pH 6,0 på lätta jordar och pH 6,5 på lerjordar. På mullrika jordar 0,2–1,0 enheter lägre. Vid sockerbetsodling bör värdena ligga 0,5 enhet högre på samtliga jordar.		
<b>Kadmium (Cd)</b> Delprov från samtliga jordprov från maximalt 15 ha enligt kontraktregler.  Uppslutning av 5 g jord i 7 M salpetersyra enligt SS-028311.	Prov tas för bedömning av risk för höga Cd-halter i skördeprodukten. I de fall där Cd-halten befaras vara hög på del av arealen bör analysen omfatta mindre områden än 15 ha.	Enligt kontrakt finns en högsta gräns på 0,30 mg/kg.  Växttillgängligheten ökar vid pH-värden < 6. Art- och sortskillnader finns i upptag: vårvete > höstveten > havre > korn > råg.	Prov tas enligt kontraktregler.	Delprov tas ut på laboratoriet enligt provtagarens anvisningar efter provberedning och homogenisering.
<b>Kadmium (Cd) och övriga tungmetaller</b> På fält där höga halter befaras och slamspridning planeras.	Om det kan antas att gränsvärdet överskrids <sup>7</sup> ska markens metallhalter kontrolleras innan avloppsslam sprids.	Tungmetaller (enligt SNFS 1994:2): bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel och zink.	Före spridning av avloppsslam.	Provet ska bestå av minst 0,5 l, uttaget med 25 borrstick på en areal som maximalt representerar 5 ha <sup>7</sup> .



Analys och analysfrekvens	Användningsområde	Gränsvärden/ Klassgränser	Provtagningsintervall	Noggrannhet vid provtagning och vid analys
<b>Kadmium (Cd) och fosfor (P)</b> På fält där slamspridning planeras.	Om det inte kan antas att gränsvärden överskrids <sup>7)</sup> .	Cd-analys enligt SNFS 1994:2.	Före spridning av avloppsslam för att tillgodose reglerna för slamcertifiering.	Provtagning enligt ovanstående ruta, men provet får representera 15 ha.
<b>Mineralkväve</b> Separat provtagning med speciella borrar. Proverna fryses. Provtagning sker lämpligen till 60 cm djup.		Mineralkväve (NH <sub>4</sub> -N+ NO <sub>3</sub> -N).		Provtagningen måste ske på ett sådant sätt att delar av djupet 0–60 cm inte blir över- eller under-representerade.

- 1) Lindén, B. 2008. Erforderligt antal borrhstick vid jordprovtagning. Rapport till markkarteringsrådet 2000–01–19. Institutionen för jordbruksvetenskap Skara, SLU.
- 2) Wiklander, L. 1976. Marklära. 1976. LHS Uppsala.
- 3) Aasen. I. 1986. Mangelsjukdomar og andre ernæringsforstyringer hos kulturplanter: årsaker – symptom – rådgjerder. Landbruksforlaget Oslo.
- 4) Brady, N.C. & Weil, R.R. 1999. The nature and properties of soils. 12th ed. Prentice-Hall Inc. Upper Saddle River.
- 5) Kjellquist, T. 1998. K/ Mg-kvoten. Växtpressen nr 3 1998.
- 6) Ståhlberg, S. 1982. Estimation of Requirement of Liming by Determination of Exchangeable Soil Aluminium. Acta Agric. Scand. 32:4, 357–367.
- 7) SNFS 1994:2. Statens naturvårdsverks föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Naturvårdsverket.



# Jordbruks verket

Jordbruksverket  
551 82 Jönköping  
Tfn 036-15 50 00 (vx)

E-post: [jordbruksverket@jordbruksverket.se](mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se)  
[www.jordbruksverket.se](http://www.jordbruksverket.se)

ISSN 1102-8025  
JO23:17



Europeiska jordbruksfonden  
för landsbygdsutveckling, Europa  
investerar i landsbygdsområden