

Preparat, farliga för pollinerande insekter

lantbruk och yrkesmässig trädgårdsodling 2025

PREPARAT (verksamt ämne/organism)	ANVÄNDARVILLKOR
BotaniGard WP* (svampen <i>Beauveria bassiana</i>)	Gäller endast jordgubbar på friland och i tunnel: Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Danitron 5 SC (fenpyroximat)	I växthus: Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen tre dagar efter behandlingen.
Fibro (paraffinolja)	Gäller endast grönsaker, bär och plantskoleväxter på friland och i tunnel, gurka och tomat i tunnel och växthus samt prydnadsväxter i växthus (UPMA**): Finns blommande växter i odlingen, får växtskyddsmedlet endast spridas mellan klockan 23.00 och 05.00.
Forapro* (protiokonazol, fenpropidin)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Maganic* (protiokonazol, difenokonazol)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Mainspring* (cyantraniliprol)	I växthus: Blommande växter får lämna växthuset tidigast sju dagar efter behandling, för att skydda bin och andra pollinerande insekter.
Milbeknock* (milbemycin)	I växthus: Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen fyra dagar efter behandlingen. Gäller endast jordgubbar på friland (UPMA**): Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Nexide CS* (gamma cyhalotrin)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Raptol* (rapsolja, pyretriner)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
Spotlight Plus (karfentrazonetyl)	Gäller endast plantskoleväxter och sparris på fält, samt björnbär, blåbär, jordgubbar (nyetablerade), hallon, krusbär, tranbär och vinbär på fält samt i tunnel (UPMA**). Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.
TEPPEKI* (flonikamid)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda.

* märkt med koden SPe 8 = farligt för bin

** UPMA = utvidgat produktgodkännande för mindre användningsområden

Observera att det **ALLTID** är informationen på preparatens etiketter som gäller!

Uppgifterna gäller i mars 2025, men kan ha ändrats. Vid omregistrering kan nya användarvillkor om hänsyn till pollinerande insekter tillkomma.

Du ansvarar själv för att kontrollera att uppgifterna är aktuella!

Tänk på att alla insektsmedel kan vara skadliga i olika grad för bin och andra pollinerande insekter.