

# Bifarlige preparat i lantbruk och trädgårdsodling

PREPARAT (aktiva substanser)	ANVÄNDARVILLKOR
<b>Avault</b> (indoxakarb)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in.
<b>Beta-Baythroid SC 025</b> (betacyflutrin)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning. Spridning av produkten bör göras nattetid.
<b>Confidor WG 70</b> (imidaklopid)	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen tre dagar efter behandlingen.
<b>Danitron 5 SC</b> (fenpyroximat)	Ta bort kolonier av pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen tre dagar efter behandlingen.
<b>Fastac 50</b> (alfacypermetrin)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Produkten får inte användas om det är risk för daggbildning.
<b>Fibro</b> (paraffinolja)	<b>Gäller endast bär på friland samt frilandsgroäcker (UPMA):</b> För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte preparatet i blommande gröda.
<b>Milbeknock</b> (milbemycin)	Ta bort humlekolonier av humlor och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen tidigast fyra dagar efter behandlingen.
<b>Plenum</b> (pymetrozin)	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda för bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."
<b>Plenum 50 WG</b> (pymetrozin)	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. För att skydda bin och andra pollinerande insekter, använd inte denna produkt på blommande gröda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda för bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom."
<b>Raptol</b> (rapsoolja, pyretriner)	Växtskyddsmedlet får inte spridas på blommande växter där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Spridning av produkten bör göras nattetid.
<b>Steward 30 WG</b> , regnr 5429 (indoxakarb)	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd".  <b>I växthus:</b> Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen tre dagar efter behandlingen.
<b>Steward 30 WG</b> , regnr 4929 (indoxakarb)	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Avlägsna eller täck över bikupor som är placerade i fältet tills sprutvätskan har torkat in. Om bikupor utanför fältet kan exponeras vid spridning ska ett vindanpassat skyddsavstånd bestämmas med hjälp av "Hjälpredan för bestämning av vindanpassat skyddsavstånd".
<b>TEPPEKI</b> (flonikamid)	Växtskyddsmedlet får inte spridas där pollinerande insekter aktivt söker efter föda. Spridning av produkten bör göras nattetid.
<b>Vertimec</b> (abamectin)	Ta bort humlekolonier och andra pollinerande insekter eller stäng till ingången till boet innan spridning av växtskyddsmedlet. Insekterna får återintroduceras i odlingen tre dagar efter behandlingen.

## PREPARAT (aktiva substanser eller organismer) som är bifarlige (märkta med kod Spe 8), men inte har några användarvillkor

**BotaniGard WP**  
(svampen *Beauveria bassiana* Vuillemin GHA)

**Diqua**  
(dikvat dibromidsalt)

- Observera** att det **ALLTID** är informationen på preparatens etiketter som gäller! Uppgifterna gäller i februari 2019, men kan ha ändrats. Vid omregistrering kan nya användarvillkor om hänsyn till bin tillkomma.
- Du ansvarar själv** för att kontrollera att uppgifterna är aktuella!
- Tänk på att alla insektsmedel kan vara skadliga i olika grad för bin och andra pollinerande insekter.



Europeiska jordbruksfonden för  
landsbygdsutveckling, Europa  
investerar i landsbygdsområden

OVR479